





LIBRARY  
OF THE  
UNIVERSITY  
OF ILLINOIS

598.7

W12 *pn*

MAY 18 1967

BIOLOGY

Paul Herer Mütze.



Natur. Drees  
Wegle.



MONOGRAPHIA  
PSITTACORUM.

AUCTOR

WAGLER.

1835

13750

01c

**MONOGRAPHIA**  
**PSITTACORUM.**

**AUCTOR**

**WAGLER.**

---

(Aus dem Bande der Denkschriften der Königl. Akademie der Wissenschaften in München  
besonders abgedruckt).

---

*Handwritten notes:*  
München, 1835  
Bund 3... 1232

---

**München, 1835.**

Gedruckt und in Commission bei George Jaquet.

*La détermination précise des espèces et de leurs caractères distinctifs, fait la première base, sur la quelle toutes les recherches de l'histoire naturelle doivent être fondées. Les observations les plus curieuses, les vues les plus nouvelles, perdent presque tout leur mérite, quand elles sont dépourvues de cet appui; et malgré l'aridité de ce genre de travail, c'est par là, que doivent commencer tous ceux, qui se proposent d'arriver à des résultats solides.*

*Cuvier Rech. sur les oss. foss. V. Part. II.*



598,7

Wilm. Bist.

## V o r w o r t .

---

Eine Monographie der Papagaien hat der treffliche, uns in der Blüthe seines Lebens leider durch den Tod entrissene, neben meinem unvergesslichen Freunde *Heinrich Boie* aus Kiel, auf Java schlummernde *H. Kuhl* \*) in der ersten Abtheilung des zweiten Bandes der *Verhandlungen der Kaiserl. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher zu Bonn* vom Jahre 1820 mitgetheilt. Diese Arbeit, gleichsam aus dem Größten hervorgeschöpft, hat viel Verdienstliches, ist aber nicht kritisch genug, und muss bei dem raschen Fortschreiten der Entdeckungen in der Ornithologie seit ihrer Entstehung bis jetzt lückenhaft seyn. — *Kuhls* Arbeit schien mir jedoch einer neuen, dabei gänzlichen und sorgfältigen Uebersarbeitung würdig und um so mehr bedürftig, als sie die specielle Kenntniss von Vögeln beabsichtigt, welche unstreitig zu den merkwürdigsten gehören, und

---

\*) *Kuhl* starb in einem Alter von vier und zwanzig Jahren, am 14. September 1821. — Ihm folgten bald der thätige *van Hasselt* und diesem *Heinrich Boie*, dessen letzter Brief an mich mit der Ueberschrift „*Tapos am Fuss des Berges Pangerango auf Java*“ aber ohne Angabe der Zeit, in welcher er ihn schrieb, gerichtet war, und mir von seinen ihm so theuern Reisegefährten, meinen herzlichsten Freunden, Herrn *H. Macklot* und *Müller* zugeschiedt wurde. *Boie* starb am 4ten Sept. 1827.

Oberholzer 29. Sept 47 Oberholzer

wegen der grossen Anzahl ihrer Sippen und Gattungen ganz vorzüglich monographisch behandelt werden müssen.

Während meines Aufenthaltes in Frankreich, England, Holland und in Berlin beschrieb ich daher mit der grössten Sorgfalt alle in den dortigen grösseren oder kleineren (von mir am Schlusse der Beschreibung der einzelnen Gattungen immer angeführten) ornithologischen Sammlungen des Staates, gewisser Gesellschaften oder Privatpersonen befindlichen Papagaien, so wie die unseres hiesigen Museums. So kommt es, dass in dieser Monographie nur wenige Gattungen sich vorfinden, welche ich nicht selbst gesehen und nach der Natur beschrieben habe. — Das Glück war mir günstig, gegen zwei Drittheile der in dieser Monographie aufgeführten Papagaien lebend beobachten zu können, wodurch ich in den Stand gesetzt worden bin, die Färbung ihrer Augen, ihres Schnabels, der häutigen Theile dieses und der nackten des Gesichtes, ihrer Füsse, so wie den Bau ihrer Zunge mit Bestimmtheit angeben, und so eine ziemlich vollständige Beschreibung ihrer äusserlichen Körpertheile den Ornithologen vorlegen zu können.

Aus der ausgezeichneten Sammlung lebender Papagaien Seiner Majestät unseres unsterblichen Königes *Maximilian Joseph*, kamen unserem zoologischen Museum die seltensten Gattungen zu (so z. B. *Forsters Psittacus hysginus* aus der Insel *Eaoowe*, *Psittacus indicus* u. s. w.), welche ich grösstentheils auch anatomisch zu untersuchen, und so Gelegenheit hatte, mit grösserer Sicherheit die Sippen und die zahlreichen Gattungen in ihren verschiedenen Gruppen einander natürlich anzureihen, die Geschlechter zu bestimmen u. s. w. Specielle anatomische Bemerkungen, die ich hieraus ferner gezogen habe, werde ich, da sie nicht in den Kreis einer solchen Monographie gehören, einstens an einer andern Stelle mittheilen.

Erst nach diesen praktischen Beschäftigungen und nach Vollen-

ding der während derselben festgesetzten Classification der Sippen und Gattungen, wodurch ich mir diese sämmtlich so fest eingepägt hatte, dass sie mir, selbst von ihrem Aufbewahrungsorte entfernt, gleichsam in Reihe und Glied vor Augen zu stehen schienen, begann ich ihre oft so höchst verworrene Synonymie zuerst auf dem Papiere ins Reine zu bringen, und dann mit Hülfe meiner an Ort und Stelle nach der Natur entworfenen Beschreibungen, oder mit dem einschlägigen Vogel selbst in der Hand, festzusetzen, und so bin ich sicher, dass auch der schärfste Critiker in Bezug auf diesen Theil der vorliegenden Arbeit meine angestrengteste Sorgfalt nicht verkennen werde, und mich nicht leicht wesentlicher Irrthümer möchte zeihen können.

Ungerne habe ich mich auf *Le Vaillant's* Aussagen über gewisse Gattungen allein verlassen, theils weil ich aus den Beschreibungen mancher derselben, theils aus ihren Abbildungen mit aller Bestimmtheit ersehen konnte, dass er sie aus *Buffon*, vorzüglich aber aus *Edwards* stillschweigend und mit gewissen, absichtlichen Veränderungen, die die That unkenntlich machen sollten, gezogen hatte. — Solche Vögel will dann *Le Vaillant* in der Regel zu Lissabon, oder am Cap, oder an irgend einem anderen entfernten Orte lebend gesehen haben. — Dadurch bin ich in mancher Beziehung misstrauischer gegen diesen sonst so ausgezeichneten, höchst scharfsinnigen und scharfsichtigen Ornithologen geworden, als ich es früher war. Wo ich, bei Ermangelung des natürlichen Gegenstandes, auf solche Weise mehr durch seine als meine Schuld fehlte, möge man es mir verzeihen.

Ueber einen brasilianischen Papagai haben mir Seine Durchlaucht, der hochgefeierte, um die Landes- und Thierkunde Brasiliens, und dadurch um die Wissenschaft hochverdiente *Maximilian Prinz zu Wied* Bemerkungen, und über einige mir dunkel gebliebene Gattungen des alten, thätigen *Marcgrave*, Herr Geheimerath Prof. Dr. *Lichtenstein* nähere Aufschlüsse, und von zweien derselben (*Psit-*

*tacus Paragua* \*) und *Psit. Tarabe*) Abbildungen nach *Marcgraves* Originalgemälden, so wie ferner Abbildungen der *Sittace glauca* und des *Pionus vulturinus* gütigst mitgetheilt. — Diese Hülfe ist mir bei vorstehender Arbeit von beiden Gelehrten geworden; ausserdem hat an derselben Niemand Antheil.

Schmerzlich habe ich wie bei der Ausarbeitung meines *Systema avium*, so auch hier die zweite Auflage von *Lathams Synopsis avium* vermisst. Die Papagaien, welche dort beschrieben sind, bedürfen demnach noch ihrer besondern Betrachtung.

Bei Ausmessungen der Papagaien habe ich mich durchgehends des Pariser Maassstabes bedient.

Geschrieben am Christtage 1830.

---

\*) Wie schon *Buffon*, und nach diesem *Lichtenstein* in seiner schätzenswerthen und nützlichen Abhandlung: *Die Werke von Marcgrave und Piso über Naturgeschichte Brasiliens, erläutert aus den wieder aufgefundenen Original-Abbildungen* (Abhandl. der Königl. Akademie der Wissensch. in Berlin 1815—17. S. 201.) S. 168. ganz richtig vermuthet hatten, dass dieser Vogel kein Americaner seyn möchte, so hat es sich neuerlichst gezeigt, dass er in der That kein solcher, sondern ein Bewohner Australiens ist. Er muss daher in *Marcgraves* Hände über Asien durch Handelsgelegenheit gekommen seyn. — Welcher Landsmann sein *Ps. Tarabe* ist, wird die Zeit lehren. Eine ähnliche Zusammenstellung von brennendem Roth und von Olivengrün, wie an diesem Vogel, bemerkt man am *Psittacus (?) Fieldii* aus Neuholland. Wenn anders man nach dieser Analogie in der Färbung beider Vögel, so wie nach der allgemeinen Körpergestalt, als worin der *Tarabe* mit den übrigen indischen Papagaien seiner Sippe Uebereinstimmung zeigt, schliessen darf, möchte man versucht werden, ihn für einen Bewohner *Neuguineas* oder *Indiens* zu halten. Gewiss aber ist er eben so wenig ein Brasilianer als der *Paragua*!

---

MONOGRAPHIA  
PSITTACORUM.

---

Gedrängter Ueberblick der Geschichte der Papagaien.

**D**ie Papagaien sind so eigenthümlich gebildete Vögel, ihre Sitten von so besonderer Art, und ihr Name, so wie ihre Geschichte, kommt so oft in der menschlichen Gesellschaft zur Sprache, dass selbst derjenige, welcher zum Erstenmale einen dieser Vögel im Leben erblickt, mit Bestimmtheit sagen wird: das ist ein Papagai! Dies setzt einen allen Gattungen der zahlreichen Sippen eigenen Typus in ihrer Gestalt und Lebensweise voraus, der auch auf keine Weise zu verkennen ist. — Wir nehmen bei allen Papagaien einen dicken, hackenförmig abwärts gebogenen, stark aufwärts biegbaren Oberkiefer, einen bauchigen, vorn zugespitzten Unterkiefer, sogenannte Kletterfüsse, welche zwei Zehen vorn, und eben so viele hinten haben, so wie die Gewohnheit wahr, die Nahrung mittelst eines Fusses zum Schnabel zu bringen, und diese mit der Schneide der Unterkiefer-

spitze zu zernagen. Nicht weniger fällt dem Betrachtenden ausserdem ihre Sitte auf, sich mit Hülfe des Schnabels im Steigen von einem Orte zum andern fortzubewegen, und vorzüglich sich damit in die Höhe zu heben. — Die Pracht ihres Gefieders, die schöne und edle Haltung ihres Körpers, eine gewisse Grazie in vielen ihrer Bewegungen, das Zutrauen, welches sie in der Gefangenschaft zu ihrem Wärter und zu allen Bekannten des Hauses zeigen, die grosse Fertigkeit, welche sie in der Nachahmung menschlicher Worte erlangen, die Possierlichkeit, Munterkeit und das äffische Betragen dieser, das ruhige und ernste, von einer gewissen Klugheit gelenkte Verhalten jener, dies alles hat die Papagaien seit den ältesten Zeiten schon, theils zum Gegenstande des Luxus der Reichern, theils des häuslichen Vergnügens oder ernster Forschungen gemacht, und sie, besonders seit Indien durch die Umschiffung des Vorgebirgs der guten Hoffnung dem europäischen Handel zugänglicher geworden, und America entdeckt wurde, gleichsam als lucrative Handelsartikel, ununterbrochen bis diesen Augenblick in ungeheurer Anzahl nach Europa gebracht.

#### Die Papagaien der Alten.

Die älteste Nachricht, welche wir von diesen Vögeln haben, geht bis auf Alexander den Grossen zurück. Dreihundert und dreissig Jahre vor Christus wurde aus Indien durch den Onesikrit, den Befehlshaber über Alexanders Flotte, eine Gattung mit rothem Halsbande gebracht, welche unstreitig unser *Palaeornis Alexandri* ist. *Aristoteles* (Lib. VIII. cap. 12.) scheint diesen Vogel nicht selbst gesehen, und nur aus Erzählungen gekannt zu haben, indem er sagt: *Καὶ τὸ Ἰνδικὸν ὄρνειον ἢ ψιττακὴ τὸ λεγόμενον ἀνδρωπόγλωττον.* — Zwar wollen einige im ersten und zweiten Buche der Könige (I. 10. 22. II. 9. 21.) in dem Worte תוכיים *thoucijim*, oder תוכיים *thuccijim* einen Papagai erkennen, allein der grundgelehrte *Bochart* (*Hiero-*

zoicon P. II. p. 135.) weist mit dem ihm eigenen Scharfsinne nach, dass darunter kein anderes Thier verstanden werden könne, als der Pfau. Auch sind Hiobs רננים *renanim* (Cap. 39.) weder Pfauen noch Papagaien, sondern, wie sich das aus der Erzählung von den Sitten dieser Vögel deutlich ergibt, Strausse. Der Vogel אנפה *anapha* der Hebräer, abgeleitet von ענף *anaph*, Ast, weil er sein Nest an den äussersten Aesten der Bäume schwebend aufhängt, von *Bochart* für einen, mit dem Vogel عيظ *zumag* der Araber vielleicht identischen Adler, von andern bald für eine Eule, Trappe, einen Regenpfeifer oder Specht, sowie auch für einen Papagai gehalten, ist doch sicher kein anderer, als unser Pirol, *Oriolus Galbula*, welcher wohl im Herbste von Europa auch in das gelobte Land der Hebräer, nach Syrien, wandert.

Etwa fünfzig Jahre v. Chr. spricht *Diodorus Siculus* auch von Papagaien, welche im äussersten Syrien wohnen (Lib. II.), mit den Worten: „Αἰ δὲ τῆς Συρίας ἑσχατιαὶ ψιττακῆς, καὶ πορφυρίωνες, καὶ μελεαγρίδας (ἐκτρεφουσι)“ und etliche fünfzig Jahre n. Chr. wurden, wie *Plinius* berichtet (Lib. VI. cap. 29.) von den Abgeordneten des Kaisers *Nero* auf der äthiopischen Insel *Gaugades* Papagaien, und weiterhin auch Affen entdeckt. — *Diodors* Papagaien, welche ohne Zweifel aus Africa nach Syrien gekommen waren, so wie die der Insel *Gaugades*, müssen gewiss mit dem Papagaie verbunden werden, von welchem *Hasselquist* in seiner Reise sagt, dass er aus Aethiopien in grosser Anzahl nach Cairo zum Verkauf gebracht werde (wie noch heutiges Tages dies der Fall ist), und welchen er *Psittacus cubicularis* nennt. Ich glaube auch, dass man zu demselben Vogel, und nicht zu dem oben angeführten *Palaeornis Alexandri* (wovon *Aldrovand* zuerst eine Abbildung gegeben hat, Ornith. p. 679.) den andern *Psittacus* des *Plinius* hinzuziehen müsse, von welchem dieser sagt: „India hanc avem mittit (*Psittacum*), viridem toto corpore, torque tantum miniato in cervice distinctam (Lib. 10. c. 58.)“; denn

die Worte: „*viridem toto corpore*“ machen die Hypothese, dass *Plinius* den sowohl dem jungen als alten *Palaeornis Alexandri* eigenthümlichen rothen und sehr augenfälligen Schulterfleck unberücksichtigt gelassen habe, durchaus verwerflich. Es ist aber möglich, dass man diesen Papagai mit dem sehr ähnlichen *Palaeornis Alexandri* verwechselte (wie dies bis zur neuesten Zeit noch geschah), und somit auch Indien als sein Vaterland angab.

*Apulejus*, welcher gegen das Ende der Regierung Hadrians geboren wurde, beschreibt diesen Papagai (*P. cubicul.*) durchaus übereinstimmend mit *Plinius*, und giebt gleichfalls, aber dabei wahrscheinlich auf *Plinius* Autorität gestützt, Indien als sein Vaterland an (Lib. II. num. 12.). Den jungen Vogel dieser Gattung, welcher noch kein Halsband hat, beschreibt zuerst *Kiranides*.

Von *Alexander* bis *Nero* hatte man also zwei verschiedene Gattungen von Papagaien aus zwei Welttheilen kennen gelernt. — Bald nach ihrer Entdeckung wurden sie wegen ihrer Schönheit, aber vorzüglich wegen ihrer Gabe, menschliche Worte auszusprechen, in der Art ein Gegenstand des Luxus bei den Römern, dass einst der strenge Censor Marcus Portius Cato im versammelten Rathe ausrief: „O ihr Senatoren! o unglückliches Rom! welche Vorbedeutung für dich! In welche Zeiten sind wir verfallen, da wir Weiber Hunde auf ihrem Schoose ernähren, und die Männer Papagaien auf der Hand tragen sehen!“ — Man setzte diese Vögel in Käfige von Silber, Schildpat und Elfenbein (*Stattus* in psit.), und der Preiss eines einzigen derselben überstieg nicht selten den von einem Sclaven. Ein eisernes Stäbchen war das Werkzeug ihres Lehrers, womit er sie auf den Kopf schlug, wenn er sie für Aufmerksamkeit während des Unterrichtes empfänglicher machen wollte. Zu solchen Zöglingen wurden nur junge und zweijährige Vögel gewählt, da die Ueberzeugung lehrte, dass die alten ungelehrig und vergesslich seyen (*Apul.* Lib. II. num. 12.). — Man lehrte sie vorzüglich den Namen Caesar



aussprechen (*Martial* Epig. L.). Dass sie in grösster Anzahl nach Rom gebracht wurden, geht daraus hervor, dass der schwelgerische Kaiser Heliogabal seine Gäste ausser mit Gehirnen von Flamingos und Drosseln, mit Zungen von Nachtigallen und Pfauen, auch mit Köpfen von Papagaien bewirthete, und Papagaien selbst seinen Löwen zur Nahrung vorwerfen liess \*). — In Indien hielt man, nach *Aelian*, die Papagaien, wo sie nach der Versicherung des *Plinius* den Namen *Sittace* führten (daher der griechische Name *ψιττανός* und der lateinische *psittacus*), für heilig, und die Könige hatten sie zur Zierde in ihren Gärten und in ihrer nächsten Umgebung. — Sie waren Lieblinge der Dichter, und wurden von diesen besungen. Ergreifend ist *Ovids* Elegie auf den Tod von Corinna's Papagai \*\*).

\*) Comedit saepius ad imitationem Apicii calcanea Camelorum, et cristas vivis gallinaceis demptas, linguas pavonum et lusciniarum; quod qui ederet ab epilepsia tutus diceretur. Exhibuit et palatinis ingentes dapes extis mullorum refertas, et cerebellis phoenicoptera, et perdicum ovis, et cerebellis turdorum, et capitibus psittacorum, et fasianorum, et pavonum. Jecit et uvas apamenas in praesepia equis suis: et psittacis atque fasianis leones pavit et alia animalia. *Ael. Lamprid.* vit. Heliog. Script. Hist. Rom. Tom. III. p. 965. Ed. Hen. Steph. 1568.

\*) *Psittacus, Eois imitatrix ales ab Indis, Quid vox mutandis ingeniosa sonis?*  
*Occidit. Exsequias ite frequenter, aves. Quid juvat, ut datus es, nostrae placuisse*  
*Ite, piae volucres, et plangite pectora pennis; puellae?*  
*Et rigido teneras ungue notate genas.*

\* \* \*

*Pro longa resonent carmina vestra tuba,*

\* \* \*

*Omnes, quae liquido libratis in aere cursus,*  
*Tu tamen ante alias, turtur amice, dolo.*  
*Plena fuit vobis omni concordia vita,*  
*Et stetit ad finem longa tenaxque fides.*  
*Quod fuit Argolico juvenis Phoceus Orestae;*  
*Hoc tibi, dum licuit, Psittace, turtur erat.*  
*Quid tamen ista fides? quid rari forma coloris?*

*Infelix avium gloria, nempe jaeces.*  
*Tu poteras virides pennis hebetare smaragdos,*  
*Tincta gerens rubro Punica rostro croco.*  
*Non fuit in terris vocum simulantior ales:*  
*Reddebas blaeso tam bene verba sono.*  
*Raptus es invidia, Non tu fera bella movebas*  
*Garrulus, et placidae pacis amator eras.*

\* \* \*

*Plenus eras minimo; nec prae sermonis amore*  
*In multos poteras ora vacare cibos.*

\* \* \*

Nicht weniger schimmert unter den übrigen Dichtungen auf Papagaien die des *Krinagoras* (*Anthologia graeca. Cur. Jacobs. II. p. 199. n. 562.*) hervor \*):

Einige Decennien nach *Ovid* besang auch *Statius* seinen geliebten Papagai, und beginnt sein Epicedion mit den Worten \*\*):

Nach *Apulejus*, welcher um die Mitte des zweiten Jahrhunderts n. Chr. blühte, verschwinden die Papagaien bis zum Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts aus der Geschichte; wenigstens lehrt diese uns in diesem langen Zeitraume nicht eine einzige neue Gattung jener kennen. —

### Die Papagaien Asiens.

Bis zu Ende des 15ten Jahrhunderts erhielt Europa alle köstlichen Waaren Indiens, und so auch dessen Papagaien, nur aus der zweiten Hand, entweder über Aegypten, wohin sie auf dem arabischen Meerbusen kamen, oder auf einem langen Karavanenwege durch das innere Asien. Diese Vögel waren daher damals in Europa, vorzüglich in dessen nicht südlich gelegenen Ländern, noch immer eine ziemlich seltene Erscheinung, um so mehr, als die Venetianer und

---

*Quid referam timidæ pro te pia vota puellæ; Et stabat vacua jam tibi Parca colo.*  
*Vota, procelloso per mare rapta Noto? Nec tamen ignavo stupuerunt verba palato.*  
*Septima lux aderat, non exhibitura sequentem: Clamavit moriens lingua, Corinna, vale.*

\*) Ψιττακὸς ὁ βρώτόγῃρυς, ἀφείλ λυγοτευχία κύρτον, ἤλυθεν ἐς δρυμοὺς ἀνδοφνεῖ πτέρυγι.  
 αἰεὶ δ' ἐκμελετῶν ἀσπάζμασι, Καίσαρα κλιών,  
 οὐδ' ἀν' ὄρη λήθην ἤγαγεν οὐνόματος. ἕδραμε δ' ὠκυδίδακτος ἅπας οἰωνός, ἐρίζων  
 τίς φθῆναι δύναται δαίμονι χαῖρ' ἐπέειπεν.  
 Ὀρφεὺς θῆρας ἐπειδὴν ἐν οὐρέσιν αἰεὶ δὲ σέ, Καίσαρ,  
 νῦν ἀκέλευστος ἅπας ὄρνις ἀνακρέκεται.

\*\*\*) Psittace, lux volucrum, domini facunda Occidit aëriæ celeberrimæ gloria gentis.  
 voluptas,

Genueser den indischen Handel allein in Händen hatten. Dem höheren Norden waren sie bis jetzt noch ganz fremd geblieben, oder man kannte sie dort nur aus Erzählungen und Gemälden.

Die Umschiffung des Vorgebirgs der guten Hoffnung, welches *Barth. Diaz* 1486 entdeckt hatte, durch *Vasco de Gama* im Jahre 1498, die den Seeweg zu Indiens Reichthümern zeigte, brachte die Portugiesen in den Besitz eines Reiches in Asien. Von nun an wurden häufiger Papagaien aus Indien nach Europa gebracht, und schon ist es kaum mehr möglich, dem geschichtlichen Gange in der Entdeckung der einzelnen Gattungen dieses Landes zu folgen. *Franz von Almeida*, der erste portugiesische Vicekönig in Indien (von 1505—9.) gründete überall, wo seine Schiffe landeten, Handelsniederlassungen, und nahm 1506 Ceylon in Besitz. Dadurch, und dass sein Nachfolger in der Verwaltung, *Alfons von Albuquerque* (von 1510—15), Malakka eroberte, wo sich die Handelsschiffe von Japan, Sina, den Molukken, von Bengalen, Persien, Arabien und Africa sammelten, wurden jetzt sowohl indische als africanische Papagaien in Europa ziemlich gemein, und Loris und Kakatue bereits in den europäischen Seestädten zum Verkaufe ausgedoten. Diese führten nach *Scaliger* (*Exercitation. exotic. lib. XV. de subtilitate ad Cardanum. Par. 1557.*) auf *Badan*, einer Java nahe gelegenen Insel, den Namen *Cachi*, d. h. *kostbar*, jene dagegen den Namen *Nor* (woraus, wie es scheint, ihr anderer, *Lori*, entstand), welcher *glänzend* bedeutet.

Im Jahre 1599 beschrieb *Aldrovande* (Ornith. I. p. 667.) unter der Aufschrift: „*de psittaco albo cristato*“ ausführlich und auf bestimmte Weise zuerst einen Kakatu, welcher im Besitze des Fürsten Alexander Farnese war. Auch gab er eine Abbildung von diesem Vogel. Obgleich dieselbe mittelmässig ist, so erkennt man doch in ihr, mit Hülfe der Beschreibung, unsere *Cacatua cristata*. Als *psittacus*

*erythrochlorus macrouros* wird von demselben Autor (p. 681.) unsere *Charmosyna papuensis* beschrieben, für welche ihn aber bis jetzt noch Niemand erklärt hatte. Auch bringt *Aldrovande* im dritten Bande seiner Ornithologie (pag. 560.) eine *avicula ex Malacca* zu unserer Kenntniss, in deren Beschreibung und Abbildung man mit Bestimmtheit die weibliche *Psittacula Galgulus* erkennt. — Im Jahre 1605 machte *Clusius* (*Exoticor. libri X. Fol. p. 364.*) unter dem Namen „*Noyras*“ *Linné's Psittacus garrulus* (von welchem er sagt, dass einer, der von Java nach Amsterdam gebracht wurde, 170 holländische Gulden kostete), und einen „*psittacus minimus*“ p. 365. bekannt, welcher, wie dies auch die beigefügte Abbildung lehrt, die allerliebste *Psittacula pullaria* ist. — Gross ist die Anzahl von indischen Papagaien, die darauf im achtzehnten Jahrhundert durch *Albin*, *Edwards*, *Brisson*, *Sonnerat*, *Buffon* u. a., so wie mit dem Beginnen des neunzehnten durch *Le Vaillant*, nachher durch *Kuhl*, *Temminck* u. a. bekannt gemacht, und grösstentheils auch abgebildet wurden.

#### Die Papagaien Africa's.

Es war im Jahre 1455, als *Aloysius Cada Mosto* aus Venedig, ein junger Mann voll Unternehmungsg Geist, in den seit fünf Jahren entdeckten Senegal einlief, und darauf, nachdem er seinen Lauf nach dem grünen Vorgebirge gerichtet hatte, auch an die Mündungen des Gambia kam. Nach seiner Erzählung (*Prima navigazione per l'Oceano alle terre de' Negri della bassa Etiopia di Cada Mosto. Vicenza 1507.*) wimmelt es am Senegal von einem grünen Papagaie mit gelbem Bauche und grauem Kopfe. Niemand verkennt in dieser Beschreibung den *Pionus senegalus*, welcher im Jahre 1695 von *Lemaire* gleichfalls am Senegal angetroffen und beschrieben wurde. Auch gedenkt *Cada Mosto* des seit *Plinius* bekannten *Palaeornis cubicularis*.

Die dritte Gattung aus diesem Welttheile, *Psittacus Erithacus*, wird im Jahre 1550 durch Deutschlands Plinius, durch *Gesner*, diesen Wiedererwecker der seit Jahrhunderten schlummernden Naturgeschichte, mit den Worten: „*cinereum quoque (psittacum) vel subcoeruleum toto corpore, pictum habeo, in cauda tantum rubentibus pennis, parte circa oculos candida*“ bekannt gemacht. Im Jahre 1646 beschrieb *Aldrovande* denselben Vogel als *psittacus cinereus* (Ornithol. I. p. 675.); so wie eine rothschäckige Abart hiervon, die er mit dem Namen *psittacus erythroleucus* belegt, und die sich bis auf den heutigen Tag in den Systemen der Compileratoren erhalten hat. Von beiden Vögeln giebt *Aldrovande* sehr erkenntliche Abbildungen. — Diese Gattung war nach *Aldrovande* in Europa allgemein, und wegen ihrer besondern Gelehrigkeit eine der gesuchtesten und beliebtesten, wie dies selbst jetzt noch der Fall ist. — Um die Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts entdeckte man auf Madagascar einen ganz schwarzen Papagai (*Fr. Cauche*, Voy. à Madagasc. Par. 1651., *Flaccourt* Voy. à Madagasc. Par. 1661.), unsere *Coracopsis atra*, und im Jahre 1760 wurde von *Brisson* (Ornith. 4. p. 315.) eine damit verwandte Gattung von eben daher, *Coracopsis mascarina*, so wie eine sehr kleine Species, *Psittacula cana*, auf Madagascar, St. Mauritius und St. Franciscus heimisch, beschrieben. Darauf lernte man nach der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts *Psittacula roseicollis* vom Vorgebirge der guten Hoffnung, und *Pionus Le Vaillantii* vom Kaffernlande kennen. — Dem unermüdlchen *Rüppel* war es bis jetzt allein vorbehalten, auch in diesem Jahrhunderte im nördlichen Africa eine mit dem *Pionus senegalus* zunächst verwandte Species zu entdecken (*Pion. Meyeri*). — So lernten wir also aus dem ungeheueren Africa seit Nero bis auf den heutigen Tag, mithin in einem Zeitraume von etwa 1800 Jahren, nur 9 Gattungen von Papagaien kennen \*)! —

---

\*) Im Falle nicht auch *Pionus guineensis* und *Psittacula Swindereniana* Africaner sind.

## Die Papagaien America's.

Kaum hatte *Christoph Columbus* im Jahre 1492 America entdeckt, als auch schon einige Jahre darauf Araren, Sittiche und sogenannte Amazonenpapagaien aus diesem paradiesischen Lande in grosser Anzahl nach Europa verführt wurden. Hier erregten sie durch die Pracht ihres Gefieders die Bewunderung aller, die sie sahen, und am Glanze und an der schönen Gestalt der *Sittace Ararauna*, oder *S. Aracanga* vor dem Pallaste oder im Lustgarten eines Fürsten, konnte sich die gaffende Menge nicht satt sehen. — Papagaien waren die ersten Thiere, welche *Columbus* im neuen Welttheile aufstiegen, und Gegenstände des ersten Tauschhandels mit den Eingebornen. Als dieser unerschrockene Seefahrer auf seiner zweiten Reise im Jahre 1493 nach Guadeloupe kam, sah er daselbst Araren, die man *Gua-camayos* \*) nannte (*Herrera* Lib. II. cap. 10.). Die erste Nachricht von der hiehergehörigen, ehemals auf den Antillen gemeinen *Sittace Aracanga* fällt mithin in das Jahr 1493, doch erhalten wir eine genauere Beschreibung und Abbildung von diesem Vogel erst gegen die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts durch *Gesner*, welcher ihn *Psittacus erythroxanthus* nennt (*Ornith.* p. 720.). Genau unterscheidet davon der unsterbliche Naturforscher die mit ihm nahe verwandte brasilianische *Sittace Macao* als *Psittacus erythrocyanus* (p. 721.). Die köstliche, lasurblaue *Sittace Ararauna* wurde um das Jahr 1550 von dem Franciscanermönche *André Thevet* (*Singularités de la France antarctique.* Paris 1558. p. 92. *Carinde Ges.* l. c. p. 208.) in Brasilien entdeckt, und von ihm, so wie im Jahre 1578 von *Lery* (*Voy. au Brésil.* Paris 1578. p. 171.), nachher auch

---

\*) Dieser Name wird, nach *Azara's* Zeugniß, noch heutiges Tages in Paraguay von den Guaranis den dortigen Araren gegeben.

von *Aldrovande* als *Psittacus maximus cyanocroceus* beschrieben (Ornith. I. p. 663. c. fig.). Die Wilden nannten nach *Thevet* diesen Vogel *Canindé*, ein Name, welcher gegenwärtig noch in *Paraguay* einer der *S. Ararauna* sehr nahe stehenden Gattung beigelegt wird.

Gegen Ende des siebenzehnten Jahrhunderts wurde von dem Seefahrer *Georg Spielberg* in der hohen Breite des Portfamine in der magellanischen Strasse (unter  $53^{\circ} 44'$  südlicher Breite) ein Papagai (*Sit. smaragdina?*) und eben daselbst derselbe Vogel auch von *Dampier* (1687) beobachtet.

Die sogenannten Amazonenpapagaien lernte man erst gegen Ausgang des siebenzehnten Jahrhunderts durch *Aldrovande* kennen, welcher hievon drei Gattungen, nämlich den *Psittacus poecilorhynchus*, *Psit. ochrocephalus*, und *Psit. leucocephalus* beschreibt. Eine vierte von ihm angeführte und abgebildete Gattung ist vielleicht auf eine Abart des *Pionus menstruus* zu beziehen. Im Jahre 1605 beschreibt *Clusius* (Exotic. p. 365.) den prachtvollen *Deroptus accipitrinus* als *Psittacus elegans*, und fügt seiner Beschreibung eine sehr artige Abbildung des Vogels hinzu, so wie *Ynca Garcilasso de la Vega* aus Cusco in America (geb. 1540, gest. 1620) in seiner *Historia de las antiguedades y conquista del Peru* (die zu Lissabon im Jahre 1609 in Fol. erschien) von einem Sittich in Peru eine Beschreibung giebt, in der man augenblicklich die dortselbst noch höchst gemeine *Sittace militaris* erkennt, welche, nach Angabe der Historiker, den alten Incas von Peru von den Unterthanen zum Geschenk gebracht wurde, um damit die königlichen Palläste zu zieren.

*Franz Hernandez* bearbeitete auf Befehl Philipps des Zweiten, dessen erster Leibarzt er war, eine Naturgeschichte der Thiere und Pflanzen Mexicos, welche in der Stadt Mexico in einem Auszuge

von *Ximenes* im Jahre 1615 erschien, und, wenn sie so, wie sie *Hernandez* ausgeführt hatte, auf uns gekommen wäre, der Wissenschaft von grossem Interesse und Nutzen gewesen seyn würde. So aber besitzen wir in einem von *Nardo Antonio Recchi* veranstalteten, durch peinigende Scholien von *Terrentius*, *Faber* und *Fab. Columna* verunstalteten Auszuge, welcher 1651 in Rom unter dem Titel: „*Rerum medicarum Novae Hispaniae thesaurus*“ erschien, leider nur einen kleinen Theil vom Werke *Hernandez's*, welches nicht weniger als sechzig tausend Ducaten gekostet zu haben scheint. — *Hernandez* beschrieb in diesem Werke mehrere Papagaien Mexicos, wovon aber bis jetzt nur zwei mit Gewissheit erkannt wurden, nämlich *Sparrmanns Psittacus albigrons*, und *Temmincks Psittacus Pretrei*; — Bekannt sind die Kunstwerke der Mexicaner, welche sie von Vogel-, und namentlich von Papagaienfedern verfertigten. *Hernandez* erzählt, dass die Mexicaner, da sie unter sich einen Handel mit Papagaienfedern trieben, sich eine gewisse Anzahl von Bäumen zueigneten, in welchen diese Vögel nisteten, und dass diese Papagaienbäume von Einem auf den Andern fortgeerbt wurden (*Hernand. Thes. p. 48. cap. 117.*).

Im Jahre 1636 wurde der Graf *Johann Moritz* nachmals Fürst von *Nassau-Siegen* in Staatsangelegenheiten als Befehlshaber einer bedeutenden holländischen Macht nach Brasilien gesandt. Dieser, ein Freund der Naturgeschichte, liess von seinen gelehrten Begleitern, seinem Leibarzte *Wilhelm Piso* und dem Astronomen *Georg Marcgrave* von Liebstädt bei Meissen, die Pflanzen und Thiere des Landes sammeln, beschreiben und abbilden. 1648 erschienen *Marcgrave's* naturhistorische Abhandlungen in der bekannten *Historia naturalis Brasiliae*. In ihr wurden *Sit. aurea*, *Sit. Jendaya*, *Sit. versicolor*, *Sit. Tui*, *Sit. Tuipara*, *Sit. severa*, *Sit. lutea*, *Sit. Makavuanna*, *Psittacus amazonicus*, *Psit. Tarabe* und die liebliche *Psittacula passerina* zum Erstenmale beschrieben. Zwei andere von



*Marcgrave* angeführte Gattungen kannte man vor ihm schon durch *Gesner* (*Sit. Macao*) und *Aldrovande* (*Psit. ochrocephalus*).

Ein Papagai, welcher aus südlicher gelegenen Gegenden im Herbste schaaarenweise nach Carolina wandert, und bis nach Virginien vordringt, *Sit. ludoviciana*, wurde von *Catesby* (*Natural-History of Carolina* caet. Lond. 1731. u. 1743.) in den ersten Decennien des verwichenen Jahrhunderts entdeckt, beschrieben und abgebildet. *Charlevoix* beobachtete denselben Vogel nach *Catesby* in Luisiana (*Hist. de la nouv. France*. Par. 1744 III. p. 384.). — Nun folgen wieder in der Bekanntmachung neuer Gattungen aus America *Edwards*, *Brisson*, *Buffon*, *Azara*, *Le Vaillant* u. a., und in der neuesten Zeit *Vicillot*, *Kuhl*, der Prinz *Maximilian* zu *Wied*, *v. Spix* und einige andere.

#### Die Papagaien Australiens.

*Marcgrave* scheint der erste zu seyn, welcher im *Paragua*, und wahrscheinlich auch in seinem *Tarabe*, australische Papagaien (beide Vögel aber angeblich als brasilianische) beschreibt. — Die Bekanntwerdung des durch seinen sonderbaren Zungenbau sich vor allen übrigen Papagaien so sehr auszeichnenden *Microglossus aterimus* fällt in das Jahr 1707, zu welcher Zeit, nach *Edwards* Bericht, in Amsterdam ein gewisser van Meulen eine Abbildung dieses Vogels herausgab, der die Edwards'sche nachfolgte. Diesen folgt *Brisson*, durch welchen wir den *Platycercus amboinensis* aus Neuguinea, und den durch Farbenpracht ausgezeichneten *Trich. multicolor* aus Neuholland kennen lernen. Im Jahre 1768 beobachtete *Bougainville* kleine blaue und rothe Papagaien auf O-Tahiti, *d'Entrecasteaux* (*Voy. II. p. 47. t. x.*) den stattlichen *Pezoporus formosus* in Neuholland, *Parkinson* (*Hawkesw. Voy. Vol. II. p. 18.*) eben daselbst einen grossen, langschwänzigen,

schwarzen Kakatu (*Calyptorhynchus*), welchen *Latham* späterhin mit *Banks* Namen belegte. — Mehrere Gattungen wurden in Neuholland von *Banks* und *Solander* während *Cooks* erster (1769), und während dessen zweiter Reise um die Welt (1772) von den beiden *Forstern* auf den Inseln der Südsee beobachtet. Die Letzteren entdeckten auf Neuseeland den einzig in seiner Sippe dastehenden *Nestor hypopolius* und den *Platycercus Novae-Seelandiae*, auf Neucaledonien den schmucken *Nymphicus bisetis*, auf O-Tahiti, Oriadea und andern in der Nähe liegenden Inseln *Platycercus pacificus* und den prachtvollen *Coriphilus euchlorus*, auf Tanna *Trichogl. palmarum*, und auf Eaoowe *Platycercus hyeginus*. Im Jahre 1781 und in den darauf folgenden Jahren erschien *Lathams General-Synopsis of Birds*, in welcher viele Papagaien Australiens zu unserer Kenntniss gebracht werden. Auch *Phillips Voyage to Botany-Bay* (1789), *Whites Journal of a Voyage to New-Southwales* (1790), und *Shaws Naturalists Miscellany* (1789), so wie dessen *Zoology of New-Holland* (1794) enthalten mehrere neue Papagaien aus Australien. Durch die Bemühungen der Engländer kommen noch immer prachtvolle Gattungen aus diesem merkwürdigen, nur längs seines Randes untersuchten Welttheile zu unserer Kenntniss.

---

Europa ist der einzige Welttheil, welcher keine Papagaien besitzt. Mit Ausnahme weniger sind diese auf die Tropenländer beschränkt. America besitzt die meisten Gattungen \*), denn es zählt deren gegenwärtig mit Bestimmtheit 83. Darauf folgt Australien, von wo 66, und dann Asien, von wo 43 Gattungen bekannt sind. Etwa sechs

---

\*) Ich zähle hier nur die genau gekannten. Die Zahl der übrigen mir unbekannt gebliebenen Papagaien ist aus dem Anhang zu ersehen, den ich den Beschreibungen der ersteren nachgesetzt habe.

Gattungen (*Platyc. Novae-Guineae*, *Domic. punicea*, *Domic. atricapilla*, *Psittacodis magna*, *Psittacula batavensis*, *Cac. sulphurea*) scheint Asien mit Australien gemeinschaftlich zu besitzen. In Africa hat man bis jetzt nur zehn Gattungen entdeckt, unter welchen sich nur eine einzige keilchwänzige (*Pal. cubicul.*) befindet, und deren eine (*Psit. Swinder.*) einem andern Welttheile angehören dürfte. Das Vaterland einiger anderer Papagaien ist noch nicht ausgemittelt.

Nördlich geht eine Gattung dieser Vögel (*Sit. ludovic.*) zwei bis drei Grade über Pensylvanien hinaus, südlich sind *Nestor hypopolius* und *Platycercus Novae-Seelandiae* von *Forster* noch unter einer Polhöhe von  $46^{\circ}$  in einem höchst unfreundlichen Klima, nämlich in der Dusky-Bay auf Neuseeland, in Patagonien *Sittace patagonica* von *Lesson*, eine andere (*Sit. smaragd.*?) von *Spielberg*, *Dampier*, und in der neuesten Zeit auch von *King* in der Magellansstrasse, welche unter  $53^{\circ} 30'$ , und *Platycercus erythrotis* auf der Insel Macquarie, die unter  $54^{\circ} 45'$  südlicher Breite liegt, beobachtet worden. Hierdurch wird also die frühere, von *Buffon* ausgehende Annahme, dass die Papagaien nur eine Zone von fünf und zwanzig Graden auf jeder Seite des Aequators bewohnen, vollkommen widerlegt. In den Anden lebt *Sittace militaris* noch in einer Höhe von 3000'.

#### Gedrängter Vergleich der Papagaien mit den Nagern und Einiges über ihre Stellung im natürlichen Systeme.

Ich führe hier zum Theil Einiges von dem an, was ich hierüber in meinem Buche: „*Natürliches System der Amphibien mit vorangehender Classification der Säugthiere und Vögel*“ (München, Stuttgart und Tübingen. Cotta 1830.) S. 110. kürzlich mitgetheilt habe.

Man sagt, die Papagaien entsprächen den Affen und seyen diese unter den Vögeln: allein diese Ansicht oder Behauptung ist, wie ich sogleich zeigen werde, unrichtig \*). Die Papagaien entsprechen vielmehr den *Nagern*, und stellen diese unter den Vögeln vor. Dies beweist der Bau ihres Kopfes und ihre Lebensweise.

Der Gelenkfortsatz des Unterkiefers ist nicht, wie bei allen übrigen bis jetzt bekannten Vögeln, der Quere, sondern, wie bei den *Nagern*, der *Länge nach* mit dem Schädel eingelenkt, und der obere liegt viel höher als die Gaumenbögen (bei den *Nagern* höher als die Zahnkrone), wodurch, wie bei den *Nagern*, seine Bewegung nach hinten und vorn frei, nach den Seiten gänzlich beschränkt, und die Möglichkeit zu nagen bezweckt wird.

Weder, wie schon bemerkt, bei einem anderen Vogel, noch bei einem anderen Säugethiere findet eine ähnliche Einlenkung des Unterkiefers in den Schädel statt.

Die Kieferüberzüge der Papagaien entsprechen nach ihrer Verrichtung \*\*), Gestalt, so wie durch ihr Reproductionsvermögen den Schneidezähnen der *Nager*. Mit der Schneide der *Unterkieferspitze*

---

\*) Die Papagaien haben mit den Affen nichts anderes gemein, als ihre Possierlichkeit; allein diese ist den Eichhörnchen und einigen anderen *Nagern* nicht weniger eigen, als den Affen.

\*\*\*) Finken, Kernbeisser u. s. w. zersprengen wohl auch die Samenhülsen, allein nur mittelst des *seitlichen* Randes der Ladenscheiden, was mit dem Zerkleinern der Nahrungsstoffe der Säugethiere mittelst ihrer Backenzähne vergleichbar ist. Eulen und Hachte bedienen sich beim Fressen, wie die Papagaien, gleichfalls nur der Kieferspitze (und der Schnabel dieser Vögel ist desshalb auch nach seiner allgemeinen Gestalt dem Schnabel eines Papagais nicht unähnlich); allein sie zermalmen damit nicht den Frass. Auch tritt hier noch ein anderer, wesentlicher Fall ein. Bei den Papagaien ist es nämlich der Unterkiefer, bei den Hachten dagegen der Oberkiefer, welcher die Nahrung zerstückt. Die übrigen Vögel verschlucken ihre Nahrung ganz, oder zerdrücken sie vorher, indem sie sie quer zwischen die Kiefer legen.

zerfeilen die Papagaien, wie die Nager mit dem Meißel ihrer *unteren Schneidezähne*, die Nahrungsstoffe \*). Die Spitze des Oberkiefers

\*) Von lebenden Papagaien, welche vor mir stehen (*Psitt. leucoceph.*, *Pionus senegalus*, und *Sittace Tirica*), habe ich nachfolgende Beobachtungen. — Dass bei den Papagaien der Oberkiefer mit der Stirne in einem so hohen Grade beweglich eingelenkt sey, wie bei keinem anderen Vogel, und dieser dadurch hoch emporgerichtet und wieder senkrecht herabgezogen werden könne, ist eine bekannte Sache. Ich war anfänglich der Meinung, dass diese Vorkehrung am Schnabel allein nur dazu diene, damit der Vogel in die Mundöffnung, welche, so lange nicht der Oberkiefer in die Höhe gezogen ist, durch die Krümmungen der beiden Kieferspitzen sehr verengert wird, noch Früchte von ziemlichem Umfange aufnehmen könne: allein später überzeugte ich mich, dass mit dieser Beweglichkeit des Oberkiefers auch noch ein anderer, und zwar ein sehr merkwürdiger Endzweck verbunden sey. Sobald nämlich meine Papagaien irgend einen harten Nahrungsstoff zernagt haben, drücken sie den Oberkiefer senkrecht gegen die Spitzenschneide des Unterkiefers herab, der nun bald zurückgezogen wird (ein Vermögen, welches allein durch den länglichen Gelenkfortsatz des Unterkiefers bewirkt werden konnte), bald sich mit seiner Spitzenschneide gegen die Innenseite der Oberkieferspitze so stark vorwärts schiebt und stemmt, dass dadurch ein Ton entsteht, der dem von einer Rassel hervorgebrachten gleicht, mit welcher man über die scharfe Kante einer Hornplatte hinfuhr. — Ich gab nun auch genau auf die Zeit Acht, in welcher diese Reibungen der Unterkieferspitze gegen die Innenseite der Oberkieferspitze statt fanden, und überzeugte mich, dass sie von dem Vogel immer nur dann ausgeführt wurden, wenn derselbe, wie schon oben bemerkt, einen harten Körper benagt, und dadurch die Schneide der Unterkieferspitze abgestumpft hatte. — Ich untersuchte daher von Neuem die Structur der Kieferscheiden, und es wurde mir dabei mit Einemmale der Nutzen der, in dieser Art:



auf der Innenseite der Oberkieferspitze hintereinander gestellten emporspringenden, am vorderen Rande scharfen Leisten erklärlich. Diese bilden im Schnabel der Papagaien eine eigentliche Feile, an welcher die Unterkieferschneide nach Bedürfniss auf die angeführte Weise geschärft wird! —

So darf man nun mit ziemlicher Gewissheit annehmen, dass diejenigen Papagaien, deren Schnabelfeile sehr entwickelt ist, sich von harten Früchten, wenigstens zum Theil auch von solchen, ernähren, dagegen diejenigen weiche geniessen, deren Feile wenig entwickelt ist, oder denen eine solche gänzlich fehlt.

Bei allen Papagaien, deren Unterkiefer auf seiner Dille sehr erweitert, und daselbst seitlich mehr oder weniger kantig ist, und welcher eine wagrechte Spitzenschneide hat, mithin bei allen *americanischen* Papagaien, eben so auch bei den Papagaien *Indiens* mit ähnelicher Unterkieferbildung (die beiden rothen Gattungen *Eclect.*

dient, gleich den obern Schneidezähnen jener Säugthiere, nur als Anstimmungspunkt des zu benagenden Gegenstandes, und besitzt deshalb auf ihrer Innenseite einen Quervorsprung, der eben daselbst auch den obern Schneidezähnen der Nager eigen ist \*). Diesem Vorsprunge steht bei den Papagaien die Schneide des Unterkiefers, bei den Nagern der Meißel der untern Schneidezähne gegenüber. — Die beiden Kieferscheiden bilden bei den Papagaien, wie die obern und untern Schneidezähne bei den Nagern, Behufs des Nagens einen Halbkreis. —

Die Schneidezähne der Nager haben (wie alle hohlwurzelligen

---

*grandis* und *Linnaei* sind hievon nicht ausgenommen), und bei allen africanischen habe ich diese Feile beobachtet.

Ich fand ferner, dass dieselbe allen denjenigen Papagaien Asiens und Australiens fehlt, deren Unterkieferdille seitlich sehr zusammengedrückt, dabei sehr schmal, auf ihrer vordern Seite gerundet, und am Ende etwas zugespitzt ist, und welche eine bewimperte Zunge haben. Es lässt sich daher annehmen (der Bau ihrer Zunge allein schon berechtigt hiezu), dass diese Gattungen weiche und saftige Früchte fressen. — Die langschwänzigen, schwarzen Kakatue Neuhollands, deren Unterkiefer sehr massiv ist, haben gleichfalls keine Feile am Schnabel. Leider wissen wir nur wenig von den Sitten dieser sehr sonderbar gebildeten Papagaien.

Noch muss ich auch der sonderbaren, vertical-mauerförmig herabgezogenen Gaumenbeine der Papagaien gedenken, welche zusammen eine gegen die Zungenoberfläche sich herabziehende Art von Rinne bilden, und so gleichsam die Bewegungen der Zunge leiten. Dadurch aber eben ist diese im Staude, das kleinste vom Vogel ergriffene Samenkorn plötzlich und sicher unter die schmale Oberkieferspitze hin zur Zermalmung zu schieben, was ohne diese besondere Vorkehrung wohl oft missglücken würde. Bei den indischen und australischen Papagaien mit bewimpelter Zunge, welche wohl nie kleine Samenkörner fressen; schienen mir diese Gaumenbeine viel niedriger und weniger herabgezogen zu seyn, als bei den americanischen, africanischen und den übrigen asiatischen. In meinem oben angeführten Systeme habe ich auf die Analogie aufmerksam gemacht (S. 257.), welche in Beziehung auf die Gestalt und Stellung der Gaumenbeine und den damit bedingten Nutzen zwischen den Papagaien und Chamäleonem statt findet.

\*) Bei mehreren Papagaien, welche sich von sehr weichen Früchten zu ernähren scheinen, ist indessen dieser Vorsprung ziemlich verwischt: so z. B. bei den wimperzüngigen Gattungen Neuhollands; am zahnlosen Schnabel der *Sittace hyazinthina*, aber, meines Wissens, keines andern americanischen Papagaies, fehlt er gänzlich.

Zähne) das Eigene, dass sie sich in demselben Grade wieder ergänzen, in welchem sie sich durch den Gebrauch abnützen. Eben so verhält es sich mit den Kieferscheiden der Papagaien \*).

Die Papagaien sind auch in ihren Sitten den Nagern, namentlich denjenigen ähnlich, welche auf Bäumen leben. Sie sind flink, unruhig, possierlich, und bringen gleichfalls ihre Nahrung mit den Füßen zum Munde, was unter den Vögeln nimmermehr zum Vorschein kommt. Sie haben das heftige, leicht reizbare Temperament der Nager, und sind eben so tückisch, eben so fruchtbar und so zahlreich an Gattungen und Individuen als diese, ernähren sich von vegetabilischen Stoffen, nisten in hohlen Bäumen, oder bauen nur selten ein Nest, wie z. B. *Sittace murina*.

Diejenigen Papagaien, welche fast immer auf dem Boden umherlaufen, schliessen sich durch diese Sitte, so wie durch ihre Schnabel-, Flügel- und Fussbildung, den *Anu's* der siebenten Ordnung der Vögel meines Systems innig an. Sie hüpfen oft, wie Erdnager, in die Höhe, allein sie gehen schrittweise. Die andern Gattungen, welche fast ausschliesslich auf Bäumen leben, haben häufig, wie die Baumnager, einen langen Schwanz, der zur Herstellung eines gewissen Gleichgewichtes im Körper dient, wenn sie steigen, und immer das Vermögen, die Zehen beim Abwärtssteigen von einem Aste zum andern sehr weit rückwärts zu biegen, worin sie vorzüglich mit den Eichhörnchen und Fledermäusen übereinstimmen, welche die Zehen der Hinterfüsse, gleich Eidechsen, ganz zurücklegen können. — Es

---

\*) Das Wachstum dieser Kieferscheiden ist nicht weniger stark, als das der Schneidezähne der Nager. Ein philippinischer Kakatu, welchen ich lange Zeit zu beobachten Gelegenheit hatte, verlor durch Zufall die ganze Spitze der Oberkieferscheide. Die Unterkieferspitze, deren Ausdehnung jetzt nichts mehr im Wege stand, wuchs, wie dies unter ähnlichen Umständen mit den Schneidezähnen der Nager derselbe Fall ist, zu einer solchen Länge heran, dass der Vogel ausser Stand gesetzt wurde, seine Nahrung mit dem Schnabel zu ergreifen und zu zernagen, und nur mit vieler Mühe, mittelst Aetzung, am Leben erhalten werden konnte.

giebt viele Nager, die ihre Nahrungsmittel in besondere Taschen des Kopfes einsammeln. Ich habe beobachtet, dass sich hiezu *Psittacus leucocephalus* und einige andere Papagaien der ziemlich weiten Höhlung ihres Unterkiefers bedienen, und aus derselben die Hanfkörner mittelst der Zunge zwischen die Kieferspitzen bringen.

An der Spitze der den Papagaien nachfolgenden Ordnung der Sperlinge steht der durch sein glänzend grünes Gefieder, so wie durch die Gestalt seines Schnabels einem Papagaie ähnliche Finksittich (*Psittacopsis*). Ihm folgen die Kreuzschnäbel (*Loxiae Illig.*) nach, die in ihren Sitten vieles mit den Papagaien gemein haben. Dadurch stehen diesen Vögeln die Sperlinge überhaupt noch nahe, dass diese, wie jene, die Sämereien, von welchen sie sich ernähren, von der Schaale entblößen \*) u. s. w.

---

\*) Nach diesen höchst gedrängten historischen und naturhistorischen Bemerkungen über die Papagaien im Allgemeinen, hätte ich gerne noch ein allgemeines Bild von ihrer Lebensweise entworfen, und hier mitgetheilt; allein die mir vorgeschriebenen Grenzen in Bezug auf den Raum in diesem Bande der Denkschriften nöthigen mich, von meinem Vorsatze abzustehen, und so kann ich in diesem Betrachte bloss noch auf *Le Vaillant's* oft angeführtes Papagaienwerk, und auf die Nachrichten verweisen, welche *Azara* a. a. O., *Virey* und *Veillot* im 25ten Bande des *Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle* (Artikel „*Perroquet*“ p. 292.) im Allgemeinen über die Papagaien gegeben haben, und Prinz *Maximilian*, zu *Wied* in dem demnächst erscheinenden 3ten Bande der *Vögel Brasiliens* mittheilen wird.

---



Conspectus systematicus  
generum et specierum ex ordine Psittacorum,  
adjectis generum characteribus.

Genus I. *Palaeornis* \*) Vig. Edelsittich. ? ~~44~~

*Myxa* ventricosa, apice lata; lingua simplex, glabra; pedes breves, validi; ungues breves, admodum arcuati; cauda elongata, gradata, rectricibus duabus intermediis longissimis, attenuatis, apice rotundatis; ptilosis mollis; collare sive taenia ad caput plerumque adultis.

Asiae et Africae incolae. Vitae ratio ignota. In Asia et Africa locum *Sittacarum* tenent.

Species: 1. *P. Alexandri*. — 2. *P. cubicularis*. — 3. *P. borneus*. — 4. *P. melanorhynchus*. — 5. *P. pondicerianus*. — 6. *P. barbatus*. — 7. *P. malaccensis*. — 8. *P. bengalensis*. — 9. *P. incarnatus*. — 10. *P. cyanocephalus*. — 11. *P. columboides*.

Genus II. *Polytelis* \*) Wagl. Prachtsittich.

Character generis praecedentis; pedes elevati, graciles, tarso tereti.

---

\*) Παλαιός antiquus, ὄρνις avis. Vigors, *Transact. of the Linn. Soc.* XV. p. 286.

\*) Πολυτελής exquisitus. Avis generis ob pedes altos et graciles genus sequens cum praecedente connectens.

Genus *Australiae* proprium. Vitae ratio latet.

*Species: 1. P. Barrabandi.*

Genus III. *Pezoporus* \*) *Illig. Erdsittich.*

*Myxa* lata, medio subcarinata, apice subemarginata; *maxilla* sine dente, parva sicut mandibula; *lingua* simplex, glabra; *pedes* graciles, tarso tereti digitisque elongatis, reticulato-asperulis; *ungues* longi, rectiusculi; *cauda* elongata, lanceolata, reetricibus angustis, acutis; *ptilosis* mollior, varia.

Species generis *Australiae* incola, in humo obambulans victum quaerit.

*Species: 1. P. formosus.*

Genus IV. *Nymphicus* \*\*) *Wagl. Schmucksittich.* 460

Character generis praecedentis, exclusis *unguibus* brevioribus, arcuatoribus; *maxilla* dentata; latera oris anguli lobo membranaceo aucta (an omnibus?).

*Australiae* incolae, in humo ambulantes locis cultis victum legunt.

*Species: 1. N. bisetis. — 2. N. Novae-Hollandiae.*

Genus V. *Prioniturus* \*\*\*) *Wagl. Momotsittich.* 461

Character generis praecedentis; *rostrum* validum; *rectrices* duae intermediae ante apicem nudaе.

\*) *Πεζοπόρος* pedester. *Illiger*, Prodr. Syst. Mamm. et Av. p. 201.

\*\*) *Νυμφικός* sponsalis. — Nomen genericum a diademate, quo species duae generis ornatae sunt.

\*\*\*) Sic dictus ob caudae structuram ut in *Prionite Momoto*. *Prionites* (avis) et ὑπὸ cauda.

Species *Asiae* incola. Vitae ratio ignota.

Species: 1. *P. platurus*.

Genus VI. *Platycercus* \*) Vig. *Plattschweifsittich*. μ 69

*Maxilla* paratonis inflata sine culmine distincto, tomis dente aucta; *mandibula* ad tomia sinuata; *myxa* biangulosa, aequalis, latiuscula; *lingua* simplex, glabra; *pedes* graciles, tarso tereti, altiusculo; *ungues* maiusculi, arcuati; *cauda* elongata, lata, gradata, rectricibus versus apicem plus minusve angustatum rotundatis sive rotundato-truncatis; plumae compactae, capitis subdiscretae.

*Australiae* incolae. Degunt gregibus maioribus sive minoribus locis cultis, cerealibus et baccis (*Pl. Novae-Seel.*), praecipue *Coccolobae australis* et *Phytolaccae completae* infesti. Nidificant in arboribus cavis et ova 4—6 in nidum e plumis, sive e gramine ~~structum~~, et intus plumis stratum, aut in lignum putridum deponunt. Ova *Platycercorum* divisionis Aα tota alba, divisionis Bβ. alba, nigro-maculata. — In *Australia* quodammodo locum *Deroptyi* ex *America* et *Coracopsium* ex *Africa* tenent.

Species: A: *Rectricibus admodum gradatis*: 1. *P. auriceps*. — 2. *P. pacificus*. — 3. *P. Novae-Seelandiae*. — 4. *P. erythrotis*. — 5. *P. ulieteanus*. — B: *Rectricibus gradatis sive subgradatis*: α. *cauda picta*: 6. *P. multicolor*. — 7. *P. Barnardi*. — 8. *P. pileatus*. — 9. *P. venustus*. — 10. *P. icterotis*. — 11. *P. eximius*. — 12. *P. caledonicus*. — 13. *P. jonquillaceus*. — 14. *P. vulneratus*. — 15. *P. zonarius*. — 16. *P. Novae-Guineae*. — 17. *P. Pennantii*. — β. *cauda obscu-*

\*) *Πλατὺς planus, κέρκος cauda*. Vigors et Horsfield l. c. p. 278. — Species divisionum A. et B. β. forsan genus peculiare formant.

ra: 18. *P. erythropterus*. — 19. *P. scapulatus*. — 20. *P. amboinensis*. — 21. *P. hysginus*.

Genus VII. *Deroptylus* \*), Wagl. Fächersittich.

Character *Platycercorum* divisionis B $\beta$ ; *maxillae* culmen distinctum; *tarsus* brevior, validior, depressiusculus; *digiti* elongati; *nuchae plumae* elongatae ventilabri in morem erigendae, *capitis longae*, strictae.

Species *Americae* incola, ibi *Cacatuas Asiae* et *Australiae* sicut huius *Platycercos* divisionis B $\beta$  repraesentans. Vitae ratio ignota.

Species: 1. *D. accipitrinus*.

Genus VIII. *Euphema* \*\*) Wagl. Zartsittich. 180

*Rostrum* minutum, breve, altum; *maxilla Platycercorum*, pone dertrum sinuatum; *mandibula* ventricosa, apice abrupte compressiuscula, tomiis sinuata; *lingua* et *pedes* *Pezopori*; *ungues* longuli, subarcuati; *cauda* elongata, cuneata, angustiuscula, rectricibus angustato-lanceolatis; *plumae* compactae, frontis ac buccarum rigidiusculae.

*Australiae* incolae; ambulant in humo et victitant seminibus graminum; nidificant (*E. pulch.*) supra apicem arborum truncatarum et pariunt ova 8 alba; nidum non struunt. In *Australia* tenent cum *Trichoglossis* locum *Sittacarum* ex *America*.

\*) *Δίρη* cervix, *πύλον* ventilabrum. Nomen derivatum à crista cervicis praelonga, quam avis in morem ventilabri expandit et complicat.

\*\*) *Εὐφημος* bonae famae. Gen. *Nanodes* Vig. et *Horsf.* l. c., quod vero nomen ob *Curculionum* genus consonum a cl. *Schönherr* prius conditum mutandum erat.

*Species:* 1. *E. pulchella*. — 2. *E. chrysostoma*. — 3. *E. undulata*. — 4. *E. discolor*.

*Genus IX. Trichoglossus* \*) *Vig., Horsf. Tastsittich.* #84.

*Rostrum* compressum; *maxilla* sinuoso-dentata; *mandibulae* longulae myxa compressa, angustissima; apex subproductus, compresso-attenuatus, intus longitudinaliter substriatus; dertrum intus laeve; *lingua* supra apicem penicillato-papillosa; *cauda* brevior et *ptilosis* praecedentium; *tarsus* brevis; *digiti* et *ungues* validi, hi arcuati, acutissimi.

*Asiae* et *Australiae* incolae, *Palmas* et *Eucalyptos* frequentantes, fructibus harum arborum victitantes. Ova, quantum hucusque patet (*T. australis*), viridia, sive alba (*T. pusillus*), immaculata 2—4.

*Species:* α. *Rostro pedibusque rubris flavisve:* 1. *T. palmarum*. — 2. *T. pyrrhopterus* \*\*). — 3. *T. aurifrons*. — β. *Rostro pedibusque obscuris:* 4. *T. pusillus*. — 5. *T. australis*. — γ. *Rostro aurantio, pedibus obscuris:* 6. *T. chlorolepidotus*. — 7. *T. haematodus*. — 8. *T. rubritorquis*. — 9. *T. multicolor*. — 10. *T. cyanogrammus*.

*Genus X. Chamosyna* \*\*\*) *Wagl. Sittichlori.*

*Rostrum, lingua et pedes Trichoglossorum;* *cauda* longula, cuneata, *rectricibus* duabus intermediis longissimis.

\*) Θριξ, τριχὸς pilus, γλῶσσα lingua. *Vigors et Horsf. l. c.*

\*\*) Typus generis „*Brotogeris*“ *Vigorsii*, *Zoolog. Journ.* 4. p. 400. — Vidi linguam nec hujus avis, nec praecedentis, sed ex analogia formae universalis ad hoc genus pertinent.

\*\*\*) Χαμόσυνος amoenus. — Avis generis naturaliter connectit *psittacos* praecedentes longicaudatos cum sequentibus, qui rubri sunt et caudam conico-acuminatam habent.

*Australiae* incola. Vitae ratio ignota.

*Species*: 1. *Ch. papuensis*.

Genus XI. *Eos* \*) *Wagl. Lori.* 149

*Rostrum, lingua et pedes Trichoglossorum; cauda elongata, apice conico-acuminata, latiuscula; color praedominans ruber, rarius viridis.*

*Asiae et Australiae* incolae. Vitae ratio ignota.

*Species*: *α. Ptilosi rubra*: 1. *E. indica*. — 2. *E. rubra*. — 3. *E. guebiensis*. — 4. *E. cochinchinensis*. — 5. *E. variegata*. — ? *E. Isidorii*. — *β. Ptilosi viridi*: 6. *E. cervicalis*. — 7. *E. ornata*.

Genus XII. *Coriphilus* \*\*) *Wagl. Maidlori.* 101

*Rostrum breve, lingua et pedes Trichoglossorum; cauda longula, latiuscula, apice conico-subrotundata; verticis plumae longulae, strictae, in cristam erigendae; alae longae, caudae finem fere attingentes.*

*Australiae* (et *Indiae*?) incolae. In palmetis vivunt et plerumque in altissimis palmis (*Coc. nucifer.*) nidificant; victitant fructibus, imprimis *Musae paradisiacae*; sibilando fistulandoque garriunt; irritatae sive terrefactae verticis plumas erigunt; amor consocii insignis. In *Australia* tenent locum *Psittaculorum* ex *America, Asia* et *Africa*.

---

\*) *Psittacus, Eois imitatrix. Ovid.* — Species divisionis *β.* forsan generi distincto inserendae; earum linguam non vidi. Praeterea maxilla *P. cervicalis* dente valido aucta est. Ex avibus huius generis, sicut generum 13 et 14 constituerunt auctores recentiores genus „*Lorius*.“

• \*) *Κόρη* puella, *φίλος* amicus.

*Species:* 1. *C. saphirinus*. — 2. *C. cyaneus*. — 3. *C. eu-chlorus*. — 4. *C. solitarius*. — 5. *C. Kuhlî*.

*Genus XIII. Domicella Wagl. Frauenlori. p. 105'*

*Rostrum et pedes Trichoglossorum; lingua simplex, glabra; cauda modice longa, lata, apice subrotundata; color praedominans ruber.*

*Asiae incolae. Vitae ratio ignota.*

*Species:* 1. *D. atricapilla*. — 2. *D. Lory*. — 3. *D. punicea*. — 4. *D. coeruleata*. — 5. *D. garrula*.

*Genus XIV. Eclectus \*) Wagl., Edellori. p. 109*

*Rostrum validum, maxillae apice infra elevato-striato; maxilla inflata, culmine acutiusculo, dente valido aucta; mandibula plano-compressiuscula, tomis sinuata, myxa biangulosa, apice parum angustior; lingua simplex, glabra; cauda brevis, aequalis, lata; pedes validi, tarso brevi, valido, depressiusculo; plumae capitis collique discretae, subsericeae; cera vix ulla; nares parvae, supra maxillae basin, plumis tectae.*

*Asiae incolae; vitae ratio ignota.*

*Species:* 1. *E. Linnaei*. — 2. *E. grandis*.

*Genus XV. Psittacodis \*\*) Wagl., Papagailori. p. 112*

*Character: Eclectorum, maxilla sine dente.*

*Australiam et Asiam inhabitant, ubi locum Psittacorum ex*

\*) Εκλεκτός electus.

\*\*) Ψιττακός et ζίδος forma. (*Psit. sumatr.*, *Ps. Tarabe* et *Ps. gramineum* non vidi).

*Africa* et *America* occupant, ad quos sensim colore et forma universali accedunt.

*Species: α. Ptilosi nigro-rubra: 1. Ps. Paragua. — β. Ptilosi viridi: 2. Ps. magnus. — 3. Ps. sumatranus. — 4. Ps. gramineus. — γ. Ptilosi viridi-rubra: 5. Ps. Tarabe.*

? *Genus* . . . . .

*Rostrum* (pro avis mole) magnum, maxillae culmine exaratum; mandibula longior quam alta, gonyde ascendente, apice lata, myxa angulosa; cera tota nuda; *narium* apertura lata, rotunda; *cauda* mediana, apice rotundata, rectricum apice ovato-acuminato.

*Species Australiae* incola, quam nondum vidi, quae vero caudae forma ac rostri magnitudine a *Psittacis* subsequentibus, naribus magnis, patulis a praecedentibus differre videtur.

*Species: 1. Psittacus Fieldii Swains.*

*Genus XVI. Psittacus* \*) *Wagl., Papagai. p. 116.*

*Rostrum* proportionatum, *lingua*, *pedes* et *cauda Eclectorum*, illud subcompressum; *cera* lata, ad paratona oblique truncata; *nares* magnae, orbiculares, ante basin maxillae et pone initium cerae; plumae compactae, colli latae, truncatae, imbricatim-positae.

*Africae* et *Americae* incolae. Gregatim, libenter juxta ostia et ripas fluviorum, in fructicetis, quoque locis desertis degunt, vespere in sylvas migrantes; nidificant in arboribus cavis; pariunt ova alba, quibus mas et foemina alternatim incubant. Psittacorum docillimi.

---

\*) *Genus Androglossa Vigors. l. c.*



Sexus colore non aut vix variant; pulli adultis pictura differunt. Vitae ratio avis ferae hoc tempore parum nota.

*Species: α. Pilei plumis brevissimis, adpressis: 1. Ps. Erithacus. — β. Pilei plumis latiusculis, laxioribus, nuchae compactis, squamoso-positis: 2. Ps. festivus. — 3. Ps. poecilorhynchus. — 4. Ps. pulverulentus. — 5. Ps. xanthops. — 6. Ps. ochrocephalus. — 7. Ps. amazonicus. — 8. Ps. hypochondriacus. — 9. Ps. autumnalis. — 10. Ps. brasiliensis. — 11. Ps. Bouqueti. — 12. Ps. erythrurus. — 13. Ps. Dufresneanus. — 14. Ps. vinaceus. — 15. Ps. havannensis. — 16. Ps. agilis. — 17. Ps. dominicensis. — 18. Ps. leucocephalus. — 19. Ps. albifrons. — 20. Ps. Pretrei.*

*Genus XVII. Pionus \*) Wagl. Maitaca. p. 142*

*Rostrum subintumidum; nares, lingua et pedes Psittacorum; cauda abbreviata, aequalis, alis magnis fere tecta; caput magnum; corpus breve, crassum. Sexus colore non variant.*

*Asiae, Africae et Americae incolae; gregibus magnis degunt. Reliqua vitae ratio ignota.*

*Species: A. Rostro subparvo, compressiusculo: α. crisso rubro: 1. P. menstruus. — 2. P. Maximiliani. — 3. P. senilis. — 4. P. purpureus. — 5. P. sordidus. — β. capite obscuro: 6. P. melanocephalus. — 7. P. Caica. — 8. P. Barrabandi. — 9. P. vulturinus. — 10. P. fuscicapillus. — γ. cauda fasciata: 11. P. guineensis. — B. Rostro magno paratonis convexo: α. regione ophthalmica nudiuscula: 12. P. senegalus. — 13. P. Meyeri. — 14. P. bra-*

\*) *Πων* obesus. — *Maitaca* audiunt hae aves apud indigenas Brasiliae.

*chyurus*. —  $\beta$ . regione ophthalmica plumosa: 15.  
*P. Le Vaillantii*.

Genus XVIII. *Psittacula* \*) Kuhl. *Tui*. p. 159

*Rostrum* Psittacorum, ut in *Pionis* compressiusculum sive ad paratona subintumidum (*dens* maxillae americanis distinctus, africanis subdistinctus, asiaticis obsoletus); *cauda* brevis, alis plus minusve tecta, in statu complicato subconica; *lingua* glabra, simplex (saltem americanorum, africanorum et plurium asiaticorum); *ptilosis* mollior, *sexus* alius interdum diversa; *statura* omnium parva.

*Asiae, Australiae, Africae et Americae* incolae. Gregariae incidunt in arbores et frutices. Fructibus et seminibus victitant. Amor consocii insignis.

\* *Species: a. Rectricibus lanceolato-acuminatis:*  
1. *Ps. pileata*. — 2. *Ps. passerina*. —  $\beta$ . *Rectricibus apice subtrigonis:* 3. *Ps. purpurata*. — 4. *Ps. Hueti*. — 5. *Ps. melanoptera*. — 6. *Ps. melanota*. —  $\gamma$ . *Rectricibus apice recto-truncatis:* 7. *Ps. surda*. —  $\delta$ . *Rectricibus apice obtusis:* 8. *Ps. Swindereniana*. — 9. *Ps. pullaria*. — 10. *Ps. roseicollis*. — 11. *Ps. batavensis*. — 12. *Ps. Tovi*. — 13. *Ps. canus*. — 14. *Ps. Galgulus*. — 15. *Ps. Culacissi*. — 16. *Ps. minor*. — 17. *Ps. Desmarestii*. — 18. *Ps. malaccensis*. — 19. *Ps. torquata*.

Genus XIX. *Nasiterna* Wagl. *Nasentui*.

Habitus universalis *Psittaculae*; *rostrum* altum, subbreve; ma-

---

\*) Divisio *Psittacula*, Kuhl in *Monogr. Psitt.* Genus *Psittacula Spixii, Vigorsii* et auctorum recentiorum. — Interna organisatio sicut vitae ratio psittacularum-diversarum, quas inter has constitui, divisionum, prorsus fere ignotae, itaque dubius haereo, an non hae divisiones, illis melius notis, genera distincta forment,

xillae apex supra hunc mandibulae multum porrectus, attenuatus, acutissimus, parum curvatus, incisura profunda, rectangula ad latera tomiorum formatus, culmine distincto, compresso, ad frontem desinente aucta; mandibula majuscula utrinque ante apicem profunde sinuata; ejus apex angulo incisurae illius in maxilla recte oppositus; cauda brevis, rotundata, alis fere tecta; rhachis rectricum apice rotundatarum in cirrum brevem excurrens.

Species *Australiae* incolā.

Species: 1. *N. pygmaea*.

Genus XX. *Triclaria* \*) *Wagl. Halbsittich. p 176.*

*Character Psittacorum*; cauda longula, lata, subaequalis; plumae colli pogonio subdiscreto, non imbricato-positae. — Sexus colore variant.

Species *Americae* incola transitum a *Psittaculis* ad *Sittacas* formans. — Vitae ratio hucusque ignota.

Species: 1. *T. cyanogastra*.

Genus XXI. *Sittace* \*\*) *Wagl. Sittich. p 171.*

*Rostrum, lingua et pedes Psittacorum*; *maxillae uncus praelongus, praeacutus, praearcuatus; myxa ut plurimum distincte*

\*) Cognomen *Dianae*.

\*\*) *Sittace*, nomen *Psittaci longicaudati* apud *Asianos*, fide *Plin.* — Sunt qui nuperrime genus hoc naturale in diversa genera secreverunt, quorum vero characteres tam fugaces, tam parum stabiles sunt, et saepe tam minutiosi, ut vix verbis exprimi possint. Quoad formam universalem corporis, singulas capitis partes, piloseos structuram, imo quoad huius colorem, *Sittacae* parvae in maiores, hae in magnas, hae

interdum obsolete angulosa, rarius ventricosu-rotundata; *acies* palati pone dertrum transversa pro recipiendo apice mandibulae plurimis distincta, nonnullis humilis, paucis obsoleta; maxillae apex omnibus infra elevato-striatus; *dens* maxillae plus minusve distinctus; *cauda* elongata gradata, lanceolata; *tarsus* brevissimus, depressiusculus, validus; *plumae* colli longulae, subdiscretae, apice obtusae.

*Americae* incolae. Sexus colore parum, vix aut non variant. Avis juvenilis adultae plus minusve aut prorsus similis. Nidificant utplurimum in arboribus cavis, raro in fissuris riparum altorum fluminum, rupium, murorum aediumve, in cumulis a formicis in arboribus structis et relictis; nonnullae nidum struunt in arboribus. Plumae gregibus plus minusve magnis, interdum ingentibus, migrant, fructibus quibusdam, quibus victitant, maturescentibus. Aves minus dociles quam *Psittaci*, utplurimum indociles. Habitant gregariae aut per familias locis apertis, vel in fructicetis sylvisque, utplurimum ad harum marginem. Mas et foemina ovis 2—4 albis alternatim incubant.

*Species*: 1. *S. Tuipara*. — 2. *S. Tui*. — 3. *S. xanthoptera*. — 4. *S. virescens*. — 5. *S. Tirica*. — 6. *S. euops*. — 7. *S. murina*. — 8. *S. leucotis*. — 9. *S. vittata*. — 10. *S. lepida*. — 11. *S. chlorogenys*. — 12. *S. Chiripepe*. — 13. *S. melanura*. — 14. *S. Nenday*. — 15. *S. leptorhyncha*. — 16. *S. Anaca*. — 17. *S. cruen-*

---

iterum in maximas, quas *Macroceros* vocant, sine distinctis ac constantibus signis sensim transeunt. Interna quoque structura corporis, ad eas in genera distincta discernendas, nil certi mihi praebuit, ac tali modo species habitu universali ac pictura inter se plus minusve similes cumulare solummodo potui. — Species 1—26 incl. pertinerent ad *Spixii* genus „*Aratinga*“ (Av. Bras. I. p. 29.), species 27—31 incl. ad ejus genus „*Arara*“ (l. c. p. 25.), et ad *Vigorsii* genus „*Psittacara*“ (Zool. Journ. p. 387.). Ex speciebus 32—42. incl. constituit cl. *Vieillot* genus „*Macrocerus*“ (Nouv. Dict. d'hist. nat. 2.) et e *Lathamii Psittaco hyazinthino* cl. *Spix* genus „*Aodorhynchus*“ (l. c. p. 1.)

*tata*. — 18. *S. aurea*. — 19. *S. Petzii*. — 20. *S. cactorum*. — 21. *S. pertinax*. — 22. *S. Jendaya*. — 23. *S. solstitialis*. — 24. *S. ludoviciana*. — 25. *S. lutea*. — 26. *S. flaviventris*. — 27. *S. patagonica*. — 28. *S. guianensis*. — 29. *S. nobilis*. — 30. *S. acuticaudata*. — 31. *S. Illigeri*. — 32. *S. Macavuanna*. — 33. *S. severa*. — 34. *S. pachyrhyncha*. — 35. *S. militaris*. — 36. *S. tricolor*. — 37. *S. Macao*. — 38. *S. Aracanga*. — 39. *S. Arauna*. — 40. *S. Caninde*. — 41. *S. Spixii*. — 42. *S. glauca*. — 43. *S. hyazinthina*.

Genus XXII. *Tanygnathus* \*) *Wagl. Schnabelsittich.* p. 215.

*Rostrum Sittaces*, maxilla maxima, admodum arcuata, acutissima; *cauda* longa, latiuscula, cuneata (*oculi* perquam parvi). Reliqua *Sittaces*.

*Australiae* (an quoque *Asiae*?) incolae; vitae ratio ignota.

*Species*: 1. *T. macrorhynchus*. — 2. *T. marginatus*.

Genus XXIII. *Coracopsis* \*\*) *Wagl. Krähensittich.*

*Rostrum* basi cera lata, nuda cinctum; *maxilla* intumido-compressiuscula, tomis ad basin subintractis, sicut *mandibula* longa; haec versus apicem oblique ascendens, apice subattenuato-compressa; *nares* maximae, patulae; *cauda* longa, lata, plana, subaequalis; *lingua* et *pedes Psittacorum*. *Plumae* corvinae sed sine nitore metallico; *pili* in loris et prope *nares*.

*Africae* incolae, ubi locum *Platycercorum* divisionis  $\beta$ . tenent. Vitae ratio ignota.

\*) *Tανύω* extendo, *γνάθος* maxilla.

\*\*) *Κόραξ* corvus et *ὄψις* vultus.

*Species: 1. C. mascarina. — 2. C. nigra.*

*Genus XXIV. Dasyptilus \*) Haarlori.*

*Rostrum* longius quam latum, curvatum, parum crassum, compressum. *Maxilla* quam mandibula multo longior, convexa, admodum curvata, in apicem recurvatum, acutum terminata, ad tomia limbo aucta; *mandibula* brevis, convexa, subtus carinata, apice tenui, et utrinque ante hunc profunde emarginata; gnathidia mandibulae per interstitium ovale, nudum separata; *nares* circulares, nudaе, in cute cirrosa sitae; *caput* et collum supremum ex parte nuda; cutis circa oculos et infra genas plumis piliformibus obsita; *tarsi* breves, validi, reticulati; *hypodactyla* limbata; *ungues* robusti; *cauda* mediocris, ampla, valde tectiformis, apice rotundata, e rectricibus 10 rigidis composita; harum pogonium interdum latum, externum angustum; *alae* longae, robustae, acuminatae, cum apice caudae medium transcendentes; remiges validae, rigidae, angustae, pogoniis compactis, extus angustis, intus latioribus sed ante apicem emarginatis; remix prima brevis, secunda quam prima longior, tertia quam quarta brevior, haec omnium longissima; quinta longitudine remigis tertiae; remiges secundariae rigidae, latae, apice amplae et rotundatae; *ptilosis* rigida, sicca, plumis subtilissime barbulatis; *plumae* occipitis et colli rigidae, strictae, adplicatae, crissi longae, amplae, juguli latae, apice rotundatae.

Species generis unica *Americae* (an *Novae-Guineae*?) incola, tam *Sittacis* quam *Microglossis* vicina (fide *Lesson.*) Vitae ratio ignota.

*Species: 1. D. Pecquetii.*

---

\*) *Λαός* pilosus, hirsutus, *πίλον* pluma. — Genus *Psittrichas* (an a *ψιττακός* et *σπίξ*?) *Lesson. Bullet. univ. 1831. p. 241.*

Genus XXV. *Microglossus* \*) Geoffr. *Zungenkakatu*.

*Rostrum* percompressum, hians; *maxilla* ingens, tomiis bidentatis, apice elongato, acutissimo; *mandibula* parva, uni-emarginata; *lingua* cylindracea in apice glande parva, fissa, cornea exstructa, emissilis; *tibiae* supra tarsum nudiusculae; *tarsus* brevis, planus; *cauda* sublonga, aequalis; *plumae* capitis longissimae, lineares.

Species *Australiae* incola. Vitae ratio ignota.

Species: 1. *M. ateyrimus*.

Genus XXVI. *Calyptorhynchus* \*\*) Vig., Horsf. *Helmkakatu*.

*Maxilla* admodum arcuata (circuli partem quartam referens), versus apicem perquam compressa, basi alta, apice acuto, breviusculo, sine dente, sed pone apicem sinuata, quam *mandibula* altior; *mandibula* lata, maxillae tomia includens, apicis lati medio excisa et ibidem utrinque ad latera sinuata; *nares* magnae, laterales; *lingua* simplex, glabra; *cauda* praelonga, latissima, plana, apice rotundata; *pedes* (pro avis mole) admodum parvi, verruculoso-scabri, tarso modice alto; *alae* admodum longae et latae; *plumae* compactae, corvinae, pilei elongatae in morem cristae erigendae, genarum inferiores longae, latae, apice obtusae, versus oris rictum (ad hunc tegendum) vergendae. Sexus colore non variant. Color praedominans niger.

*Australiae* incolae. Aves feroces, timidae; degunt gregibus parvis in sylvis montium; victitant radicibus bulbosis et fructibus; pariunt ova 2 — 3.

\*) *Μικρός* parvus, *γλώσσα* lingua. Geoff. St. Hil., Vieill. Gal. des Ois. Less. Man. d'Ornith. II. p. 144. Sectio: *Probosciger* Kuhl. *Aras à trompe* Vaill. *Perroquet à trompe* Cuv. R. an. I. p. 465.

\*\*) *Καλύπτω* tego, *ρύγχος* rostrum. Vigors et Horsfield l. c. p. 269.

*Species: 1. C. Leachii. — 2. C. Temminckii. — 3. C. stellatus. — 4. C. Banksii. — 5. C. funereus.*

*Genus XXVII. Corydon Wagl. Corydon.*

*Rostrum* breve, validum; *mandibula* quam maxilla robustior, validissima, myxa latissima, angulosa, in medio apicis profunde sinuata; *maxilla* sicut pedes parvi *Calyptorhynchi*; *cauda* mediocris, aequalis; *plumae* compactae, capitis, colli ac trunci latae, apice truncato-rotundatae; pileus cristatus; remiges maculatae. Ptilosis varia. Sexus colore variant (?).

*Species Australiae* incola. Vitae ratio ignota.

*Species: 1. C. galeatus.*

*Genus XXVIII. Cacatua \*) Vieill. Kakatu.*

*Rostrum* et *lingua Calyptorhynchi*, *mandibula* angustiore; *pedes* robusti, reticulati, tarso brevi, depressiusculo; *cauda* mediocris, aequalis; *plumae* compactae, longae, latae, recto-truncatae, pulverulentae; *caput* crista magna, plicatili auctum; *plumae* in genis *Calyptorhynchi*. Ptilosis pallida. Sexus colore non variant.

*Asiae* et *Australiae* incolae. Vitae ratio avis ferae ignota.

*Species: 1. C. roseicapilla. — 2. C. Philippinarum. — 3. C. Leadbeateri. — 4. C. moluccensis. — 5. C. cristata. — 6. C. gallerita. — 7. C. sulphurea.*

---

\*) Vieillot, Dict. Nouv. d'hist. nat. XVII. Id. Encycl. meth. Lesson, Man. d'Ornith. 2. p. 143. Kakadoë Lacép, Cuv. I. c. Gen. Plectolophus Vig. et Horsf. I. c. p. 269. — Nomen *Cacatua* a voce harum avium iis prae caeteris psittacis peculiari, derivatum, unde omni jure retinendum. Veterum *Cuculus* aequo modo ab avis voce derivatus.



*Genus XXIX. Licmetis* \*) *Wagl., Fächler.*

Character principalis *Cacatuae*, *maxilla* admodum producta, a sinu laterali ad apicem parum curvatum angustata; *mandibula* brevis, rotundata (frons cristata).

Species *Australiae* incola. Vitae ratio ignota.

*Species: 1. L. tenuirostris.*

*Genus XXX. Nestor* *Wagl., Nestor.*

*Maxilla* prolongata, attenuata sine dente vero, sensim curvata, compressa (maxillam *Loxiae curvirostrae* quoad formam universalem aemulans); *mandibula* versus apicem attenuato-compressum sensim subascendens, parva; *acies* infra apicem maxillae (pro recipiendo apice mandibulae) perquam distincta, arcuata, latere postico longitudinaliter striato-sulcata, contra apex maxillae subtus profunde excavatus et laevis; *cauda* mediocris, aequalis; ptilosis varia (*remiges* et *rectrices* fasciatae, harum rhachis in cirrum brevem desinens).

Species *Australiae* incola; vitae ratio ignota.

*Species: 1. N. hypopolius.*

---

\*) *Λικμητής*, ó, ventilator. Nomen derivatum a crista frontis, quam avis in morem ventilabri motitat.

## Expositio specierum.

### I. Genus: *PALAEORNIS* (Conf. pag. 27).

1. *P. Alexandri*. Eleganter viridis; gastracum nonnihil ad flavum inclinans; fascia cervicis lata, laete rosea; vitta menti supra gulam ducta, lata, aterrima, in utroque latere apicis inferioris in lineam excurrens, cum cervicis fascia se jungentem; alarum tectrices superiores humerales purpureae, maculam longitudinalem magnam efficientes, tectrices inferiores minores virides, majores cinereae; remiges subtus et intus nigricantes, supra pogonio externo virides, nonnihil in coeruleum vergentes; rectrices omnes supra virides, subtus flavidae, intermediae versus apicem viridi-coerulescentes; rostrum validum, sanguineo-coccineum, sed maxillae apex extimus flavidus. *Mas et Foem. adult.*

*Psittacus torque miniaceo Aldrov. 1. p. 679. The Ring-Parrakeet Edw. 2. t. 292. (fig. mediocr. Psittacus Alexandri Linn. et Gmel. in synonymia). Psittacus Alexandri Lath. (exclusis omnibus indicatis varietatibus), Bechst., Vieill., Kuhl Consp. Psitt. p. 30. (Verhandl. der Leop. Carol. Akad. d. Naturf. zu Bonn 1820). — Perruche à collier de l'isle de Luçon Sonner. Voy. à la Nouv. Guinée. p. 80. t. 43. Psittacus Sonnerati Auctor. et Kuhl. Perruche à collier des îles Maldives Buff. Pl. enl. 642. (fig. accur.) La grande Perruche à collier Le Vaill. Perroq. t. 30. (fig. accur.)*

*Avis hornotina et junior.* Macula alarum supra humeros purpurea; collum, mentum ac gula tota viridia; ptilosis reliqua avis

adultae; caput ad latera nonnihil ad canum vergens; rostrum pallidius coccineum; irides albae, circa pupillam vix obscuriores.

*Psittacus minor viridis.* Aldrov. 1. p. 680. *Psittaca gingi-niana* Briss. 4. p. 343. t. 29. f. 1. *Perruche de Gingi.* Buff. Pl. enl. 239. (fig. mediocr.) *Psittacus Eupatria* Auctor. *La Perruche à epaulettes rouges* Le Vaill. 1. c. t. 73. (fig. opt.)

Regio ophthalmica tota plumosa; irides albae, vix conspicue in isabellinum vergentes, circa pupillam griseo-virescentes (in speciminibus aliis hic color circa pupillam griseo-virescens vix conspicuus); palpebrarum margo tam juvenilis quam adultae avis isabellino-incarnatus; pedes incarnato-albidi; cauda perquam gradata, rectricibus duabus intermediis longissimis, gracilibus. Longitudo a rostri apice ad caudae basin  $6\frac{1}{2}$ " , rectricum duarum intermediarum 13" (interdum ultra), extimarum 4". Habitat in *India orientali*, praesertim in insula *Ceylon* (*Mus. Paris., Berol.*; multos vivos vidi).

*Expositio synonymiae Psittaci Alexandri auctorum.* — *Gmelini Psittacus Alexandri* eadem species ac hujus auctoris et *Lathamii Ps. Alex.* var.  $\gamma$ , noster *Palaeornis borneus*, sed synonymia falsa est. — *Gmelini* ac *Lathamii Ps. Alex.* var.  $\beta$ . spectat ad hornotinum, *Ps. Alex.* var.  $\delta$ . ad adultum *Palaeorn. cubicularem.* — *Gmelini Ps. Alex.* var.  $\epsilon$ , Edwardsiana tabula non satis accurata innitens (*Lathamii* aliorumque auctorum *Psittacus indicus*) ad *Palaeorn. cyanocephalum* referri debet. *Psit. Alex.* var.  $\gamma$ . *Gmelini (Lathamii Psittacus Osbeckii)* est *Palaeornis pondicerianus*.

2. *P. cubicularis.* Ptilosis eleganter virens, subsericea; gastraeum notaeo dilutius; occiput et cervix subtiliter amethystino-lavata; fascia cervicis rosea supra colli latera transversim extensa, ibique procedendo paullo latior, attamen plumis superimpositis subobtectis;

linea a naribus ad oculos utrinque ducta et taenia latiuscula menti supra gulam expansa longitudinalis, utrinque in lineam concolorem horizontalem excurrans, cum nuchae fasciola utrinque connexa, nigra; plumae taeniae basi flavae; remiges pteromataque saturate viridia, illae intus margine et subtus nigricantes, pognii margine externo stricte flavidae; tectrices alarum inferiores flavae, in viride nonnihil vergentes, superiores omnes virescentes; rectrices extus virides, intus et subtus flavae, duae intermediae (subtus versus apicem viridi-nigricantes), supra fere totae coerulescentes, sequens utrinque extus paullo coerulescens; rostrum purpureum; mandibula ac maxillae apex nigricantia; pedes grisei, inter squamulas albidis. *Mas triennis*.

*Psittacus cubicularis* *Hasselq.* Reise nach Palaest. p. 292. (*Descript. opt.*). *Psittaca torquata* *Briss.* 4. p. 323. (*Descript. opt. a Gmel. ad Psitt. Alexandri Linnaei false relata*). *Id Psittaca borbonica torquata* l. c. p. 328. t. 27. f. 1. *Perruche à collier de l'isle de Bourbon* *Buff.* Pl. enl. 215 (*fig. mala.*). *Psittacus Alexandri* var.  $\delta$ . *Gmel., Lath. Perruche à double collier* *Le Vaill.* l. c. t. 39 (*certo tabula Buffoniana!*). *Psittacus bicollaris* *Vieill.* Nouv. Dict. d'histoire nat. 25. *Psittacus bitorquatus* *Huhl* l. c. *La Perruche à collier* *Buff.* Pl. enl. t. 551 (*fig. mediocr.*). *Psittacus Alexandr.* var.  $\beta$ . *Gmel., Lath. Psittacus semirostris* *Herm.* Observ. zool. p. 125. *Perruche à collier rose* *Le Vaill.* l. c. t. 25 (*fig. sat. accur.*). *Psittacus manillensis* *Bechst.* in *Lath.* deutsch. Uebers. der Vögel. *Psittacus fraenatus* *Illig.* in *Mus. Berol.* *Psittacus docilis* *Vieill.* N. D. et *Encycl. meth. Psittacus torquatus* *Huhl* l. c. p. 30. n. 34.

*Mas biennis.* Mari trienni similis; fascia nuchae subobsoleta; mentum et gula viridia; rostrum basi subcocchineum.

*Av. hornot.* (et *Foem.*?). Ptilosis pallide viridis sine rubedine et nigredine; rectrices supra versus apicem coerulescentes; rostrum

obscure rubicundum; mandibula et apex maxillae subobscura; irides albae, annulo circa pupillam obscuriore vix conspicuo; pedes incarnato-albidi.

*The long-tailed green Parakeet* Edw. t. 175. (*Ic. et descr. satis accur.*). *Psittacus rufirostris* Auctor., Kuhl (*synonymia prorsus confusa*). *Psittaca* Briss. l. c. p. 319 (*synonymia falsa, descriptio accurata*). *La Perruche Buff.* Pl. enl. 550 (*fig. satis accur.*). *Psittacus Krameri* Scop. Ann. 1. p. 31. — *La Perruche Sincialo* Le Vaill. l. c. t. 42 (certa Edwardsiana icon mutata!). *Le jeune âge de la Perruche à collier rose* Le Vaill. l. c. t. 23. (*fig. nimis magna*).

*Var. α.* Ptilosis tota sulphurea.

*Le Vaill.* l. c. t. 43.

*Var. β.* Remiges singulae flavae.

Rostrum breve, altum, unco brevi; regio ophthalmica plumosa, solum palpebrarum regio nudiuscula, albida; irides duobus annulis constructae, exteriore angustiusculo albo, interiore (in his speciminibus lato, in illis angustiore) griseo; ungues corneo-cinerei; cauda rectricibus perquam gradatis, duabus intermediis angustis, longissimis. Longitudo a rostri apice ad caudae basin  $6\frac{1}{4}''$ , rectricum duarum intermediarum  $10\frac{3}{4}''$ , extimarum  $2''\ 10'''$ , alae  $5\frac{3}{4}''$ , maxillae  $9\frac{1}{2}'''$ , tarsi  $5'''$ . Habitat satis frequens in *Senegambia*, *Aethiopia* (unde Cairum lucri causa ab Aethiopibus transfertur) ac in insula *Bourbon*; facile adsuescit; sonum edit clangentem, fastidiosum. (*Mus. Paris., Berol., Monac.*; multos vivos vidi, tam adultos quam juveniles et pullos).

*Observationes.* *Linnaei Psittacus Alexandri* (Amoen. acad. 4. p. 236. et *Mus. Ad. Frid.* 2. p. 14.) species distincta, indica, ab hac toto coelo diversa, no ster *Pal. borneus*. Varietas  $\beta$  (*Ps.*

*gutanensis*) *Psittaci rufirostris Gmelini*, maxime *Marcgravei Aiura-catinga* (*Psittacus Macao*, *Briss.* l. c. p. 330.) ac, quoad descriptionem coloris rostri ac pedum psittaco quodam ignoto *Labatii*, nixa, e foro ornithologico prorsus releganda est. — Observavi *Palaeorn. cubicularem* vivum per tres quatuorve annos, avi juniori per totum hoc tempus in omni puncto similem, si excipias rostrum obscurius tinctum. Demum post annum, ut suspicor, quartum, avi fasciola nuchae rosea increvit. Avem, ni fallor, talem cum rostro nigrescente nuperrime descripsit pro distincta specie cl. *Vigors* sub nomine: *Palaeornis inornatus*. (*Zool. Journ.* 1830. p. 274.) Rostrum avium juveniliū in loco natali occisarum semper plus minusve obscure coccineum. — An foemina sine nuchae fasciola et sine gulae macula nigra?

3. *P. borneus*. Maxilla rubra, mandibula nigra; caput totum coeruleo-purpurascens; sinciput viridi-indutum; linea frontis cum utroque apice ad oculum ducta nigra; macula pone oris angulum obliqua nigra; collum posticum, dorsum, tergum, uropygium alaeque supra dilute viridia, harum tectrices superiores mediae ad flavum inclinantes; mentum, collum anticum, pectus ac epigastrium medium rubicundo-purpurascens, in castaneum vergentia; venter, abdomen crissumque viridia; rectrices omnes virides, exceptis duabus intermediis ad coeruleum inclinantibus; omnium rhachis alba.

*Bracelat Parrakeet from the East-Indies Alb.* Birds 2. t. 18. *Psittacus Alexandri Linn.* Mus. Ad. Frid. 2. p. 14. *Amoen. acad.* 4. p. 236. 2. *Gmel.* (*exclusis variet. β, δ, ε et Brissonii Psittaca torquata*). *Id.* *Psittacus erythrocephalus, borneus* var. *γ*. *Psittacus Alexandri* var. *γ*. *Lath.* *Id.* *Psittacus ginginianus* var. *γ*.

Cera, orbitae ac pedes cinerea; irides flavae; rectrices duae intermediae longissimae, angustae, reliquis multo longiores. Longitudo

12". Habitus *Palaeorn. bengalensis*. Habitat in *Borneo*. Vivum vidi.

*Observatio.* Hanc speciem ornithologi recentiores plane neglexerunt, unde horum falsa expositio synonymiae *Psittaci Alexandri* Linnaeani. Nomen huic avi a *Linnaeo* inditum, propterea non adoptavimus, cum non ille sit psittacus, qui sub *Alexandri* expeditione innotuit.

4. *P. melanorhynchus*. Rostrum validum, totum nigrum, mandibulae basi excepta corneo-fuscescente; caput canum; pileus totus et occiput nec non regio parotica pro vario ad lucem objectu subtiliter lilacino-reflectentia; regio ante et supra oculos subtilissime virescenti-lavata; lineola frontis cum utroque apice ad oculum ducta ac macula utrinque pone mandibulae basin lata, subtrigona, deorsum ducta aterrimae; colli pagina anterior et lateralis pars reliqua, pectus ac epigastrium rosea, plumis basi virescentibus; rubedo versus occipitis latera extensa ibique strictissima, attamen occiput non cingens; tibiae, latera, crissum et abdomen viridia, hoc in medio et crissum nonnihil ad turcino-coeruleum vergentia; collum posticum, dorsum, tergum, uropygium, caudae tectrices superiores, pennae scapulares, pogonium externum et apex omnium remigum ac pennarum alulae spuriae laete gramineo-viridia; remiges subtus et intus nigricantes, prima tota nigra; alarum tectrices superiores mediae ac maiores flavidae, magnae virescentes, flavido-marginatae, minores prope flexuram alaeque margo viridia, inferiores minores virescentes, maiores cinerae; rectrices omnes supra virides, versus apicem et per totam longitudinem juxta rhachin turcino-coerulescentes, subtus aureo-virescentes. *Av. adult.*

*Psittacus pondicerianus* var. b. *Bechst.* Uebersetz. der Vög. *Lath.* S. 203. n. 38.

Macula ante et pone oculos pusilla nuda; irides flavidae; pedes

plumbei; cauda *Pal. pondiceriani*. Longitudo a rostri apice ad caudae basin 8", rectricis (intermediae rectrici proximae) 4  $\frac{3}{4}$ ", alae 6  $\frac{1}{2}$ ", tarsi 7", digiti antici externi, excluso ungue 11  $\frac{1}{2}$ ", rostri ad frontem 15  $\frac{1}{4}$ ", eiusdem ambitus basalis 2  $\frac{3}{4}$ "; latitudo inferior maculae pone mandibulae basin nigrae 1". Habitat in *India orientali* (*Mus. Monac.*).

*Observatio.* *Pal. pondiceriano* quoad ptiloseos picturam prorsus similis, ab eo certo diversus corporis partibus omnibus validioribus ac rostro nigro, minus intumido. Specimen descriptum, rectricibus intermediis paullo laesum, vivum observavi apud regem nostrum clementiss. *Maximilianum Josephum*.

5. *P. pondicerianus*. Maxilla corallino-rubra, apice flavida; mandibula concolor paullo dilutior; caput canum, pro vario ad lucem objectu lilacino subreflectens, plumis basi flavescens; lora subtiliter virescenti-lavata; stria frontis angustissima cum utroque apice ad oculum ducta ac macula a mandibulae basi deorsum ducta magna, apice inferiore dilatata, aterrimae; collum anticum, pectus ac epigastrium rosea, paullo lilacino-reflectentia; rubedo versus colli latera suprema ducta, ibi strictissima, ut plurimum supra nucham extensa; abdomen, hypochondria, tibiae, crissum et alarum tectrices inferiores laete virescentes; abdomen medium coerulescenti-reflectens; collum posticum, dorsum, tergum, uropygium, caudae tectrices superiores, pennae scapulares, remiges omnes, alulae pennae extus, alarum flexura ac margo saturate viridia; remix prima tota nigra, margine extimo vix conspicue flavida; remiges reliquae intus nigrae, extus subtiliter flavo-marginatae; tectrices alarum superiores minores ex parte ac mediae flavae, majores flavido-virescentes; rectrices omnes supra dorso concolores, duae intermediae juxta rhachin et apice (extimo dilutiores) coerulescentes, reliquae pro vario ad lucem objectu nonnihil coerulescenti-reflectentes, omnes subtus olivaceo-flavae. *Mas et Foem. adult.*



*Perruche de Pondichery Buff.* Pl. enl. 517 (fig. bona).  
*Psittacus pondicerianus* Auct. or. (exclusa var.  $\beta$ ). *Psittacus my-*  
*staceus* Shaw Gen. Zool., *Psittacus javanicus* Osb., *Psittacus*  
*Alexandri* var. 2, Gmel., *Rose-ringed Parrakeet* var. e. Lath.  
 Synops. 1. p. 237. Id. *Psittacus Osbeckii* Ind. ornith. p. 87. n.  
 16., Horsf. *Perruche à poitrine rose* Le Vaill. l. c. t. 31  
 (fig. mediocr.).

*Avis hornot.* Frons sine striola; pileus totus capitisque latera  
 grisea; occiput virescens, vinaceo-variegatum; macula pone mandi-  
 bulae basin fuliginoso-varia; jugulum et reliquae gastraei partes  
 dilute virescentia; alarum macula virescenti-flava; remiges omnes ex-  
 tus et intus flavo-marginatae; cauda (brevior) ac reliquae corporis  
 partes avis adultae, solum rectrices subtiliter flavido-marginatae;  
 rostrum testaceo-fuscum, paratonis pallide corallino-rubrum, apice  
 maxillae et mandibulae albidum; ungues corneo-fusci.

*Avis junior adultae ptilosi se induens.* Avi hornotinae similis,  
 frontis fasciola plus minusve conspicua, caput plumis canis, collum  
 roseis variegata.

*Varietas avis juvenilis.* Avi hornotinae similis, sed frons, gula,  
 jugulum, capitis latera et colli subaurantia, rostrum pallide san-  
 guineum.

*Psittacus bimaculatus* Sparrm. Mus. Carlson. Fasc. 2. t. 30.  
 Lath.

Regio ophthalmica strictissime nuda; irides strictissimae, pallide  
 isabellinae; pedes plumbei, unguibus flavidis, apice nigricantibus (in  
 speciminibus domefactis toto corneo-fuscis); cauda elongata, perquam  
 gradata; rectrices duae intermediae reliquis dimidio longiores, angu-  
 stae, praesertim versus apicem. Longitudo  $12\frac{1}{4}$ " , rectricum duarum  
 intermediarum  $6''\ 3'''$ , rectricis proximae  $4''$ , alae  $5\frac{3}{4}$ " , tarsi  $5\frac{1}{2}$ " ,

digiti antici externi, excluso ungue, 9<sup>'''</sup>, rostri ad frontem 13<sup>'''</sup>, ejusdem ambitus basalis 2<sup>''</sup> 3<sup>'''</sup>; latitudo inferior maculae pone mandibulae basin nigrae 6—7<sup>'''</sup>. — Habitat satis frequens in *Pondichery* et *Java*, Javanis *Batet* sive *Bettet* dictus. (*Mus. Paris.*, *Berol.*, *Monac.*; multos vivos vidi.)

*Observatio.* Auctorum varietas  $\beta$  spectat *Palaeornith. barbatus*, *Bechsteinii* varietas  $b$  *Palaeorn. melanorhynchum*.

6. *P. barbatus*. Maxilla rubra, mandibula pallidior; caput supra viride; regio maxillae basin inter et oculum castanea, linea intermedia nigra dissecta; macula pone mandibulae basin nigra, deorsum ducta 6<sup>'''</sup> lata; nucha purpurascens; reliqua corporis ptilosis viridis, trunci inferioris pallidior; remiges obscurae, extus coeruleae.

*Mastachoe Parrakeet* Var. A. *Lath.* Synops. 1. p. 238. *Psittacus pondicerianus* var.  $\beta$ . *barbatus* *Gmel.*, var.  $\beta$ . *Lath.*

Habitus *Palaeornithos mystacei*; pedes obscuri. Longitudo a rostri apice ad caudae basin 7<sup>''</sup> (mens. angl.). — Habitat, ut dicitur, in *India orientali*. (*Mus. Hunterianum Londini*.)

*Observatio.* Species a *P. pondiceriano* toto coelo diversa, potius *P. malaccensis* affinis, de quo signis notatis satis discedit.

7. *P. malaccensis*. Maxilla rubra, apice pallida, mandibula rubro-nigricans; pileus saturate viridis; capitis latera ac nucha laete roseo-rubra, haec paullo lilacino-reflectens; vitta pone mandibulae basin oblique versus colli latera ducta, pone attenuata, nigra; collum posticum et dorsum supremum, tergum uropygiumque coerulescenti-virescentia; dorsum, alae supra, crissum ac omnes rectrices supra saturate viridia, rectricibus duabus intermediis exceptis laete coeruleis, apice extimo viridibus; cauda subtus flavida; jugulum, pectus ac reliquae gastraei partes flavo-virescentia; remiges subtus et intus

nigricantes; tectrices alarum inferiores flavo-virescentes. *Mas* et *Foem. adult.*

*La Perruche à nuque et joues rouges* *Le Vaill.* l. c. p. 4. t. 72 (fig. opt.). *Psittacus barbatulatus* *Bechst.* in *Lath.* Uebers. der Vög. S. 77. n. 57., *Kuhl* l. c. p. 32. n. 38.

*Avis junior.* Avi adultae similis, vitta pone mandibulae basin atra, viridi-varia; mandibula flavido-fusca, maxilla rubra.

*Perruche de Malac.* *Buff.* Pl. enl. 887. *Psittacus erythrocephalus* var.  $\delta$ , *malaccensis* *Gmel.*, *Psittacus ginginianus* var.  $\delta$  *Lath.*, *Psittacus erubescens* *Shaw.* Gen. Zool. 8. p. 437.

Pedes grisei; caudae longissimae forma et habitus totius corporis *Pal. bengalensis*; rectrices duae intermediae angustissimae; macula alarum rubra nulla. Longitudo a rostri apice ad finem rectricum duarum intermediarum  $14\frac{1}{2}''$ , rectricis intermediae  $8''$ , extimae  $2''$ , alae  $5''$ , rostri ad frontem  $13\frac{1}{2}'''$ . Habitat in *Malacca* (*Mus. Paris.*, *Berol.*).

8. *P. bengalensis.* Maxilla flavida, mandibula corneo-fuscescens; caput et nucha roseo-rubra; genae, regionis paroticae pars inferior, nucha et occiput lilacina; linea prope oris angulum incipiens, supra gulae latera ducta, latiuscula, dein angulosa strictior et introrsum flexa, capitis inferioris latera et nucham cingens, aterrima; cervix, tergum ac uropygium turcino-virescentia; dorsum, pennae scapulares, remiges ultimae ac caudae tectrices superiores flavido-virentes; alarum tectrices superiores ac inferiores coerulescenti-virides; superiorum in humeris nonnullae obscure purpureae; jugulum, crissum, tibiae ac reliquae gastraei partes flavo-virescentia, excluso collo antico supremo paullo nigricanti-variolo; remiges extus et apice (intus paullo juxta rhachin) intense virides, intus et subtus nigricantes, secundariarum apex subtrigonus; rectrices duae intermediae an-

gustae, longissimae, supra coeruleae, subtus nigricantes, apice supra et subtus albae, reliquae extus viridi-coerulescentes, apice et interno pogonio flavidae, intus versus apicem virescentes, subtus toto flavidae. *Mas et Foem. adult.*

*The rose headed Ring-Parrakeet* Edw. 1. t. 233 (*figura mediocris, fide Edwards e specimine in cauda perquam laeso*). *La Perruche de l'isle de Luçon* Sonner. Voy. à la Nouv. Guin. p: 79. t. 42. *Perruche de Mahé* Buff. Pl. enl. 888 (*fig. mala*). *Psittacus bengalensis* Linn., Kuhl 1. c. *Psittacus erythrocephalus* Gmel. var.  $\beta$  *bengalensis*, *Psittacus ginginianus* var.  $\beta$ . *Lath.*, *Psittacus rhodocephalus* Shaw Mus. Lever. p. 185. tab. 45 (*fig. pessima*). *La Perruche à collier noir* Le Vaill. 1. c. t. 45 (*certo icon Edwardsiana mutuata!*), *Psittacus erythrocephalus* Kuhl (*exclusa synonymia*). *La Perruche Fridytutah* Le Vaill. 1. c. t. 74 (*fig. bona*).

*Avis junior.* Avi adultae similis, diversa: rostro toto rubicundo, rectricibus duabus intermediis (brevioribus) toto viridibus, reliquis pogonio interno flavis, externo viridibus.

*Psittaca ginginiana erythrocephalos* Briss. IV. p. 346. t. 29, f. 2. (*Descript. opt.*). *Perruche à tête rouge de Gingi* Buff. Pl. enl. 264, *Psittacus erythrocephalus* Gmel. (*exclus. variet.*). *Psittacus ginginianus* Lath. (*exclus. variet.*).

*Varietas.* Corpus totum flavum, caput et macula alarum rubra.

*Psittacus Narcissus* Lath. Synops. 8. t. 123 (*descr. et ic. e specimine domefacto*).

Facies tota plumosa; irides angustiusculae, flavae; pedes plumbei inter squamulas albo-pulverulenti; ungues cinerei; cauda longissima, perquam gradata; rectrices duae intermediae reliquis triplo et ultra

longiores. Longitudo a rostri apice ad caudae basin 6", rectricum 2 intermediarum  $8\frac{3}{4}$ ", extimarum 2" 4"', alae 4" 11"', rostri ad frontem 10"', tarsi  $4\frac{1}{2}$ ", digiti externi cum ungue 11"'. Habitat in *Bengala, Pondichery* et *Luçon*. (*Mus. Paris., Berol., Monac.*; vivum vidi apud regem nostrum clement. *Maximilianum Josephum*).

9. *P. incarnatus*. Macula menti parva coccinea; alarum tectrices superiores omnes rubicundae; ptilosis capitis totius, colli superioris, dorsi, tergi, uropygii, caudae tectrices superiores, pennae scapulares remigesque omnes extus saturate virides; jugulum, omnes gastraei partes ac alarum margo flavido-virescentia; rectrices supra et subtus saturate virides. *Av. adult.*

*The little red-winged Parrakeet Edw. 1. t. 236 (fig. opt.). Psittacus incarnatus Auctor. La Perruche à gorge rouge Le Vaill. l. c. p. 94. t. 46 (certe mutuata tabula Edwardsiana!).*

Rostrum incarnatum; cera pallide incarnata; regio ophthalmica nudiuscula, albida; irides fusco-atrae; pedes incarnati; cauda elongata, perquam gradata. Habitus et fere magnitudo *Sittaces Tirica*, eadem gracilior. Habitat . . . . .? (*Edwards*).

*Observatio.* Haec species, mihi nusquam obvia, forsan ad *Sittacas* ponenda.

10. *P. cyanocephalus*. Caput totum ac collum supremum coeruleo-violacea; sinciput nonnihil ad rubicundum inclinans; mentum gulaque cinereo-violacea; nucha torque luteo terminata, in gutture in colorem luteo-viridem excurrente; collum posticum infimum, dorsum supremum, tectrices alarum superiores omnes ac pennae scapulares olivaceo-viridia; tectrices humeris confines reliquis lucidiores, ad flavum inclinantes; tergum, uropygium caudaeque tectrices superiores laete virides; pectus, venter, abdomen crissumque luteo-viri-

dia; alarum tectrices inferiores minores beryllino-virides, majores cinereae; remiges omnes supra et apice virides, pogonii margine externo stricte flavidae, interno nigrae; omnium rhachis nigra; rectrices subtus cinereo-luteae, duae intermediae basi virides, versus apicem magis magisque ad coeruleum vergentes, apice flavido-albae; rectrix proxima utrinque extus intermediis concolor, intus lutea, sed versus apicem ad viride vergens; rectrices quatuor utrinque extimae extus virides, intus luteae, apice nonnihil ad viride inclinantes, laterales flavo-terminatae; omnium rhachis supra nigra, subtus alba. *Mas adult.*

*The bleu-headed Parrakeet* Edw. 2. t. 292 (fig. non satis accur.). *Psittacus Alexandri*, var.  $\epsilon$ . Gmel., *Psittacus indicus* Lath. et auctor. recentior. *Psittaca Cyanocephalos* Briss. Av. p. 359. t. 19. f. 2 (descriptio optima). *Perruche à tête bleue des Indes orientales* Buff. Pl. enl. 192 (fig. mala.). *Psittacus cyanocephalus* Gmel., Lath., Bechst., Vieill. *Perruche à tête bleue dans son jeune âge* Le Vaill. l. c. t. 26 (fig. mala, certe mutata icon Buffoniana!). *Id.* *Perruche à collier jaune* l. c. p. 8. t. 75 (fig. bona). *Psittacus annulatus* Bechst. Uebers. der Vög. Lath. S. 77. n. 58., Kuhl l. c. p. 31. n. 36. *Psittacus flavitorquis* Shaw. Gen. Zool. 8. P. 2. p. 439. *Psittacus flavicollis* Vieill. N. D. 25. p. 345. *La Perruche à épaulette jaune.* Le Vaill. l. c. t. 61 (certe male mutuata figura Edwardsiana, in qua colli annulus flavus deest, sed alarum macula nimis flava merito omissa est!). *Psittacus xanthosomus* Bechst. in Lath. Uebers. der Vög. S. 74. n. 48., Kuhl l. c. p. 34. n. 42. *Psittacus ternatensis.* Vieill. N. D., Encycl. method.

*Avis junior.* Caput dilutius violaceum nonnihil ad griseum vergens, torque nuchali minus distincto, pallidiore; reliqua ptiloseos pictura avis adultae; rostrum totum albidum.

*Le Vaill.* l. c. t. 76 (fig. bona). *Palaeornis flavicollaris* Vigors, Philos. Mag. and Ann. of Philos. 1830. p. 455.

Regio ophthalmica tota plumosa; irides aurantiae; maxilla lutea apice cinerascens, mandibula tota cinerea; pedes cinereo-coerulescentes, unguibus griseis; cauda longissima, gradata, lanceolata. Habitus *Pal. cubicularis*. Longitudo  $12\frac{1}{2}''$ , caudae  $6\frac{3}{4}'''$ , tarsi  $4'''$ , alae  $4''\ 10'''$ , rostri ad frontem fere  $9'''$ . Habitat in *India orientali* ad flumen *Ganges*, satis frequens in *Pondichery* (*Mus. Paris, Berol.*).

*Observatio.* *Pal. cyanocephalus* a *Brissonio* optime descriptus, satis accurate depictus, primum a *Le Vaillantio*, dein a *Bechsteinio* aliisque post hunc ornithologis pro juvenili *Trichoglossa haematodo* habebatur. Nixi sunt auctores praesertim icone Buffoniana mala, quam, quod mihi certe videtur, *Le Vaillantius* depinxit. Caveas velim, ne auctorum recentiorum *Psittacum annulatum* temere recipias, qui *P. cyanocephalum* optime praebet; idem monendum de *Bechsteinii Psittaco xanthosomo*, et *Vigorsii Pal. flavicollari*.

11. *P. columboides*. Bitorquatus; dorsum et abdomen imum, alae caudaque supra viridia; caput, pectus, dorsum et abdomen summa plumbescenti-cana; torques colli superior gracilis gulaque nigra, torques inferior latus; frons ac regio periophthalmica coerulescenti-virides (*Vigors*).

*Palaeornis columboides* Vig. Zool. Journ. 1830. p. 274. Magnitudo *Palaeornithos Alexandri*. Patria . . . ? — (*Non vidi.*)

## II. Genus. *Polytelis*. Pag. 27.

1. *P. Barrabandi*. Rostrum totum rubrum; frons, sinciput, mentum, gula suprema genaeque ex parte dilute aurantia; gula

fascia angusta, semicirculari, aurantio-coccinea terminata; lora, regio ophthalmica ac parotica, occiput, collum totum, truncus supra ac subtus, caudae alarumque tectrices superiores ac inferiores viridia; occiput nonnihil in coeruleum, pennae scapulares ac dorsum in olivaceo-fuscum vergentia; gastraei partes pallidiores; femora coccineo-variegata; alulae pennae coeruleae, reflexu viridi; remiges obscure virides, supra nonnihil in coeruleum vergentes, intus ac subtus obscure nigricantes; rectrices omnes subtus nigricantes, apice paullo dilutiores, supra virides, intermediae coerulescenti-tinctae. *Av. adult.*

*Psittacus Barrabandi*. Swains. Zoologic. Illustr. n. 11. t. 59 (fig. bona.). *Palaeornis Barrabandi* Vigors et Horsf. Transact. of the Linn. Soc. 1826. T. 15. p. 287.

Cauda longissima, perquam gradata, rectricibus duabus intermediis apice rotundatis, reliquis apice lanceolatis; pedes unguesque nigri graciles, caeterum habitus *Palaeorn. cubicularis*. Longitudo 15", caudae  $8\frac{3}{4}$ ". Habitat in *Nova-Hollandia*. (*Collect. Societ. Linn. Londin., dom. Leadbeater*).

### III. Genus. *Pezoporus*. Pag. 28.

1. *P. formosus*. Laete ac saturate viridis; gastraei partes in flavum vergentes; frons prope maxillae basin fasciola strictissima rubra notata; plumae totius capitis stria longitudinali in medio nigra, dorsi, tergi ac alarum tectrices superiores macula intermedia magna, nigra, oblonga, in medio irregulariter flavo-fasciolata notatae; caudae tectrices superiores longae, inferiores, abdominis plumae, ventris ac laterum in medio fasciolis subnumerosis, angulosis, nigris ac flavis, pectoris maculis nonnullis parvis, subtrigonis, nigricantibus signatae; rectrices duae intermediae supra virides, subtus nigrae, crebro flavo-fasciolatae, sequentes intus laete flavae, fasciolis numerosis, ob-



liquis nigris, extus alternatim viridi- et flavo-fasciolatae; remiges intus nigricantes, macula in medio pallide flava trigona ad pogonii marginem notatae (unde in alarum pagina inferiore taenia obliqua flava), extus virides cum macula in medio marginis flava, in tribus primis non conspicua; harum prima absque viredine; margo alarum viridis; harum tectrices inferiores cineraceae, virescenti-lavatae, superiores majores intus nigricantes extus virescentes. *Mas et Foem. adult.*

*Psittacus formosus* Lath. Ind. ornith. 1. p. 103. n. 60. Kuhl l. c. p. 43. n. 64. *Psittacus terrestris* Shaw. Zool. of New-Holl. 1. p. 9. t. 3. *Id.* Mus. Lever. t. 55 (fig. bona). *Id.* Nat. Miscell. 228. *Perruche ingambe* Le Vaill. l. c. t. 32 (fig. bona). *Pezoporus formosus* Illig. Prodrum. Syst. Mammal. et Av. p. 201. Vig. et Horsf. l. c. p. 285.

*Avis junior.* Frons sine fasciola, sive haec strictissima, aurantia.

Regio ophthalmica tota plumosa; rostrum breve, crassiusculum, intumidum; maxilla quam mandibula minus alta, absque dente, culmine bianguloso-rotundata, corneo-fuscescens, tomis pallida; myxa lata, acie intermedia prominula, apice in medio submarginata, corneo-albescens; cera obscura, prominula; pedes pallide avellanei, tarso tereti elongato; digiti longi, graciles, lateraliter membranaceo-sublimbati; podotheca reticulata, squamulis hexagonis; ungues elongati, graciles, parum curvi, nigricantes, apice pallidi; cauda longissima perquam gradata, lanceolata; rectrices angustae, acutae, extus pogonio strictissimo praeditae; alae breviusculae, obtusiusculae; remiges primariae in medio pogonii externi subsinuatae. Longitudo  $11\frac{3}{4}''$ , rectricum 2 intermediarum  $7\frac{1}{4}''$ , extimarum  $2\frac{3}{4}''$ , alae  $4''$   $7'''$ , tarsi  $11'''$ , unguis digiti antici externi, omnium longissimi  $4\frac{1}{2}'''$ , rostri ad frontem  $7'''$ . Habitat frequens in *Nova-Hollandia* ac in *Terra van Diemen*. *Avis* speciosa ut plurimum in humo obambulans. (*Mus. Paris., Berol., Societ. Linn. Londin., collect. Sturm. caet.*)

IV. Genus. *Nymphicus*. Pag. 28.

1. *N. bisetis*. Viridis; frons et vertex sanguineo-coccinea; pennae duae e medio pilei assurgentes lineares, elongatae, atrae, apice coccineae (circiter longitudine capitis); genarum plumae ad mandibulae inferioris latera reversae atrae, nitentes; nucha ac aurium regio flavae; notaeum viride, gastraeum ac uropygium prasina; remiges primariae (10) earumque tectrices margine extimo cyanae, interno apiceque nigrae, reliquae extus virides, intus et apice nigrae; rectrices (12) extus basi virides, a medio ad apicem cyanae; alae caudaque subtus fuliginosae (*R. Forst.*).

*Psittacus bisetis* *R. Forster* in Manuscr., *Id.* Icon. inedit. tab. 43, *Lath.* Ind. ornith., *Id.* *Horned Parrot*. Synops. 1. p. 248. t. 8 (icon *Forster.*). *Psittacus cornutus* *Gmel.*, *Kuhl* l. c. p. 45. n. 68.

*Platycerco eximio* parum major; rostrum aduncum coerulescens, apice nigro (in quibusdam flavido); maxilla in medio utrinque dentata, basi lobo membranaceo palati ad angulum faucis instructa; lingua obtusa, integra; cera nigra; irides aureae; pedes unguesque nigri, illi cute granulosa tecti; alae complicatae uropygium paullo transcendentes. Habitat in locis cultis *Novae-Caledoniae*; ab incolis appellatur *Hèrè* vel *Hèghe*. *Reinh. Forster.* (*Mus. Lugd.*; specimen splendidissimum vidi Londini apud cl. *Ryals*).

*Observatio.* Specimen a cl. *Forster* Septembri in *Nova-Caledonia* occisum monstrat in pileo rubro plumulas longitudinaliter nigro-undulatas.

2. *N. Novae-Hollandiae*. Caput supra, ad latera gulaque lutea; macula pone oculum coccinea, pone flavida; pennae ex verticis medio assurgentes sex graciles, longissimae; corporis partes superiores fusco-olivaceae, inferiores ejusdem coloris, pallidiores; remiges secundariae apice albae, unde in alis fascia. *Av. adult.*

*Crested Parrakeet* Lath. Synops. 1. p. 250. *Psittacus Nova-Hollandiae* Gmel., Lath. et reliquor. auctor.

*Foemina?* Praecedenti forma ac colore similis, sed caput (pari modo cristatum) trunco concolor, lateribus paullo dilutius, pone oculum macula coccinea notatum; caput ac truncus ad castaneum vergentia; uropygium ac cauda lineis strictis transversis griseis notata; rectrix extima extus tota alba; remigés secundariae albo-terminatae. (An potius *avis junior?*)

Rostrum pallidum; cauda elongata, lanceolata; pedes obscuri. Longitudo 12" (mens. angl.). Habitat in *Nova-Hollandia*. Latham. (Non vidi).

V. Genus. *Prioniturus*. Pag. 28.

1. *P. platurus*. Macula occipitis magna griseo-coerulea, in vertice inter oculos fascia angusta cinereo-rubra terminata; sinciput, frons, capitis latera, collum posticum, dorsum, tergum, uropygium, caudae tectrices superiores, pennae scapulares remigesque extus saturate viridia; dorsum ad griseum inclinans; caput ac collum splendentia; fascia cervicis flavo-aurantia; tectrices alarum superiores minores cinereo-coeruleae, majores sensim in colorem cinereo-virescentem vergentes; jugulum ac reliquae gastraei partes laete prasina; rectrices supra saturate virides, parte apicali coeruleae, subtus dilute coeruleae, aequales, exceptis duabus intermediis, reliquas longitudine (2") multo superantibus; harum rhachis ante apicem in utroque latere nuda; remiges subtus coerulescentes. *Av. adult.*

*Psittacus platurus* Vieill. Nouv. Dict. 25. p. 314, *Id.* Encycl. meth. Livr. 93. p. 1367. *Kuhl* l. c. p. 43. n. 63. *Psittacus setarius* Temm. Pl. col. 15 (*fig. bona*).

Rostrum corneo-fuscum; pedes graciles, fusi. Habitus *Nym-*

*phici bisetis*. Longitudo a rostri apice ad finem rectricum laterali-  
um  $8\frac{1}{2}''$ , intermediarum  $11''$ . Habitat in insulis *Archipelagi in-*  
*dici*. *Temm.* (*Mus. Lugd.*). Non vidi.

*Observatio.* An *Psittacus discosurus Vieill.* (*Encycl. meth. Livr.* 93. p. 1369. et *Gall. des Ois. du Jard. du Roi* 1. p. 7. t. 24) specie an sexu sive aetate ab hac ave diversus? Habet, ut haec, rectrices duas intermedias ante apicem in utroque rhacheos latere nudas et picturam corporis universalem, rostrum autem albidum et color coeruleus in capite magis extensus est, vertex caret vitta rubra, cervix fasciola flava. Statura minor. Specimen a cl. *Vieillot* descriptum ac depictum adest in Museo Parisiensi.

#### VI. Genus. *Platycercus*. Pag. 29.

##### A. *Rectricibus admodum gradatis*.

1. *P. auriceps*. Laete viridis; frontis fascia angusta utrinque ad oculos ducta ac crissum purpurea; caput supra flavescenti-aureum; regio superciliaris ac reliquae gastraei partes viridi-flavae; cauda viridis, flavo-marginata; remiges nigricantes extus magna ex parte coeruleae, stricte viridi-limbatae.

*Psittacus pacificus* var.  $\delta$ . *Gmel., Lath.* — *Psittacus auriceps Kuhl* l. c. p. 46. n. 69. *Platycercus auriceps Vig.* *Zool. Journ.* 1825. n. 4. Suppl. Plates to the Zoologic. Journ. tab. II. — *Perruche . . . Less. Voy. de la Coq.* p. 417.

Rostrum fuscescens, basi plumbeum; pedes graciles, altiusculi, obscuri. Longitudo  $6\frac{1}{2}''$ . Habitat in *Nova-Caledonia* et *Nova-Seelandia* (*Mus. Londin.*).

2. *P. pacificus*. *Striola utrinque a maxillae basi per et ultra oculos ducta angusta* et uropygium coccinea; frons et sinciput atro-coccinea; capitis latera prasina; partes superiores, nucha, dorsum, tergum, caudae ac alarum tectrices superiores omnes nec non

alarum margo luride viridia; gastraeum pallidius viride; remiges nigricantes, primariae et pennae alulae spuriae pogonio externo coeruleae; remiges secundariae extus virides; rectrices cyanae margine virides, subtus fuscae, rhachi nigra; alae subtus earumque tectrices inferiores nigricantes. *Mas adult.*

*Psittacus pacificus* Reinh. Forst. in Manusc. *Id.* Ic. ined. t. 47 (*descriptio et icon optima*). *Psittacus Novae-Seelandiae* var. 1 Kuhl. *Id.* *Psittacus erythronotus* p. 45. n. 67 (*descriptio quoad capitis picturam imperfecta*).

*Foem.* Uropygii latera solummodo coccinea, rectrices supra toto virides, excepta rhachi nigra.

*Avis hornot.* Avi adultae similis; vertex fuscens; cervix pallide flavo-nebulosa; dorsum medium ex pallide ferrugineo fuscum; abdomen cinereo-viride; remiges primariae fuscae, margine coerulescentes, secundariae alulaeque pennae obscurae, margine virides et apice pallide ferrugineae, rhachi castanea.

*Psittacus Novae-Seelandiae* Gmel. *Psittacus zealandicus* Lath.

Rostrum breve, crassum, intumidum, culmine lato, rotundato, pallide coeruleum, apice nigrum; cera atra; lingua obtusa; irides aureae; palpebrae nigricantes; cauda elongata, gradata, subaequalis; pedes atrii unguibus compressis, tenuibus, incurvis, acutis, fere longitudine digiti postici interioris. Longitudo  $12\frac{1}{2}$ " , alae  $5\frac{1}{2}$ " , caudae 6" , tarsi 11" , rostri ad frontem fere 11" . Habitat in *O-Tahiti* et *Oriadea*; ab incolis appellatur *Aa*. Reinh. Forst. (*Mus. Berol., Londin., Societ. Linn.*).

*Observatio.* Pedes speciminis foeminini Berolinensis incarnato-cinerascentes; ex eodem hausi mensuram.

3. *P. Novae-Seelandiae*. Laete virens; frons, sinciput et macula pone oculos sanguinea; dorsum viride; pectus, abdomen et crissum viridi-flavescentia; remiges (18) fuscae, extimae 2—3 margine extimo coeruleae, apice fuscae; alula et tectrices quinque extimae coeruleae, apice fuscae; *alae subtus fuscae per remigum marginem anteriorem fascia ex maculis flavis, et alia concolore per marginem anteriorem tectricum secundariarum inferiorum notatae; rectrices supra fusco-virides, subtus fuscae, utrinque tertia et secunda apice flavae.*

*Psittacus pacificus*. *Var. ? R. Forster* in manusc. *Id.* *Id.* ined. tab. 45., 46 (*fig. opt.*). *Psittacus Novae-Seelandiae Sparrm.* Mus. Carlson. t. 28 (*fig. bona*), sed non *Gmel.* *Psittacus pacificus Gmel.* var.  $\beta$ , *Lath.* var.  $\beta$  et  $\epsilon$ .

Corpus magnitudine *Turdi*; lingua obtusa; oculi iride rubicundo-flava; rostrum atrum (maxillae basi plumbeum, sec. *Forsteri* iconem); cera pallide coerulea; pedes fuscii; *cauda subcuneata*. Longitudo 9", caudae 4½". Habitat in tota insula australi *Novae-Seelandiae*; victitat haccis, nam in arboribus et fruticibus bacciferis obvius, praecipue in *Coccoloba australi* et *Phytolacca completa*; inquilinis *Haghdareeku* audit. *Reinh. Forster.*

*Observatio.* Uropygium in utroque latere coccineum, fide *Sparrmann.*

4. *P. erythrotis*. Notaeum et gastraeum laete viridia, hoc quam illud pallidius; alula, pteromata remigesque primariae extus coerulea, intus fusca, secundariae extus virides, intus fuscae; sinciput, macula pone oculos, uropygium eiusque latera coccinea; rectrices quatuor intermediae virides, externae flavo-virescentes, subtus flavo-fuscae. *Mas.*

*Psittacus pacificus Gmel.*, *Lath.* var.  $\gamma$ . *Platycercus pacificus Vigors* Zool. Journ. 4. p. 526. sp. 1. Suppl. Plates to the Zoolog. Journ. Tab. I.

*Foem.* Mari similis; uropygii latera solummodo coccinea.

*Psittacus pacificus* Gmel., Lath. (exclusis varietatib.). *Psittacus Novae-Seelandiae* Kuhl l. c. p. 44. n. 65 (exclusis variet.).

Rostrum crassiusculum, plumbeum, apice nigrum; irides brunneae; pedes pallidiores, tarsis elevatis, digitorum longitudine; ungues teretiusculi; cauda lata, depressa, subrotundata, gradata, rectricibus apice rotundatis. Longitudo  $10\frac{1}{4}$ — $11\frac{1}{2}$ ". Habitat in insula *Macquariana*. (*Mus. Brit., Societ. Linn. Londin.*; specimen vivum vidi apud dom. *Vigors* Londini).

*Observatio.* Cum simili *Platycerco Novae-Seelandiae* non confundendus. Foeminam non ipse vidi.

5. *P. ulieteanus*. Caput totum, inclusa gula, fuliginosum; alarum caudaeque tectrices superiores omnes, nucha ac dorsum nec non tergum obscure olivacea, pluma quavis obscurius limbata; uropygium obscure coccineum; remiges caudaeque nigrescenti-fuscae; gastraei partes omnes, exclusis tibiis nigrescentibus, flavae, plumis obscurius limbatis. *Av. adult.*

*Psittacus ulieteanus* Lath., Gmel., Kuhl. *Platycercus ulieteanus* Vigors *Zoolog. Journ.* 1825. n. 4 Supplement. Plates to the *Zoolog. Journ.* Tab. III.

Habitus universalis, forma rostri et pedum gracilium, longiusculorum, alae ac caudae *Platycerci* praecedentis; rostrum parvum atrocoeruleum, apice nigrum; pedes nigricantes; cauda elongata, gradato-lanceolata. Longitudo fere 10". Habitat in maris pacifici insula *Tanna* (in *Ulietea* secundum *Latham*). *Mus. Londin.*

*B. Rectricibus gradatis sive subgradatis.**α. Cauda picta.*

6. *P. multicolor*. Frons large flava; sinciput viride, pone in rubicundum vergens; vertex brunneo-purpureus; ptilosis capitis reliqua, colli, pectoris, dorsi remigesque ultimae splendide virides; uropygium fasciis quasi tribus notatum, quarum prima virescens, sequens obscure viridis, tertia rubicunda; alarum margo, harum tectrices inferiores, pteromata remigesque extus azurea, harum pogonium internum nigrum; humeri aurantii; venter ac tibiae laete flava, in aurantio-rubrum vergentia; abdomen infimum crissumque dilute flava; rectrices duae intermediae coeruleae, reliquae dilute coeruleae, basi virides, medio nigrae. *Av. adult.*

*Psittacus multicolor* (non Gmel.) *Rob. Brown, Kuhl* l. c. p. 55. n. 88. *Temminck* Transact. of the Linn. Soc. 13. p. 119 (*descriptio opt.*). *Platycercus multicolor* *Vig. et Horsf.* Transact. of the Linn. Soc. 15. p. 283.

Rostrum griseo-corneum; pedes graciles, longiusculi, fusci; cauda elongata, subgradata, larga, apice rotundata. Habitus *Platycerci eximii*, 10 1/2" longus. Habitat in *Nova-Hollandia*. (*Mus. Societ. Linn. Londin.*)

7. *P. Barnardi*. Laete viridis; frons coccinea; fascia occipitis brunnescenti-fusca; dorsum coerulescenti-nigrum; torques nuchae interrupte flavus; genae, pteromatum rectricumque apex azureae; humeri, remigum margo rectricumque lateralium basis azurea.

*Platycercus Barnardi* *Vig. et Horsf.* l. c. p. 283. n. 6.

Habitus speciei praecedentis. Habitat in *Nova-Hollandia*. *Vig. Horsf.* (*Mus. Soc. Linn. Londin.*)

8. *Pl. pileatus*. Pileus totus castaneo-purpureus; abdomen,



crissum ac tibiae coccinea; lora obscure purpurea; capitis latera, tectrices alarum superiores omnes ac uropygium laete flavo-viridia; tectrices alarum inferiores, jugulum totum, pectus et epigastrium cyanea; hypochondria, collum posticum, pennae scapulares, dorsum et rectrices duae intermediae saturate viridia, harum rhachis nigra; rectrices ceterae basi virides, reliqua parte in pogonio externo cyanae, interno, quarta et quinta quoque in apice albae, quatuor extremae in parte baseos viridi extus macula oblonga nigricante notatae; alarum margo, alulae pennae nigro-terminatae, ac remiges intense cyanea, hae extus subtiliter nigro-marginatae. *Mas adult.*

*Platycercus pileatus* Vig. Zool. Journ. 1830. p. 274. *Perruche à tête pourprée* Quoy et Gaim. Voy. de la Corv. l'Astrolabe, sous le command. de d'Urville. Pl. 22 (fig. opt.).

Habitus et magnitudo *Platycerci Pennantii*; rostrum albescens, basi coerulescens; pedes fuscii unguibus nigrescentibus. Habitat in *Nova-Hollandia* (in portu regis Georgii). (*Mus. Paris.*)

♂. *P. venustus*. Caput et nucha intense nigra; nuchae plumae apice rubro-punctulatae; genae pure albae, attamen infra oculos nonnihil in azureum vergentes; plumae colli antici totius, pectoris, ventris, abdominis uropygiique stramineae, omnes subtiliter nigro-marginatae; crissum rubrum; alarum tectrices superiores ac inferiores omnes eleganter azureae; dorsi plumae scapularumque laete flavae, in medio nigrae; pteromata remigumque pogonium externum laete azurea; rectrices quatuor intermediae toto azureae, quatuor utrinque laterales ejusdem coloris sed largissime albo-lilacino terminatae. *Av. adult.*

*Psittacus venustus* Rob. Brown, *Huhl* l. c. p. 52. n. 83.  
*Psittacus Brownii* Temm. Transact. of the Linn. Soc. 13. p. 119.  
*Platycercus Brownii* Vig. et Horsf. l. c. p. 282.

Rostrum plumbeo-griseum; pedes nigri; cauda elongata, gradata, apice rotundata, lata. Habitus *Platycerci eximii*; 11" longus. Habitat in *Nova-Hollandia*; (*Mus. Societ. Linn., Londin.*)

10. *P. icterotis*. Macula a mandibulae basi ad tempora ducta laete flava; capitis partes superiores omnes, nucha tota ac jugulum nec non omnes corporis partes inferiores pallide coccinea; latera ad flavo-viride inclinantia; plumae dorsi alarumque tectrices superiores fuscae, largissime virescenti-limbatae; margo alarum remigumque basis dilute at eleganter coerulea; rectrices belle coeruleae, apice albae, basi, sicut quatuor intermediae totae virescentes; remigum pars reliqua externa dilute viridis. *Av. adult.*

*Psittacus icterotis* Temm., *Kuhl* l. c. p. 54. n. 86., *Temm.* Transact. of the Linn. Soc. 13. p. 120. *Platycercus Stanleyii* Vig. Zool. Journ. 1830. p. 274.

Habitus gracilis *Plat. eximii*; rostrum quam in hoc dimidia fere parte minus, cinereum; pedes graciles, praesertim tarsi elongati; cauda elongata, gradata, larga, ut in *Pl. eximio* formata. Longitudo 10 $\frac{1}{2}$ ". Habitat in *Nova-Hollandia*. (*Mus. Paris., Lugd.*)

11. *P. eximius*. Caput, totum jugulum, pectus supremum crissumque sanguineo-coccinea; macula utrinque pone mandibulae basin magna, horizontalis, candida; plumae nuchae, dorsi pennaque scapulares aterrimae, in utroque latere citrino-flavo limbatae; tergum, uropygium caudaeque tectrices superiores citrino-viridia; plumarum margo apicalis nigricans vix conspicuus; tectrices alarum superiores minores velutino-nigrae, harum marginales cyaneo-limbatae, mediae, inferiores (exceptis magnis nigricantibus) ac margo alarum dilute violacea, majores extus ejusdem coloris, intus cyanae; remix prima tota nigricans, sequentes supra et subtus nigrae, unicolores, supra externo pogonio a basi ad medium cyanae, secundariae extus toto cyanae, intus et margine apicali nigrae; rectrices duae intermediae

subtus nigrae, supra virides, versus apicem reflexu nonnullo violaceo; rectrix sequens utrinque subtus nigra, supra versus basin virescens, versus apicem violascens, apice fasciola strictissima alba, pogonio interno limbo nigricante signata; reliquae trinae extimae basi cyanaeae et ibidem intus paullo nigrae, reliqua parte lilacino-albae, apice et margine interno albidae, subtus eadem pictura, pallidiore; venter, pectus et epigastrium aureo-flava, hoc in medio paullo rubro-irroratum, reliquis plumis vix conspicue nigricanti-marginatis; abdomen tibiaeque uropygio concolores; suffrago et ani regio lilacino-reflectentes. *Mas* et *Foem. adult.*

*Psittacus eximius* Shaw Nat. Misc. t. 96. *Id.* Zool. of New-Holl. t. 1. *Lath. Suppl., Kuhl. Lori-Perruche de la mer du Sud. Buff.* Edit. de *Sonnini (Descriptio manca).* *Psittacus capitatus* Shaw. Gen. Zool., *Kuhl* l. c. n. 202. *Perruche omnicolore* *Le Vaill.* l. c. p. 59. t. 28 (fig. bona). *Psittacus omnicolor* *Bechst.* in *Lath. Uebers. der Vög.* p. 68. n. 18. *Psittacus Pennanti* ♀ *Wolf.* Abbild. merkw. naturgesch. Gegenst. H. 4. t. 17. *Platycercus eximius* *Vig. et Horsf.* l. c.

*Avis junior.* Avi adultae similis; tota piloseos pictura minus nitida; remigum pars externa coerulea albo-marginata; remiges omnes intus in medio macula majuscula, item tectrices inferiores majores tali minore, concolore notatae; occiput virescens; capitis, juguli ac crissi rubedo paullo in testaceum vergens; macula pone mandibulam luride alba, reflexu nonnullo lilacino; rostrum pedesque avis adultae.

*Var. α.* Plumae gastraei flavae, rubro-marginatae; capitis rubedo versus medium colli postici extensa.

*Le Vaill.* l. c. t. 29.

Rostrum mediocre *Pezopori formosi*, basi corneo-coerulescens, apice albidum; maxilla culmine rotundata, latiuscula; mandibulae latus

anterius latiusculum, biangulosum; regio ophthalmica parum nuda; irides obscure fuscae; pedes graciles *Pez. formosi*, nigricantes, unguibus gracilioribus, arcuatis, corneo-nigris; cauda elongata, lata, gradata, lanceolata, rectricibus omnibus apice rotundatis; harum pogonium externum angustum. Longitudo  $13\frac{1}{2}''$ , caudae  $6\frac{3}{4}''$ , alae  $6''$   $4''$ , rostri ad frontem fere  $9''$ , tarsi  $7\frac{1}{4}''$ . Habitat gregibus parvis locis cultis in *Nova-Hollandia* (inquilinis *Bundallock* dictus), migratorius in *Terra van Diemen*; nidificat in arboribus cavis, nidum ibi praecipue e plumis struens, ova sex immaculata, alba pariens. (*Mus. Paris.*, *Berol.*, *Monac.* caet.; multos vivos vidi.)

12. *P. caledonicus*. Frons large coccineo-rubra; vertex, nucha et gastraeum totum citrino-flava, immaculata; macula pone mandibulae basin magna, horizontalis, eleganter coerulea; cervix, dorsum alaeque supra fusco-nigricantia, subtiliter virescenti-lavata; plumae harum partium stricte viridi-limbatae; uropygium caudaeque tectrices superiores viridi-flavidae; rectrices intermediae olivaceo-virides, laterales basi intense cyaneae, dein albo-lilacinae (alteri luci oppositae pure coeruleae) apice albae; alarum margo ac harum tectrices majores coeruleae; remiges nigricantes, extus versus basin coeruleae. *Mas adult.*

*La Perruche à large queue*, 1<sup>ère</sup> variété. *Le Vaill.* l. c. t. 80 (fig. bona). *Psittacus Brownii* Kuhl l. c. p. 56. n. 90. *Psittacus flavigaster* Temm. Transact. of the Linn. Soc. 13. p. 116. *Psittacus flaviventris* Vig. et Horsf. l. c. p. 281. n. 2.

*Foemina*. Mari similis, ptilosi minus nitida.

*Avis hornot*. Ptilosis viridi-flavescens, ubi in ave adulta flava; plumae omnes dorsi alarumque fuscescentes, large viridi-limbatae; frons rubra.

*Psittacus caledonicus* Lath., Gmel., Kuhl.

*Avis juvenilis adultae ptilosi se induens.* Avi hornotinae similis, vertex ac gastraeum plumis flavis variegata.

Habitus rostri, alarum, caudae et pedum *Plat. eximii*; rostrum flavo-albidum; pedes fuscii. Longitudo  $13\frac{3}{4}$ ". Habitat satis frequens in *Nova-Hollandia* ac in *Terra van Diemen.* (*Mus. Paris., collectio Soc. Linn. Londin.*).

*Observatio.* Avis hornotina differt a simili hornotino *Platycerco Pennantii* corporis partibus inferioribus virescentibus magis in flavum vergentibus, dilutioribus, statura paullo minore, caet.

13. *P. jonquillaceus.* Caput, collum totum, pectus ac reliquae gastraei partes eleganter jonquillacea; dorsum supremum, pennae scapulares et alarum tectrices superiores obscure viridia; remiges et rectrices dorso dilutius virides, hae macula magna flava terminatae; margo alarum plumis rubris subvarius; tergum et uropygium coerulea.

*Psittacus jonquillaceus Vieill.* *Nouv. Dict.* 25. p. 352., *Encycl. meth.* Vol. 3. p. 1390.

Maxilla rubra; pedes grisei. Longitudo circiter 14". Habitat in *Nova-Hollandia.* (*Mus. Paris.*)

*Observatio.* Species sane distincta, a cels. viris *Quoy, Gaim.* et *Kuhl* cum *Platycerco vulnerato* et *Pl. erythroptero* false unita.

14. *P. vulneratus.* Caput et collum dilute viridia; pectus, venter caudaeque tectrices superiores ac inferiores flavo-virescentia; dorsum et alae supra saturate viridia, exceptis tectricibus superioribus alarum majoribus et minoribus coccineis; uropygium cyaneum; remiges primariae laete virides, intus nigrae, margine flavido; alae subtus nigrae, flexura cyanea; cauda supra velutino-viridis, rectricum margine flavo-reflectente, apice luteae, rhachi nigra, subtus nigrae, ad marginem sordide flavae.

*Psittacus erythropterus* Kuhl. l. c. p. 53. Quoy et Gaim. Voy. aut. du monde. Zoolog. t. 27.

Cauda subgradata, rectricum apice rotundato; rostrum breve, rubrum, apice albidum; pedes nigricantes. Longitudo  $14\frac{1}{2}$ " , caudae ultra 6". Habitat in insula Timor. (Mus. Paris.)

*Observatio.* *Psittacus erythropterus Lathamii* differt toto coelo statura minore, rectricibus unicoloribus, apice aequalibus. Vide *Platyc. erythropt.*

15. *P. zonarius*. Caput et nucha nigra, haec fascia lata citrino-flava, utrinque ad aures extensa terminata; macula utrinque pone mandibulae basin supra genas ducta intense coerulea; venter medius flavus; hujus latera crissumque dilute viridia; jugulum totum, pectus ac epigastrium, nec non omnes notaci partes obscure viridia; alarum flexura viridi-flavida; remigum pogonium externum pteromataque intense cyanea; remigum apex niger; rectrices duae intermediae intense virides, laterales intense cyanae, large coerulescenti-terminatae. *Av. adult.*

*Psittacus zonarius* Shaw. Miscell. 657. Kuhl l. c. *Psittacus viridis* Shaw Gen. Zool. *Psittacus cyanomelas* Kuhl l. c. p. 53. n. 84. *Psittacus Baueri* Temm. Transact. of the Linn. Soc. 13. p. 118., *Donav.* Naturalists Repository t. 64. *Platycercus Baueri* Vig. et Horsf. l. c. p. 283.

Rostrum subparvum cinereo-flavidum; pedes fusci, graciles, tarsi digitisque longiusculis; cauda elongata, gradata, lata. Longitudo 13". Habitus *Plat. eximii*. Habitat in Nova-Hollandia. (Mus. Soc. Linn.).

16. *P. Novae-Guincae*. Rectrices subtus dilute coccineae, apice flavae; cauda supra, alae, caput, collum ac tota trunci ptilosis brunnescenti-nigricantia, pro vario ad lucem objectu violaceo-reflectentia; rostrum totum nigrum. *Av. adult.*

*Lory noir de la nouvelle Guinée. Sonner. Voy. à la Nouv. Guin. p. 175. t. 110. Psittacus Novae-Guineae Auctor. Le Lori noir Le Vaill. l. c. p. 101. t. 49 (fig. bona).*

Regio ophthalmica nuda, fusca; irides e circulis duobus compositae, quorum unus coeruleus, alter minor rubro-fuscus; pedes unguisque nigricantes; cauda elongata, gradato-lanceolata, ut in *Platycerco Pennantii* formata. Longitudo 11". Habitat in *Nova-Guinea* ac in *Amboina*. (*Mus. Paris.*)

17. *P. Pennantii*. Macula pone mandibulae basin magna horizontalis, alarum margo, harum tectrices inferiores minores ac omnes superiores marginales eleganter azureo-violacea; capitis partes reliquae, collum laterale, anticum, totum gastraeum cum crisso, caudae tectrices superiores ac uropygium intense sanguineo-coccinea; suffrago paullo lilacino-tincta; plumae omnes basi nigrae, cervicis, tergi, et pennae scapulares aterrimae, margine lato sanguineo-coccineo; tectrices alarum superiores minores reliquae aterrimae, unicolores; remiges ultimae nigrae, rubro-marginatae, secundariae extus cyanae et paullo albo-marginatae, intus et apice nigrae, prima tota nigra, extus strictissime cyaneo-marginata, reliquae et alulae pennae extus cyanae, omnes subtus nigrae; rectrices duae intermediae subtus nigrae, supra toto cyanae, sequentes utrinque intus et subtus nigrae, supra externo pogonio cyanae, apice extimo, supra ac subtus, albo-lilacinae, reliquae intus ab extrema ad intimam per lineam obliquam magis magisque nigrae, ibidem extus cyanae, reliqua parte albo-lilacinae, reflexu coeruleo, apice extimo albae. *Mas et Foem. adult.*

*Pennantian Parrot Phil. Botany-Bay cum tab. p. 154. Psittacus Pennantii Lath. var. β. Wolf Abbild. merkw. naturg. Gegenst. H. 4. t. 16. Psittacus gloriosus Shaw. Nat. Misc. 1. t. 53. Id. Psitt. splendidus. Mus. Lever. t. 7. (fig. pessim.). La Perruche à large queue Le Vaill. l. c. t. 78 (fig. mala). Psittacus ele-*

*gans Kuhl l. c. Platycercus Pennantii Vig. et Horsf. l. c. p. 280.*

*Avis junior adultae ptilosi se induens.* Gastraei partes omnes obscure virescentes, interdum maculis rubris variae; macula genarum pallidius coerulea; frons ac sinciput, uropygium caudaeque tectrices superiores rubra; rectrices duae intermediae virides; dorsi plumae ac scapularum fusco-nigricantes, dilutius rubro-marginatae; rectrices intus macula alba notatae; reliqua ptilosis avis adultae.

*Psittacus Pennantii ♂ et ♀ Lath. Psittacus elegans Gmel., Lath. La Perruche à large queue, jeune âge. Le Vaill. l. c. t. 79. (fig. bona).*

*Avis hornot.* Avi juniore similis, plumae dorsi, colli postici, pennae scapulares rectricesque nigro-fuscescentes, large viridi-rubro limbatae; frons et sinciput rubra.

*Psittacus elegans var. β. Lath., Gmel.*

Habitus *Platycerci eximii*; maxilla corneo-coerulescens, apice albo-flavida, mandibula tota corneo-cinerascens; irides saturate avel-lanae; pedes fuscescenti-nigricantes, junioris avis fuscescenti-incarnati; ungues corneo-fusci.

Longitudo 15 1/2", caudae 8 1/2", alae 7", tarsi 8", rostri ad frontem 11". Habitat satis frequens in *Nova-Hollandia*, inquilinis *Dulang* et *Jalang* nominatus; gregarius in campis *Zeae*; nidificat in cavis truncis *Eucalypti piperitae*, ova quatuor alba in ligno ipso deponens. (*Mus. Paris., Berol., Monac.*; multos vivos vidi).

18. *P. erythropterus.* Notaeum saturate viride, gastracum flavescenti-viride; dorsum supremum ac pennae scapulares nigrae; fascia tergi azurea; tectrices alarum superiores omnes coccineae; pennae alulae spuriae ac rectrices intense virides.



*Psittacus erythropterus* *Lath.* Synops. Av. 1. p. 298. Suppl. II. p. 60. Ind. p. 126. n. 130., *Gmel.* *Psittacus melanonotus* *Shaw* Nat. Misc. t. 653. *Platycercus erythropterus* *Vig. et Horsf.* l. c. p. 284.

Rostrum rubrum apice pallidum; cera obscura; regio circa oculos nigrescens; pedes obscuri; rectricum apex aequalis. Longitudo circiter 14". Habitat in *Nova-Hollandia.* (*Mus. Soc. Linn. Londin.*)

*Observatio.* Species distincta, a cl. *Vig. et Horsfield* cum nostro *Platycerco vulnerato* false unita. *Foemina* a cel. *Latham* hoc modo describitur: Mari similis, dorsum supremum viride, tectrices alarum superiores virides, exceptis intermediis majoribus rubris.

β. Cauda obscura.

[ 19. *P. scapulatus.* Maxilla miniata, tomis et apice stricte nigricans; mandibula corneo-fusca; caput, collum totum, nec non omnes gastraei partes miniato-sanguinea; abdominis crissique plumae versus basin nigrae; fascia infra cervicem, tergum uropygiumque intense coerulea; dorsum, tergum supremum, pennae scapulares, margo alarum, harum tectrices superiores ac inferiores, alulae pennae remigesque omnes extus intense viridia, attamen stria supra tectrices superiores minores a flexura alae usque ad basin remigum ultimarum ducta latiuscula, flavo-viridis; tectrices inferiores internae nonnihil in coeruleum vergentes, majores nigrae; remigum rhachis, pogonium internum ac tota pagina inferior nigra; rectrices omnes supra et subtus nigrae, supra reflexu aeneo; caudae tectrices superiores olivaceae. *Mas adult.*

*Tabuan Parrot* *Phill.* Bot. Bay. c. tab. p. 153. *White Journ.* p. 168. c. tab. *Psittacus tabuensis* var. β. *Lath., Shaw, Vieill.* *La grande Perruche à collier et croupion bleues.* *Le Vaill.* l. c. p. 113. t. 55 (*fig. opt.*). *Psittacus scapulatus* *Bechst.* l. c.

*Kuhl* l. c. p. 56. n. 91. *Psittacus cyanopygius Vieill.* N. D. 25. p. 339. *Id.* Gal. des Ois. Suppl. *Platycercus scapulatus Vig.* et *Horsf.* l. c.

*Foem. adult.* Mari similis, exceptis capite et collo postico viridibus, collo toto antico, pectore et epigastrio sordide virescentibus, rostro cinereo-nigricante; maxilla et mandibula medio fuscescente.

*White*, l. c. c. tab. *Le Vaill.* l. c. t. 56 (fig. opt.).

*Avis hornot.* Rostrum ut in ave adulta pictum, parum pallidius, aut obscure nubilatum; caput ad latera, collum totum laterale ac anticum, pectus epigastriumque olivascenti-virescentia; frons, caput supra, nucha et dorsum viridia; alarum pictura avis adultae; tergi plumae uropygiique virides, large cyaneo-terminatae; abdomen, tibiae ac crissum rubra; crissi plumae versus basin virides; rectrices omnes subtus nigrac, supra olivaceo-nigricantes, longitudinaliter per medium viridi-reflectentes; duae intermediae supra toto obscure virides, alteri luci oppositae eleganter virides, laterales omnes in medio apicis extimi macula pusilla testacea notatae.

*Avis junior adultae ptilosi se induens.* Avi hornotinae similis; caput, jugulum, pectus et epigastrium maculis rubris variegata.

*Var. a.* Uropygium coeruleum, plumis intermixtis rubris.

*Var. β.* Caput supra, alae caudaque virescenti-flava; uropygium coerulescens; pectus flavescenti-rubrum; abdomen rubrum. *Kuhl.* (Non vidi.)

*Var. γ.* Flavus; caput et venter rubra; fascia cervicis coerulea. (Avis domefacta.)

Rostrum mediocre; maxilla intumida, culmine rotundata, ante apicem profunde emarginata; mandibula brevis, latere antico lata,

biangulosa, medio acie parum emergente aucta; regio ophthalmica tota plumosa; irides e circulis duobus compositae, externo flavo, interno latiore obscure fusco; pedes graciliores unguesque obscurissime incarnati; cauda elongata, gradata, apice rotundata, latissima. Longitudo 16", caudae 8 1/4", alae 8 1/4", tarsi 7", rostri ad frontem 1", eiusdem ambitus ad basin 2 1/4". Habitat frequens in *Nova-Hollandia*, in campis, *Zea* maturescente, gregarius incidens; nidificat in *Eucalyptis*, nidum e gramine, intus plumis stratum, struens, ova sordide alba nigro-maculata pariens. (*Mus. Paris., Berol., Monac.*; multos vivos vidi).

*Observatio.* Ad hanc speciem refert cl. *Kuhl* *Platycercum amboinensem* toto coelo diversum.

20. *P. amboinensis.* Notaeum totum, tectrices alarum inferiores, exclusis majoribus nigris, ac margo alae totus splendide cyanea; alae supra toto virides; remiges laterè toto inferiore et pogonio interno nigrae; caput, collum et totum gastraeum splendide coccinea, exclusis crissi plumis saturate viridibus, rubro-cinctis; rectrices omnes subtus toto nigrae, duae intermediae supra saturate violaceae, omnes reliquae pogonio interno nigrae, externo violaceae; rostrum nigrum; maxilla rubra, apice et tomiis nigra. *Mas adult.*

*Psittaea amboinensis coccinea* *Briss.* IV. p. 378. t. 28. f. 2. (*Descriptio opt.*). *Perruche rouge d'Amboine* *Buff.* Pl. enl. 240. *Psittacus amboinensis* *Auctor.* *Perruche à dos bleue, Mâle, Quoy et Gaim.* *D'Urville* Voy. de la Corv. l'Astrol. trois. Div. Zool. Ois. Pl. 21. f. 1 (*fig. opt.*).

Regio ophthalmica tota plumosa; cauda elongata ut in *P. scapulato* formata, reatricibus gradatioribus, apice rotundatis; pedes cinerascens (non rubri, ut *Brisson* habet), unguibus nigricantibus. Longitudo 15 1/2", caudae 11 1/2". Habitat in *Nova-Guinea* (et in

*Amboina* sec. *Briss.*). Specimen nitidum descripsi Londini apud dom. *Ryals* (?).

*Observatio.* Rectrices duae utrinque extimae pogonio interno nigricantes, rubro-marginatae (*fide Brisson*). Speciem hanc cl. *Huhl.* ad *Plat. scapulatum* false retulit.

21. *P. hysginus*. Rostrum plumbeo-nigricans, cera nigra; caput, collum, gastraeum totum, incluso crisso, intense purpurea; plumae tiliarum, crissi ac totius gastraei in medio virides, in capistro basi nigricantes, unde facies nonnihil in nigrum vergens; cervicis pars infima fasciola cyanea terminata; dorsum, tergum, uropygium, caudae ac alarum tectrices superiores pennaque scapulares eleganter virides, micantes; remiges ultimae dorso concolores, intus coerulescentes ibique nigricantes, primariae subtus toto nigrae, supra extus et intus nitide ac intense cyanae, limbo intimo ac scapo nigrae; alulae penna ejusdem coloris, extus (pro vario ad lucem objectu) dilutius cyaneo-limbatae; pteromata coerulea; tectrices alarum inferiores nigrae, apice virides; rectrices duae intermediae supra toto virides, rhachi nigra, sequentes egregie cyanae, margine intimo rhachique nigrae, extus basi subtiliter viridi-lavatae, omnes subtus toto nigrae. *Mas adult.*

*Psittacus hysginus Forster* in manusc. *Id.* Ic. ined. tab. 42 (*fig. opt.*). *The tabuan Parrot Lath.* Synops. 1. p. 214. n. 16. t. 7 (*tabula Forsteriana*). *Psittacus tabuensis Gmel., Lath.* (*exclus. variet.*). *Psittacus atropurpureus Shaw* Mus. Lever. p. 142. *cum fig. pessima.* *Id.* Gen. Zool. 8. p. 409.

Regio tota ophthalmica plumosa; plumae capistri ac totius capitis lateralis breves, rigidiusculae, prope oris angulum subpilosae; rostrum quam in *Platycerco scapulato* multo validius; mandibula compressa, biangulosa, maxilla lateribus convexa, ante apicem subanguloso-emarginata; lingua apice integra, glabra; irides avellanae;

tarsi digitique graciles, nigricantes, squamularum interstitiis grisescen-  
tibus; regio supra suffraginem nudiuscula; ungues graciles, nigri;  
cauda elongata, latissima, gradata, apice rotundata; alae longissimae,  
acutissimae. Habitus *Pl. scapulati*. Longitudo  $16\frac{1}{4}$ " , caudae  $7\frac{1}{2}$ " ,  
alae  $9'' 2'''$  , tarsi  $9'''$  , rostri ad frontem  $1\frac{1}{2}$ " ; eiusdem ambitus in  
basi  $3\frac{5}{4}$ " . Habitat, fide cl. *Forster*, in maris pacifici insula *Ea-*  
*oowe*, incolis *Kâghâkâ* dictus. (Specimen nitidum adest in museo  
*Monacensi*.)

VII. Genus. *Deroptyus*. Pag. 30.

1. *D. accipitrinus*. Cervicis plumae longissimae, latae, apice  
rotundatae, purpureae, fasciola laete coerulea terminatae; his plumae  
pectoris, epigastrii, ventris abdominisque concolores breviores, pilei,  
capitis totius lateralis ac colli supremi lateralis longiusculae, angustius-  
culae, rhachi fuscescenti-alba variae; lora fuliginosa; jugulum totum  
ac pectus supremum fusca; hypochondria, tiliarum plumae plurimae,  
crissum, dorsum, tergum, uropygium, caudae alarumque tectrices su-  
periores omnes, pennae scapulares remigesque ultimae intense grami-  
neo-virides; rectrices omnes subtus aterrimae, micantes, supra pogo-  
nio externo virides, versus apicem obscure coerulescentes, intus nig-  
rae; rectrix extima fere toto pogonio externo in obscure coe-  
ruleum vergens; remiges omnes nigrae, primariae extus paullo cya-  
neo-reflectentes. *Mas* et *Foem. adult.*

*Psittacus elegans* *Clus.* Exotic. p. 365 (c. *fig. opt.*). *The*  
*hawk-headed Parrot* *Edw.* 4. t. 168 (*fig. satis accur.*). *Psit-*  
*tacus varius indicus* *Briss.* Av. 4. p. 300 (*descript. opt.*). *Le*  
*Perroquet maille de Caj.* *Buff.* Pl. enl. 526 (*fig. mediocr.*). *Psit-*  
*tacus accipitrinus* *Auctor.* cum var.  $\beta$ . *Spix* Av. Brasil. 1. t. 32 a  
(*fig. opt.*). *Psittacus coronatus* (*descriptio imperfecta*) et  
*Psittacus violaceus* *Auctor.* *Psittacus Clusii* *Shaw* l. c.

Rostrum mediocre totum corneo-fuscum, apice vix pallidius, cul-

mine biangulosum; mandibula pagina antica acie longitudinali intermedia emergente; regio ophthalmica nuda ac maxillae cera nigricantes, interdum ex cinereo-albido incarnatae; oculi iride cinereo-olivacea, extus annulo flavido cincta; pedes graciliores, nigricantes, digitis elongatis, unguibus obscure corneo-fuscis; cauda lata, longiuscula, apice rotundata. Longitudo  $12\frac{1}{2}''$ , alae  $7\frac{1}{4}''$ ; caudae  $5''5'''$ , rostri ad frontem  $16'''$ , tarsi  $8'''$ . Habitat in *Cajenna, Guiana, Surinamo*, in *Brasilia* versus flumen Amazonum (ac in Antillarum insula *Guadeloupe*, fide *du Tertre*). Avis pulcherrima, irritata aut terrefacta colli plumas longas ventilabri in morem expandens. (*Mus. Paris., Monac.*; plures vivos vidi.)

*Observatio.* Auctorum *Psittacus violaceus* certo huc ponendus, Innititur descriptione *du Tertrei* (*Hist. des Antilles T. 2. p. 250*). satis accurata, sed e specimine domefacto hausta. Verba illius: „*il a le bec et les yeux bordés d'incarnat*“, compilatores verbis: „*rostrum et orbitae incarnata*“, male explicaverunt.

#### VIII. Genus. *Euphema*. Pag. 30.

1. *E. pulchella*. Frons, sinciput, facies tota genaeque, tectrices alarum superiores minores ac mediae, alarum flexura ac margo nitide coerulea, harum tectrices inferiores intense violaceae, apice coeruleae, posticae majores nigrae, superiores, pennae scapularibus confines, cupreo-coccineae; remiges primariae ac secundariae extus nec non alulae pennae intense violaceae; limbus remigum extimus primariarum reflexu viridi, omnes pogonio interno et subtus nigrae, ultimae supra dorso concolores; occiput, hujus collique latera, cervix, dorsum, tergum, uropygium caudae tectrices superiores et pennae scapulares laete olivaceo-viridia; jugulum totum, crissum, tibiae ac reliquae gastraei partes intense at luride lutea; pectoris ventrisque latera olivascenti-virescentia; rectrices duae intermediae toto virides, supra versus basin coerulescentes, subtus cum rhachi nigrae, sequens utrin-

que intermediis concolor, attamen intus nigro-limbata, proxima dein supra viridis, intus extra medium paullo nigra, apice large lutea, subtus a basi usque ultra medium nigra, nunc sequens simili modo picta, attamen toto fere pogonio externo lutea; duae extimae luteae, basi extus virides, intus nigrae; rostrum parvum, corneo-nigrum; pedes fuscii; ungues corneo-fuscii. *Av. adult.*

*Psittacus pulchellus* Shaw Misc. t. 96 (*fig. bona*) et *Auctor.*; *Swains.* Zoologic. Illustr. n. 15. t. 73 (*fig. opt.*). *Nanodes pulchellus* Vigors et Horsf. Transact. of the Linn. Soc. 1826. 15. p. 277.

*Avis hornot.* Capitis, alarum ac totius trunci ptilosis sordide olivascanti-viridis, ventris ac abdominis dilutior, unicolor, exclusa macula inter femora pallide testacea; rectrices duae intermediae toto virides, sequentes intus flavae, extimae flavae, intus versus basin obscurae; alulae pennae cyanae; pogonium remigum primarium externum pallide cyaneum, margine strictissimo flavido; rostrum cinereo-fuscum; pedes unguesque pallide fuscii.

*Psittacus chrysogaster* Lath. (*descriptio, ut videtur, ex icone*).

*Mas junior.* Humeri absque tegminibus purpureis; frons ac genae plus minusve coeruleae, parum nitidae; gastraei partes viridiflavae excluso abdomine sordide aurantio-rubescente.

*La Perruche Edwards* Le Vaill. l. c. t. 68 (*fig. accur.*). *Psittacus Edwardsi* Bechst. in Lath. Uebers. der Vög. S. 74. n. 46.

Regio ophthalmica tota plumosa; tarsi, digiti unguesque gracilissimi; cauda gradato-lanceolata, elongata. Longitudo 8½", caudae 4" 4"', alae 4", rostri ad frontem 6"', tarsi 4¼". Habitat satis

frequens in *Nova-Hollandia*; in humo obambulans victum, graminum semina, quaerit; nidificat in arboribus truncatis, in quibus, sine nido vero, ova octo toto alba ponit (*Mus. Paris., Berol., Monac, collect. Soc. Linn. Londin., caet.*).

2. *E. chrysostoma*. Regio rostrum inter et oculos et circa hos eleganter flava; frontis fasciola stricta, utrinque olivaceo-viridi marginata, tectrices alarum superiores ac inferiores alulaeque pennae laete ac intense azureae; capitis pars reliqua, cervix, dorsum, tergum uropygiumque, caudae tectrices superiores, pennae scapulares remigesque ultimae olivaceo-virides; genarum pars reliqua, jugulum totum et pectus eleganter viridia; venter, abdomen, horum latera et crissum laete flava; remiges nigrae, virescenti-marginatae; rectrices basi dilute coeruleae, duae intermediae toto azureae, reliquae his concolores, attamen large flavo-terminatae, extimae extus flavo-limbatae; cauda subtus nigra, flavo-cincta. *Adult.*

*Psittacus chrysostomus* *Huhl* l. c. p. 50. n. 78 t. 1 (*fig. accur.*). *Psittacus venustus* *Temm.* *Transact. of the Linn. Soc.* 13. p. 121. *Nanodes venustus* *Vig. et Horsf.* l. c. p. 278. n. 4.

*Avis hornot.* Regio rostrum inter et oculos viridi-flavida; frontis vitta coeruleo-plumbea; jugulum et pectus sordidius viridia; reliquae partes gastraei impure flavae; tectrices alarum superiores obscure fuscae large virescenti-limbatae; dorsum, tergum, cervix caudaeque avis adultae, quam in hac minus nitida (*Foemina* secundum auctores).

Habitus et fere magnitudo *Euphemiae pulchellae*, 8½" longa; rostrum pedesque obscure grisea; regio ophthalmica tota plumosa; irides flavae; cauda elongata, gradata, lanceolata. Habitat in *Nova-Hollandia* ac in *Terra van Diemen*, *Euphemiae pulchellae* in morem in humo ambulans (*Mus. Paris., Soc. Linn. Londin.*).



3. *E. undulata*. Caput ac nucha virescenti-flava, fasciis strictissimis, fuscescentibus (coerulescenti-nigris sec. *Kuhl*) undulata; macula genarum azurea; gula flavicans; rectrices viridi-coeruleae, laterales fascia in medio flava signatae; cervix ac reliquae corporis partes superiores obscure fuscae, fasciis brunnescentibus variegatae, inferiores omnes laete virescentes, unicolores; remiges virescentes.  
*Av. adult.*

*Psittacus undulatus* *Shaw* Nat. Misc. 16. t. 673 (fig. mediocr.). Gen. Zool. 8. p. 469. cum variet., *Kuhl* l. c. p. 49 n. 76.  
*Nanodes undulatus* *Vig. et Horsf.* l. c. p. 277 n. 2.

Rostrum pedesque fuscescentia; cauda elongata, gradata, acuta. Longitudo vix 7". Habitat in *Nova-Hollandia*. (Specimen unicum in Museo Societatis Linn. Londin. vidi).

4. *E. discolor*. Frontis fasciola ac mentum coccinea; regio ante oculos flava; sinciput et vertex sapphirino-violacea; reliquae capitis partes, cervix, dorsum, tergum, uropygium, caudae alarumque tectrices superiores, pennae scapulares remigesque ultimae laete viridia; colli capitisque latera nonnihil in colorem coerulescentem vergentia; gastraeum totum eleganter virescens, attamen collum anticum ventrisque latera pallide sanguineo-irrorata; crissum pallide coccineum, plumis virescenti-terminatis; tectrices alarum inferiores laete coccineae, superiores minores purpureae; alula pteromataque cyanea, obscurius coeruleo-limbata; remiges nigrae, violaceo-micantes, extus ac intus flavo-marginatae; rectrices duae intermediae maxima parte cupreo-purpurinae, apice cyanae, intus versus basin cupreo-purpurinae.  
*Aviis adult.*

*Psittacus discolor* *Shaw* in *White's Voy.* p. 263. c. tab., *Lath. Suppl. Swains.* Zool. Illustr. n. 12. t. 62 (fig. bona), *Vieill. La perruche Banks Le Vaill.* l. c. p. 104. t. 50 (figura accurata, exceptis alarum tectricibus toto coeruleis ac

*cauda nimis brevi*). *Psittacus humeralis* Bechst. in *Lath. Uebers. der Vög.* S. 85. n. 100, *Kuhl* l. c. p. 47. n. 72. *Psittacus Banksianus* Vieill. N. D. 25. p. 342. *Psittacus australis* *Kuhl* l. c. p. 48. n. 74 (*descriptio bona, synonymia prorsus falsa*). *Nanodes discolor* *Vig. et Horsf.* l. c. p. 276.

*Avis junior.* Macula ante oculos flava nulla; vertex nonnihil in coeruleum vergens; tectrices alarum inferiores viridi-flavae; gastraeum totum pallide viride, unicolor; crissi plumae laterales et tectrices in alae flexura rubrae, hae coeruleo-marginatae; remiges primariae virides, subtiliter flavo-marginatae; cauda subtus fusco-olivacea, supra viridis, rectricibus lateralibus versus basin multum rubicundis.

*La Perruche Latham* *Le Vaill.* l. c. p. 123. t. 62. *Psittacus Lathamii* *Bechst.* Uebers. d. Vög. *Lath.* S. 81. n. 81. *Psittacus discolor* *Kuhl.* l. c. p. 48. n. 73.

Rostrum parvum corneo-fuscescens; pedes graciles, pallidi, unguibus corneo-fuscis; cauda elongata, gradato-lanceolata, rectricibus angustissimis; regio ophthalmica tota plumosa.

Habitus *Euphemae pulchellae*. Longitudo  $9\frac{3}{4}$ " , caudae 5" , alae 4" 7" , rostri ad frontem 7" , tarsi 6" . Habitat in *Nova-Hollandia* (*Mus. Paris., Soc. Linn. Londin., Berol., collect. dom. Sturm.*).

#### IX. Genus. *Trichoglossus*. Pag. 31.

##### *a. Rostro pedibusque rubris sive flavis.*

1. *T. palmarum*. Rostrum pedesque rubra; caput, collum totum, dorsum, uropygium, alae supra rectricesque intermediae eleganter viridia; pectus et omnes reliquae gastraei partes nec non rectrices laterales flavescencia; remiges nigro-terminatae.

*Psittacus palmarum* R. Forster Id. Icon inedit. tab. 48 et Auctor.

Cauda elongata, cuneata; irides coccineae; magnitudo *Sittaces virescentis*, cauda quam in hac parum brevior. Habitat in maris pacifici insula *Tanna*, palmas frequentans. R. Forster.

*Observatio.* *Psittacus peregrinus Lathamii* ac aliorum auctorum cum *T. palmarum* in omni puncto convenit, si *alarum tectrices superiores in medio pallide fuscas excipias*. An hornotinus *Trichoglossus palmarum*?

2. *T. pyrrhopterus*. Laete viridis; tectrices alarum inferiores omnes saturate aurantiae; vertex ac regio parotica coerulea; frons, guttur ac nuchae torques cinerascens; remiges obscurae.

*Psittacus pyrrhopterus* Lath. Suppl. (descript. imperf.) Vigors Zool. Journ. n. 4. 1825. et n. 7. p. 400. Supplement. Plat. to the Zoologic. Journ. Tab. IV. Bullet. univers. des scienc. 1826. T. 1. p. 104.

Rostrum pallidum, attenuatum, compressum; mandibula elongata, vix emarginata; pedes mediocres rubri; cauda longula. Longitudo 7 1/2". Habitat in maris australis insulis *Sandwich*. Vigors. Non vidi.

*Observatio.* Ex hac ave format Vigors l. c. genus „*Brotogetis*.“

3. *T. aurifrons*. Fascia frontis, facies, genae, jugulum et reliqua gastraei pars aureo-flava; ventris latera et crissum virenti-induta; ptilosis reliqua laete viridis; remiges azureae, apice nigrae.

*Psittacus (Lathamus) aurifrons* Less. Centurie zoolog. p. 63. t. 18.

Rostrum flavido-album; pedes flavidi. Longitudo 7" 4"', cau-

dae 3". Habitat in *Nova-Seelandia*. *Less.* Non vidi. An ad genus praecedens referendus?

*β. Rostro pedibusque obscuris.*

4. *T. pusillus*. Fascia totam rostri basin ambiens pallide coccinea; rectrices extus toto virides, intus virescenti-flavae et a basi usque ad medium sanguineo-rubrae, duae intermediae toto virides; cervix ac dorsum supremum olivaceo-fuscescentia; regio parotica, genarum pars postica et regio superciliaris laete virescentes; tergum, uropygium, caudae ac alarum tectrices superiores omnes, remiges extus alulaeque pennae viridia; regio parotica minus lucida; jugulum, pectus nec non tectrices alarum inferiores virescentia; plumae crissi, tibiaram et reliquae partes gastraei pectori concolores, hoc tamen paullo dilutiores ac nonnihil in flavidum vergentes; remiges omnes subtus cinerascens, apice et intus nigricans, margine externo viridi strictissime flavo-limbatae; alarum margo infimus paullo flavidus. *Mas et Foem. adult.*

*Psittacus pusillus* *Shaw*, *White Journ. of a Voy.* p. 262. c. fig. *Lath.*, *Kuhl* 1. c. p. 47. n. 71. *Perruche à face rouge* *Le Vaill.* 1. c. p. 124 (fig. bona).

Rostrum gracilius corneo-nigricans; mandibula corneo-flavida; regio ophthalmica plumosa, solum ante oculum parva macula nuda; lingua supra apicem papilloso-penicillata; pedes validi, breves, coeruleo-fuscescentes, unguibus corneo-fuscescentibus; cauda breviuscula, conico-lanceolata, rectricibus omnibus apice lanceolato-acuminatis; alae angustae, acutae. Longitudo  $6\frac{1}{3}$ ", caudae 2" 2"', alae 3" 7"', rostri ad frontem  $5\frac{1}{2}$ ", tarsi 4". Habitus speciei sequentis. Habitat gregarius in *Nova-Hollandia*, inter *Eucalyptos* vulgarissimus; parit, absque nido vero, quatuor ova alba, immaculata; inquilinis *Jerryang* (*Mus. Paris.*, *Berol.*, *Monac.*, *caet.*).

5. *T. australis*. Frontis taenia lata ad oculorum canthum anteriorem ducta ac macula immediate pone oculum incipiens, magna, aures obtegens, oblonga, coccineo-sanguineae; vertex ac nucha coeruleo-fulva, plumis medio viridulis; nucha viridi-terminata; collum infimum posticum ac dorsum supremum dilute fuscescenti-olivacea; genae, jugulum, crissum, tibiae, tectrices alarum inferiores ac reliquae gastraei partes laete viridia, excepta macula juxta utrumque epigastrii latus aureo-flava; alarum margo et tectrices superiores omnes, alulae pennae, remiges omnes extus, pennae scapulares, dorsum, tergum, uropygium caudaeque tectrices superiores laete viridia, abdomine paullo obscuriora; remiges intus ac subtus nigricantes; rectrices duae intermediae toto virides, reliquae intus virescenti-flavidae ac a medio fere usque ad basin coccineae, extus virides, omnes subtus virescenti-flavidae. *Mas et Foem. adult.*

*Psittacus australis* Lath. n. 66 (*descriptio manca*), non Gmel. *Psittacus concinnus* Shaw Nat. Misc. t. 87, Kuhl l. c. p. 46. n. 70 *La Perruche à bandeau rouge* Le Vaill. l. c. p. 99. t. 48 (*fig. bona*). *Psittacus rubrifrons* Bechst. Uebers. d. Vög. Lath. S. 84. n. 99. *Psittacus pacificus* Shaw. Gen. Zool. 8. p. 419 (*diagnosis spectat ad Platyc. pacificum*). *Trichoglossus concinnus* Vig. et Horsf. l. c. p. 292. n. 5. *Psittacus velatus* Vieill. N. D. 25. p. 373. *Id.* Encycl. meth.

Rostrum corneo-nigricans; maxillae apex in rufulo-albidum vergens; cera nigricans; macula parva ante oculum nuda, reliqua ejus regio plumosa; lingua supra apicem papilloso-penicillata; pedes breves, validiusculi, fuscescentes, unguibus corneo-fuscis; cauda elongata, gradata, conico-lanceolata; alae acutae. Longitudo 8", caudae 4", alae 5", rostri ad frontem 8¼", tarsi 5". Habitat frequentissimus in *Nova-Hollandia*, praesertim in *Botany-Bay*, inquilinis *Coolieh* dictus, gregarius inter *Eucalyptos* degens; parit ova duo viridia, immaculata. (*Mus. Paris., Monac.; caet.*)

γ. *Rostró aurantio.*

6. *T. chlorolepidotus.* Viridis; caput totum supra viride, coeruleo-micans; gula ac genae viridi-coerulescentes; plumae nuchae, pectoris epigastriique flavae, paullulum coccineo-variae, fascia lata viridi in apice limbatae, unde hae partes quasi squamosae; remiges pogonio interno fuscae, omnes ibi, remige prima excepta, macula in medio aurantio-coccinea insignes, unde alarum pagina inferior fasciata; tectrices alarum inferiores coccineae rectrices supra virides, subtus fuscescentes, omnium lateralium pogonium internum basi aurantio-coccineum. Av. adult.

*Psittacus chlorolepidotus* Kuhl l. c. p. 48. n. 75 (descriptio manca). *Trichoglossus Matoni* Vig. et Horsf. l. c. p. 292. n. 4 (descriptio bona).

Rostrum aurantio-rubrum; pedes validiusculi unguesque nigri; cauda elongata, gradata, lanceolata. Habitus *Trichoglossi haematodi*. Longitudo 8 ½". Habitat in *Nova-Hollandia*. A *Trichoglosso haematodo* signis supra exhibitis facile distinguitur. (*Mus. Soc. Linn. Londin.*)

7. *T. haematodus.* Ventris macula ad tibias extensa indistincte marginata intense gramineo-viridis; tibiae flavae, ad suffraginem virescentes; pectus totum ac epigastrium in fundo vitellino-flavo aurantio-rubra, plumarum margine apicali vix conspicue viridi; plumae epigastrii laterales aurantio-rubrae, viridi-terminatae; hypochondria crissumque flava, maculis magnis gramineo-viridibus variegata; torques nuchae latus ultra colli latera extensus pure aureo-flavus; facies tota, genae, frons et sinciput violacea, plumis rigidiusculis, subulatis; gulae ac genarum ambitus, regio superciliaris postica et occiput, cervix, dorsum, tergum, uropygium, caudae tectrices superiores ac alarum omnes, harum margo, alulae pennae, remisque omnes extus intense prasino-viridia, solum plumae colli po-

stici versus basin macula flava, in utroque latere rubro-notata signatae; remiges intus ac subtus nigrae, exclusa macula intermedia subelliptica citrino-flava, in *remigibus penultimis rubra*; rectrices (exclusis duabus intermediis) intus margine large flavo-limbatae, subtus olivaceo-flavae, apice reflexu nonnullo viridi; alarum tectrices inferiores cinnabarinæ coccineae. *Mas et Foem. adult.*

*The red-breasted Parrakeet* Edw. 1. t. 232. *Psittacus haematodus* Linn., Gmel., Lath. (exclus. varietat.  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ), *La Perruche à face bleue* Le Vaill. 1. c. p. 96. t. 47 (fig. valde mediocris). *Psittacus capistratus* Bechst. in Lath. Uebers. der Vög. S. 68. n. 17. Kuhl 1. c. p. 35. n. 44.

*Avis junior.* Avi adultae simillima; fascia nuchae flava subtilissime virescenti-lavata; pectus totum pure flavum, plumarum nonnullarum margine apicali vix conspicue viridi; tectrices alarum inferiores flavae, paullo rubro-variegatae; remiges penultimae intus toto nigrae; plumae colli postici toto virides.

*Avis junior adultae ptilosi se induens.* Avi juniore similis; pectus flavum versus epigastrii latera plus minusve rubens; tectrices alarum inferiores aurantio-coccineae; nuchae torques flavidus; plumae cervicis in medio paullo flavidae maculaque obsoleta rubra notata; remix prima tota nigra, intus margine macula pusilla, trigona, flava notata.

Rostrum cerato-rubrum; lora et regio ophthalmica fere tota plumosa; irides ex annulis duobus composita, quorum externus croceoruber, internus griseus; lingua supra apicem papilloso-penicillata; pedes nigricanti-plumbei, unguibus nigris; cauda elongata, gradata, lanceolata. Longitudo 11", caudae 4" 10"', alae 5" 4"', rostri ad frontem 10 $\frac{1}{4}$ "', tarsi 6"' Habitat satis frequens in *insulis Moluccis*. (*Mus Paris, Monac., caet.*; multos vivos vidi.)

*Observationes.* Auctorum vetustiorum ac recentiorum synonymia hujus avis erroribus scatet. Citatur ab iis *Psittaca ambainensis varia* *Briss.* Av. 4. p. 364. n. 72 (*Buff.* Pl. enl. 61), quae species distincta, noster *Trichogloss. cyanogrammus* est, non diversus a *Le Vaillantii* „*Femelle de la Perruche à face bleue* tab. 25“, a recentioribus auctoribus cum *Platycerco multicolore* confusa. Varietates  $\gamma$  et  $\delta$  ad *Trichoglossum multicolore* referri debent. Receperunt praeterea *Le Vaillantius* et *Kuhlius* in hujus avis synonymiam praeter *Trichoglossum* nunc dictum *Psittacum cyanocephalum* auctorum, ab illo toto coelo diversum (*Pal. cyanoceph.*). — A *Trichoglosso multicolore* sane simili differt *T. haematodus*, praeter staturam minorem signis supra exhibitis. In exuviis rostrum mox albescit, in *T. cyanogastro* vero vergit in colorem vitellino-rubicundum.

8. *T. rubritorquis.* Viridis; caput totum ac gula coeruleo-splendens; torques nuchae e plumis aurantio-coccineis, apice azureo-marginatis compositus; pectus alarumque tectrices inferiores aurantio-coccinea; abdomen macula azureo-viridi notatum, infimum flavum; remigum pogonium internum fuscum, macula longitudinali marginatum; tibiarum plumae et caudae tectrices flavae, viridi-variae; rectrices virides, subtus in flavidum vergentes, ad basin pogonii interni, mediis exceptis, flavo-marginatae.

*Trichoglossus rubritorquis* *Vig. et Horsf.* *Transact. of the Linn. Soc.* 15. p. 291. n. 3.

Habitus *Trichoglossi haematodi.* Longitudo  $9\frac{7}{10}$ “, mandibulae  $1\frac{1}{20}$ “, maxillae  $\frac{4}{5}$ “, alae  $5\frac{7}{10}$ “, tarsi  $1\frac{1}{20}$ “, digiti antici externi, ungue incluso,  $1\frac{1}{6}$ “. Habitat in *Nova-Hollandia.* *Vig. et Horsf.* (*Collect. Soc. Linn. Londin.*)

*Observatio.* Avem hanc, quam nondum vidi, auctoritate auctorum supra dictorum pro specie distincta pono. *Trichoglossus capi-*



*stratus* ab iisdem pro specie distincta indicatus (l. c. p. 290), sane junior *T. haematodus* est.

9. *T. multicolor*. *Capitis totius mentique plumae rigidiusculae, subulatae, laete lilacino-coerulescentes, basi nigricantes, gulae non subulatae magis cyanaeae; fascia occipit terminans viridi-flava; ventris plumae egregie cyanaeae, in medio plus minusve cinnabarinae, ventris laterales cinnabarino-coccineae, limbo apicali interno viridi, externo cyaneo; jugulum et pectus laetissime cinnabarino-coccinea, hoc ad latera luteum; tibiae cinnabarinae; hypochondriorum plumae virides, macula intermedia flava, in utroque latere rubro-notatae, crissi flavae, apice virides, basi paullo rubentes; tectrices inferiores alarum intense coccineae; harum flexura, tectrices superiores omnes, alulae pennae remigesque extus, cervix, dorsum, tergum, uropygium caudaeque tectrices superiores laete prasina; cervicis plumae medio fascia rubra, in utroque apice flavo-limbata, notatae; rectrices supra dorso concolores, margine pogonii interni (exclusis duabus intermediis) flavo-limbatae, subtus olivaceo-flavae, margine pogonii interni flavae; remigum pogonium internum nigrum in medio macula subelliptica, flava (quoque in remigibus penultimis flava) notatae. Mas et Foem. adult.*

*Perruche des Moluques Buff. Pl. enl. 743 (fig. accur.) Psittacus haematodus var. β. (Ps. moluccanus) et var. γ. (Ps. Novae-Hollandiae) Gmel., var. β, γ, δ, Lath. Psittacus multicolor Gmel., Psittacus semicollaris Lath. (descriptio vitiosa). Bluebellied Parrot Brown Illustr. p. 14. t. 7., Phil. Bot. Bay. c. tab. p. 152. White Journ. p. 140. c. tab. Perruche à tête bleue, mâle. Le Vaill. l. c. p. 51. t. 24 (fig. opt.). Psittacus cyanogaster Shaw. Gen. Zool. 8. P. 2. p. 413. t. 59 (tabula Le Vaillantiana). Psittacus haematodus Kuhl l. c. p. 34. n. 43 (solum descriptio avis adultae; synonymia maxime falsa). Trichoglossus haematodus Vig. et Horsf. Transact. of the Linn. Soc. 15. p. 289.*

*Avis junior.* Pectus ac collum infimum lutea, in medio maculis coccineis variegata; abdominis macula cyanea distinctius coccineo-variegata.

Rostrum totum cerato-rubrum; stria in loris nudiuscula, subpilosa; regio ophthalmica parum nuda; oculi circulis tribus, primo croceo, secundo griseo, tertio strictissimo flavido; lingua supra apicem papilloso-penicillata; pedes validiusculi, plumbeo-nigricantes, unguibus corneo-fuscis; cauda elongata, perquam gradata, lanceolata. Longitudo  $12\frac{1}{2}$ "", caudae 6", alae  $5\frac{3}{4}$ "", rostri ad frontem  $10\frac{1}{2}$ "", tarsi 5"". Habitat in *Nova-Hollandia*, frequentissimus in *Port Jackson* ac in *Botany-Bay*, gregarius *Eucalyptis* incidens, inquilinis *Warri* dictus. (*Mus. Paris.*, *Berol.*, *Monac.*, *Societ. Linn. Londin.*; multos vivos vidi.)

*Observationes.* Species haec a *Trichoglosso haematodo*, quocum ab auctoribus semper unitur, characteribus supra notatis discedere videtur. *Vigorsii Trich. capistratus* (l. c. p. 290.) „viridis, pileo gulaque purpurascenti-azureis, pectore coccineo-aurantio, tectricibus alarum inferioribus coccineis, torque nuchali fasciaque in remigum latere inferiori flavis“ forsan hornotinus *Tr. multicolor*, quem nondum vidi. Id minime certum est, *Bechsteinii Psittacum capistratum* a cl. *Vigors* citatum, tabula Vaillantiana 47 ac Edwardsiana 232 innitentem, ad adultum *Trichoglossum haematodum* spectare. Nescio num hic *Trichoglossus* in insulis Moluccis reperiatur. Cel. *Raffles* captum observavit in Sumatra, ex insulis adjacentibus australioribus allatum (*Trans. of the Linn. Soc.* 13. 2. p. 282). — Plumae rubras pectoris in adultis *Trichoglossis multicoloribus* non raro cyaneo-marginatas vidi. An *Trich. haematodi foemina*, *Vig.* et *Horsf.* l. c. ? — *Trichoglossi* 6—10 ulteriori examine in eorum loco natali indigent.

10. *T. cyanogrammus.* *Plumae colli antici inferioris pecto-*

*risque eleganter aurantio-coccineae, saturate coeruleo-marginatae; venter ejusque latera gramineo-viridia; plumae abdominis, tibiaram, caudaeque tectrices inferiores viridi-luteae, maculis gramineo-viridibus variegatae; frons, sinciput, facies tota et guttur saturate coerulea; capitis partes reliquae, dorsum, tergum, uropygium, caudae alarumque tectrices superiores omnes laete ac saturate viridia; nuchae torques laete flavus; tectrices inferiores alarum coccineo-rubrae; harum margo flavus; remiges supra dorso concolores, subtus fuscae, intus medio macula oblonga, flava, duae sive tres ultimae intus medio macula rubra signatae; rectrices supra dorso concolores, subtus flavido-olivascens. Av. adult.*

*Psittaca amboinensis varia* *Briss.* Av. 4. p. 364. n. 72 (*descriptio optima, synonymia falsa*). *Perruche d'Amboine Buff.* Pl. enl. 61 (*fig. valde mediocris*). *Perruche à tête bleue, femelle* *Le Vaill.* t. 25 (*Psittacus haematodus Gmel., Lath., Vieill., Kuhl in synonymia*).

*Var. a.* Caput coeruleum, supra rubro-maculatum; dorsum alarumque tectrices superiores, abdomen crissumque flavo-variegata; pectoris plumae ut in antecedente.

*Variété de la Perruche à tête bleue. Le Vaill.* l. c. t. 27.

Rostrum flavicans; pedes unguesque nigricantes; cauda elongata, gradata. *Habitus Trichoglossi haematodi.* Longitudo 11", caudae 3 $\frac{3}{4}$ ", rostri ad oris angulum  $\frac{3}{4}$ ", tarsi 5". Habitat in *Amboina*. *Brisson.*

#### X. Genus. *Charmosyna.* Pag. 31.

1. *Ch. papuensis.* Caput, collum et gastraeum totum sanguineo-coccinea; vertex fascia subirregulari azurea, margine postico in violaceo-nigrum vergente, nucha altera violaceo-nigra signata; pectus ad latera et hypochondria lutea; abdomen infimum violascenti-nigrum;

interscapulia, margo et tectrices superiores alarum et pogonium externum remigum obscure viridia, hae intus et subtus nigrae; tergum uropygiumque sanguineo-coccinea, medio intense violacea; rectrices obscure virides, apice rubicundo-flavae, duae intermediae a medio ad apicem rubro-flavae, omnes subtus flavae. *Mas et Foem. adult.*

*Psittacus erythrochlorus macrouros Aldrov.* 1. p. 681. *Psittacus japonicus Auctor. Le petit Lory Papou Sonner.* Voy. à la Nouv. Guin. p. 175. t. 111 (icon e specimine remigibus primariis privato). *Psittacus papuensis Gmel., Lath. (inclusis varietatibus), Bechst., Kuhl.* *Psittacus Bontii Lath. (Bontii icon e specimine exsiccatō, manco, descriptio confusa).* *Psittacus javanicus Gmel. Psittacus omnicolor Lichtenst. Catal. rer. nat. rariss. Hamburg. 1793 p. 5. n. 48 (descriptio e specimine adulterato), Meyer Zool. Annal. 1. p. 140. Psittacus Lichtensteinii Bechst. in Lath. Uebers. d. Vög. S. 83. n. 89., Kuhl l. c. p. 36 (descriptio quoad alarum picturam vitiosa). La Peruche Lory Papou. Le Vaill. l. c. p. 9. t. 77 (fig. opt.).*

Rostrum rubrum; maxilla quam mandibula multo longior, perquam deflexa; regio ophthalmica tota plumosa; pedes rubicundi; alae magnae, acutae; rectrices duae intermediae longissimae, extimis gradatis fere triplo longiores, versus apicem perquam attenuatae. Habitus *Palaeornithos bengalensis*. Longitudo a rostri apice ad finem rectricum duarum intermediarum 17", harum 11", lateralium 4 $\frac{3}{4}$ ", extimarum 3 $\frac{1}{2}$ ". Habitat in *Nova-Guinea*. (*Mus. Paris.*; vidi Londini multas mutilatas in tabernis mercatoriis.)

*Observatio.* Avis haec pulcherrima ut plurimum more *Paradi-searum* in pedibus, alis et in cauda mutilata ad nos pervenit, unde auctorum descriptiones a vero non raro aberrantes.

XI. Genus. *Eos*. Pag. 32.α. *Ptilosi rubra*.

1. *E. indica*. Fascia verticis latissima, pone oculos attenuata, supra aures ad cervicem ducta, haec, dorsum, tibiae, hypochondria ac fascia pectoris latissima eleganter coerulea; suffrago, macula occipitis latissima quadrata, frons, genae, collum anticum ac laterale, venter, alarum margo totus, tectrices superiores ac inferiores, remiges secundariae extus et intus coccineo-cinnabarina; remiges secundariae fasciola nigra terminatae; tectrices humerales nigro-, venter in medio coeruleo-variolosa; pennae scapulares nigrae, reflexu coeruleo; remix ultima tota, remiges penultimae duae intus magna ex parte nigrae; alulae margo paullo cyaneo-terminatus; tergum, uropygium caudaeque tectrices superiores purpurea; crissum rubrum, lilacino-subvariegatum; rectrices intus cinnabariniae, extus toto nigrae, nonnihil violaceo-reflectentes. *Av. adult.*

*Avis junior*. Avi adultae similis; pennae scapulares et dorsum supremum fusca, parce rubra; colli pars inferior pallide rubra, parum fusco- et violaceo-, venter, hujus latera, tibiae crissumque rubra, fusco et violaceo-, tectrices alarum superiores rubro- et fusco-varia; remiges tres primariae extus et apice fusco-lutescentes, intus rubrae, reliquae omnes in utroque pogonio rubrae, majores tamen dilute fusco-, minores vero fusco-violaceo terminatae; rectrices duae intermediae fusco-violaceae, laterales omnes extus his concolores, intus rubrae; rostrum avis adultae (*Brisson*).

*Psittaca indica coccinea* *Briss.* l. c. p. 376. n. 78. t. 25. 2.  
*Perruche des Indes orientales* *Buff.* Pl. enl. 143 (fig. mala).  
*Psittacus indicus* *Gmel.* *Psittacus coccineus* *Lath., Kuhl.*  
*Perruche violet et rouge* *Le Vaill.* l. c. t. 53 (an icon e specimine naturali?).

Rostrum totum aurantium; regio ophthalmica nudiuscula ac cera

cinerascentes; irides ex annulis duobus compositae, externo angusto fulvescente, interno, pupillam cingente, cinerascente; lingua supra apicem papillis conicis, longis aucta; plumae coeruleae, aures obtegentes, longae, strictissimae; pedes cinerei unguibus corneo-nigricantibus, culmine pallidioribus; caude longiuscula, cuneata. Longitudo 11", rectricis mediae 4 $\frac{3}{4}$ ", extimae 3", rostri ad frontem 11"', tarsi 7"', digiti externi, excluso ungue, 10"'. Habitat in *insulis Moluccis*. (*Mus. Monac.*)

*Observatio.* Specimen adultum supra descriptum, remigibus primariis carens, vivum vidi apud regem nostrum clement. *Maximilianum Josephum*. Plumae avis juvenilis margine solum obscurae.

2. *E. rubra*. Rostrum totum aurantium; macula regionis ophthalmicae subelliptica, nuda, nigra; ptilosis capitis ac colli, notaei ac gastraei, tectrices alarum superiores ac inferiores eleganter coccineo-cinnabarina; plumae crissi, pennae scapulares posticae remigesque ultimae amethystino-violaceae; tectrices maiores margine apicali nigrae, ibidem nonnihil violaceo-reflectentes; remiges primariae extus nigrae, intus rubrae, secundariae toto cinnabarino-rubrae, rhachi et apice nigrae; alulae pennae nigricantes; rectrices rubrae, rhachi alba, laterales versus basin paullo obscuriores. *Mas et Foem. adult.*

*Lory de la Chine Buff.* Pl. enl. 519 (*fig. satis accur.*). *Psittacus ruber (inclusa var.) Gmel., Lath., Vieill., Kuhl.* *Psittacus coeruleatus Shaw.* Nat. Misc. 22. t. 937. *Id. Gen. Zool.* 8. p. 539. *Lori à franges bleues Le Vaill.* l. c. t. 93 (*pictura avis nimis obscure coccinea*). *Psittacus cyanonotus Vieill.* N. D. 25. p. 334. *Id. Encycl. meth. Livr.* 93. p. 1378.

*Avis junior.* Ptilosis cinnabarina, plumis, praesertim juguli ac reliquarum partium gastraei, medio flavidis; rectrices purpurinae, laterales extus et apice sordide virescentes; pennae scapulares postero-

res apice coerulescentes; tectrices alarum superiores majores, remiges secundariae apice, ac remiges primariae extus sordide virescentes; alarum flexura plumulis sordide virescentibus tecta; rostrum aurantium; pedes nigri.

*The long-tailed Lory* Edw. t. 173 (fig. opt.). *Psittacus borneus* Auctor, *Huhl. Perruche écarlate* Le Vaill. l. c. t. 44 (fig. bona).

Irides flavo-rubrae; pedes et ungues nigri; cauda elongata, gradato-cuneata; alae elongatae, acutae. Longitudo 11  $\frac{1}{2}$ "", caudae 5", rostri ad frontem 13""", tarsi 7  $\frac{1}{4}$ "". Habitat in insulis Moluccis. (Mus. Paris., Monac.)

*Observatio.* An icon *Sonneratii* in operis sui tabula 112 conspicua (*Voyage à la Nouvelle-Guinée*), caudam taenia castaneo-fusco terminatam monstrans, huc referenda?

3. *E. guebiensis*. Ptilosis rubra, plumis pilei, colli postici ac lateralis, pectoris laterumque trunci margine obscure viridibus, nigro reflectentibus; tectrices alarum superiores mediae ac majores apice nigro largo, quare supra alam fasciae duae; dorsum rubrum nigricanti-viridi varium; cauda tota ac remiges obscure rubrae; harum primariae extus, omnes apice nigrae. *Avis junior* (?).

*Lory de Gueby* Buff. Pl. enl. 684 (fig. mala). *Psittacus guebiensis* Auctor. *Le Lori écaillé* Le Vaill. l. c. t. 51 (fig. bona). *Psittacus squameus* Shaw. Gen. Zool.

Rostrum compressum, aurantium; irides igneae; pedes nigricantes; cauda elongata, gradata. Habitus et magnitudo *Eois indicae*. Habitat in insula *Gueby*, *Bouron* et in *Nova-Guinea*. (Mus. Paris.)

*Observatio.* Specimen nunc descriptum Musei Parisiensis, unicum quod vidi, juvenile, hoc a cel. *Sonnerat* male (?) delineat.

tum (*Voy. à la Nouv. Guin.* p. 174. t. 109.) absque plumarum rubrarum marginibus nigricanti-viridibus adultum credo. — *Lathamii* var.  $\beta$ . (*Gmelini Psittacus janthinus*) spectat ad *Eclectum grandem*.

4. *E. cochinsinensis*. Vertex, occiput ac totum collum eleganter coerulea; frons, facies tota gulaque coccineae; gastraeum totum coccineum, excepta macula pectoris maxima, supra ventrem extensa, scutiformi, coerulea; plumae nonnullae laterum, ventris et abdominis infimi coeruleo-limbatae; pennae scapulares, dorsum, tergum, uropygium, caudae alarumque tectrices superiores nec non alarum tectrices inferiores coccinea; remiges supra nigricantes pro vario ad lucem objectu in obscure viride et nonnihil in violaceum vergentes, intus magna ex parte rubrae; tectrices alarum superiores majores nigricanti-virides, rubro-terminatae, unde in alis fascia; cauda supra tota obscure testaceo-rubra, subtus dilute rubra. *Av. adult.*

*Psittacus cochinsinensis* Lath. (*descriptio manca ex icone*), *Huhl. La Perruche Lory à chaperon bleu Le Vaill.* l. c. p. 111. t. 54. *Psittacus riciniatus* Bechst. in *Lath. Uebers. der Vög.* S. 69. n. 24., *Huhl* l. c. p. 42. n. 61. *Psittacus cucullatus* *Shaw.* *Gen. Zool.* 8. p. 461.

Habitus et magnitudo *Eois indicae*; cauda elongata, gradato-lanceolata; rostrum parvum, aurantium; pedes fuscii. Habitat in *insulis Moluccis*. *Le Vaill.* (*Olim in Museo Rayan. Amstelodami.*) Non vidi.

5. *E. variegata*. Ptilosis intense sanguinea; collum inferius, dorsum supremum, pectoris peripheria, abdomen et crissum eleganter purpurino-coerulea; abdominis partes posteriores reflexu nonnullo virescenti-nigro; alae supra toto rubrae; remigum pogonium internum flavum, apice obscuro; tectrices alarum inferiores rubro- et



flavo-variegatae; rectrices virides, intus versus basin rubicundae, extus versus apicem coeruleae.

*Psittacus variegatus* Gmel., Lath., Kuhl.

Rostrum obscurum; cauda longula, parum cuneata. Longitudo (mens. angl.) 11". Habitat in *India orientali*. A *Lathamio* ad specimen Musei Leveriani descripta. (Non vidi.)

*Observatio.* Ad hanc divisionem generis *Eois* pertinet:

*Lorius Isidorii,*

quem *Swainson* in opere suo: „*Zoolog. Illustr.* Sec. serie. N. I. à III. (*Londres et Paris* 1829) descripsit. Opere illo carens, avis descriptionem dare non possum. (Vid. *Bullet. univ. des sc. nat.* 1830. Fevr.)

β. *Ptilosi viridi.*

6. *E. cervicalis.* Frons, alarum flexura, suffrago et macula arcuata pectoris supremi eleganter rubrae, haec in cervice acuminata; capitis ac colli latus superius ac reliqua pars notaei obscure viridia, plumae omnes rhachi nigra insignes; remiges nigro-virides, extus coeruleo-virides; rectrices supra ac tectrices alarum superiores versus finem olivaceo-virides; corporis partes inferiores dilute virides, pectus in rubicundum vergens; alae caudaque subtus olivaceo-aureae.

*Psittacus cervicalis* Lath., Kuhl. *Le Perroquet Langlois* *Le Vaill.* l. c. p. 105. t. 136. *Psittacus nuchalis* Shaw Misc. 21. t. 913 (figura *Le Vaill.*). *Psittacus Langloisi* Vieill. N. D. et Encycl. meth. *Psittacus lunatus* Bechst. *Abbild. Naturhist. Gegenst.* 8. t. 94. *Id.* *Kurze Uebers. d. Vög.* S. 82. n. 88. *Kuhl* l. c. p. 36.

Rostrum perquam arcuatum, dente valido munitum, albidum, apice corneo-griseum, mandibula valde obtusata; regio ophthalmica parum nuda, griseo-incarnata; irides laete flavo-rubrae; pedes obscure cinerei; cauda elongata, cuneata. Longitudo  $11\frac{1}{2}$ " , caudae 6" , rostri 1" . Habitat, ut dicitur, in *India orientali*. *Bechst.*

*Observatio.* Species haec, a me nusquam visa, alium forsán locum in systemate psittacorum obtinere debet. An lingua supra apicem papilloso-penicillata, ut in aliis speciebus hujus divisionis?

7. *E. ornata.* Viridis; frons et vertex nec non aurium macula ad oculum extensa cyaneo-violacea; lunula in occipite cum utroque apice ad oculum extensa, genae, mentum, gula et jugulum sanguineo-rubra; juguli plumae viridi-nigrae, lunulae occipitalis cyaneo-marginatae; macula colli lateralis longitudinalis, ac tectrices alarum inferiores luteae; pectoris latera, abdomen tibiaeque flava, plumis large viridi-limbatis; crissum virescens; dorsi plumae macula intermedia trigona, lutea notatae; rectrices virides, intus a basi ultra medium rubrae, dein in toto apice flavae, duae intermediae prorsus virides; remiges extus virides, intus et subtus nigrae. *Mas et Foem. adult.*

*The Lory-Parrakeet Edw. 4. t. 174 (fig. bona). Perruche variée des Indes orientales Buff. Pl. enl. 552 (fig. bona). Psittacus ornatus Auctor.*

*Var. α.* Aurium macula coerulea nulla. (*An avis junior?*)

*Var. β.* Corporis partes inferiores flavae. (*Specim. domefact.*)

*Var. γ.* Viridis, flavo-variegata. (*Specim. domefact.*)

Rostrum pallide aurantium; cera obscura; regio ophthalmica nudiuscula, cinerea; irides flavo-rubrae; pedes unguisque cinereo-nigricantes; cauda elongata, gradato-cuneata. Longitudo  $9\frac{1}{4}$ " , caudae 3" , alae  $4\frac{1}{2}$ " , rostri ad frontem  $11$ " , tarsi 6" . Habitat in

insulis *Bourou*, *Amboina*, *Sumatra* et *Java*. (*Mus. Paris.*, *Berol.*; vidi duas vivas.)

*Observatio.* Credo auctorum *Psittacum atricapillum* huc pertinere. *Sebae* icon nec non illius descriptio pessima derivantem prorsus destituunt.

## XII. Genus. *Coriphilus*. Pag. 32.

1. *C. sapphirinus*. Caput, cervix, dorsum, uropygium, abdomen et crissum nitide cyaneo-sapphirina; jugulum et pectus candida; alae coerulescenti-nigrae; remiges margine sapphirinae; rectrices fuscae limbo sapphirino. *Mas adult.*

*Psittacus sapphirinus* R. *Forster* in Manuscr. *Id.* Icon. inedit. t. 49. *Petite Perruche de l'isle de Taïti.* Buff. Pl. enl. 455. f. 2. (*fig. mala.*) *Psittacus taïtianus* Auctor. *Psittacus porphyrio* Shaw. Nat. Misc. t. 7. (*fig. bona.*) Gen. Zool. 8. p. 473. *La Perruche Arimanon* Le Vaill. l. c. p. 127. t. 65 (*fig. opt.*).

*Foemina.* Mari similis, gula tantum candida, jugulum cinereum.

Rostrum crassum, breve, sanguineum; cera sanguinea, nuda; lingua supra apicem papillis filiformibus, numerosis tecta; oculi parvi, iride sanguinea; pedes sanguinei, unguibus atris, tarsis brevissimis; pilei plumae elongatae, strictae, subulatae; alae longae, complicatae fere extrema caudae exaequant; cauda rotundata, longitudine truncum aequans, rectricibus 12. Longitudo fere 7", caudae 2". Habitat socialis in insula *O-Tahiti*, et adjacentibus; ab incolis appellatur *Winee*; in altissimis palmis *Coccus nuciferae* plerumque nidificat; sibilando fistulandoque garrit; victitat inprimis fructu *Musae paradisiacae*. *Reinh. Forster.* (*Mus. Paris.*)

*Observatio.* Specimina duo aequali longitudine emessus sum ipse Parisiis apud dom. *Fl. Prévost*. Ad avem hornotinam spectat,

ni fallor, *Gmelini Psittacus varius*, hoc modo descriptus: *Ex fusco et cyaneo varius; genae, gula jugulumque albicantia; rectrices remigesque obscure fuscae, latere exteriori cyanae; rostrum pedesque flavescantia; ungues nigri.* — Eandem avem (olim in Museo Bullockiano obviam) describit pro nova specie cel. *Kuhl* (l. c. p. 49.) sub nomine „*Psittacus ultramarinus*“ hoc modo: Frons, nucha, dorsum, alae caudaque ultramarina; pars capitis superior, pectus, corpus tibiaeque coerulea; jugulum et abdomen albobrunneoque varia; maxilla flava, mandibula cornea; alae longae; cauda rotundata.

2. *C. cyaneus*. Ptilosis tota intense coerulea, unicolor; cauda remigesque subtus nigrae; pilei plumae strictae, subulatae; rostrum et pedes rubra.

*Psittacus cyaneus Sparrm.* Mus. Carlson. t. 27. *La Perruche Sparrmann Le Vaill.* l. c. p. 128. t. 66 (fig. opt.). *Psittacus Sparrmanni Bechst.* Uebers. d. Vög. *Lath.* S. 80. n. 79. *Kuhl* l. c. n. 68.

*Av. juv.* Cyaneus; gutture pallide nigro.

Cauda longiuscula, corpore tamen brevior, cuneata; lingua supra apicem papilloso-penicillata. Habitus *Coriphili sapphirini*. Habitat in insula *O-Tahiti*.

*Observatio.* Speciei praecedenti paullo majori admodum affinis. An ab ea sane diversa? Specimen nitidum a cel. *Forster* in Europam allatum vidi in Museo Londinensi.

3. *C. euchlorus*. Frons viridis; vertex sapphirinus; genae et jugulum sanguinea; dorsum, uropygium, pectus, abdomen, crissum, alarum tectrices superiores et remiges secundariae eleganter viridia; abdomen macula antice sanguinea, postice amethystina notatum; tibiae virides, intus violaceae; remiges 18 supra virides, margine interiore fuscae; rectrices (12) margine exteriori virides, interiore et subtus flavae. *Av. adult.*

*Psittacus euchlorus* R. Forster in Manusc. *Psittacus pipilans* Lath., Shaw. Gen. Zool. 8. p. 472. t. 69 (fig. pessima). *Psittacus fringillaceus* Gmel. p. 337., Lath., Kuhl. *Psittacus australis* Gmel. p. 329. n. 90 (sed non Lath.). *Psittacus porphyrocephalus* Shaw. Nat. Misc. t. 1 (fig. mala). *La Perruche fringillaire* Le Vaill. l. c. p. 134. t. 71 (fig. opt.).

*Avis junior.* Abdomen viride; ventris macula quam in ave adulta minor.

Habitus et magnitudo *Coriphili Kuhlii*; pilei plumae elongatae, angustae, subulatae; rostrum rubrum; cera ad basin rostri rubra, medio emarginata; irides igneae; lingua obtusa, antice papillosa; pedes rubri. Habitat (fide R. Forster) in maris pacifici insula *Tonga-Tabu*, praesertim in *Coccos nucifera*, ab incolis *Hohaènga* vocatus. *Avis pulcherrima!* (*Mus. Paris.*)

*Observatio.* Sunt specimina (fide Latham) in pectore fusca. An juv., an foem.?

4. *C. solitarius.* Vertex non vere cristatus, attamen plumae frontis totiusque pilei longae, strictae; hae, tibiae, hypochondriaque intense violaceae; capitis latera, collum totum laterale et jugulum, humerorum regio ac gastraei pars reliqua intense sanguineo-coccinea; cervix nigro-coerulescens; alae ac cauda supra, dorsum, uropygium ac crissum, nec non colli pars postica superior viridia; cauda subtus flavida. *Av. adult.*

*Psittacus solitarius* Lath. Suppl. (*Descript. optima.*) Vieill., Kuhl. *La Perruche. Phigy.* Le Vaill. l. c. p. 125. t. 64 (fig. opt.). *Psittacus Phigy.* Bechst. in Lath. Uebers. d. Vög. S. 81. n. 83., Kuhl l. c. p. 69. n. 119. *Psittacus Le Vaillantii* Shaw. Misc. t. 109 (*tabula Vaillantiana*). *Id. Psittacus coccineus* Gen. Zoolog. 8. p. 472. Vieill. N. D. 25. p. 355.

Facies tota plumosa; lingua apice papilloso-pennicillata; irides fulvae; rostrum et pedes flavescencia; cauda longula, gradato-rotundata. Longitudo  $7\frac{1}{2}''$ . Habitat in maris pacifici *insulis Societatis*, praesertim in *Borabora* ac (fide *Lesson Voy. de la Coq.*) in *insulis Moluccis*. (*Mus. Paris.*)

5. *C. Kuhlii*. Capitis crista duplex, frontis verticisque eleganter prasino-viridis, occipitis intense violacea, utraque e plumis elongatis, strictis, aequalibus composita; capitis latera et gastraeum totum sanguineo-rubra, exceptis tibiis et abdomine amethystino-violaceis, hypochondriis, crisso, uropygio et caudae tectricibus superioribus sulphureo-virescentibus; dorsum alarumque tectrices omnes saturate et laete viridia; remiges toto nigrae, extus coerulescenti-virescentes; rectrices sanguineo-rubrae, apice extimo virescentes, extus magna ex parte nigro-cyaneae. *Mas et Foem. adult.*

*Psittacula Kuhlii*. *Vigors Zoolog. Journ.* 1824. N. 3. tab. 16.

Habitus simillimi *Coriphili solitarii*; rostrum parvum, miniato-rubicradum; pedes miniati, unguibus nigrescentibus; digiti breves, robusti; facies tota plumosa, solum orbitarum regio strictissime nuda, alba; oculi admodum parvi; irides e tribus circulis compositae, primo externo miniato, secundo cinereo, tertio, pupillam ambiente, flavido; lingua supra apicem papilloso-penicillata; cauda longula, latiuscula, apice conico-subrotundata. Longitudo  $7'' 5'''$ , caudae fere  $3''$ , tarsi  $6'''$ , alae  $5'''$ , rostri ad frontem  $5\frac{1}{2}'''$ . Habitat in maris pacifici *insulis Sandwichii*; avis pipilans, moribus *Psittaculac pullariae* simillima. Avicula mirae pulchritudinis, irritata aut terrefacta verticis occipitisque plumas erigens.

*Observationes.* Specimen ab ipso rege *insularum Sandwichii* in Angliam allatum, a cel. *Vigors* descriptum, emi Londini; condonavi idem dom. *Sturm* Norimbergae, in cuius collectione nunc estat. Duo exemplaria viva observavi per longum tempus in collectione

magnifica regis nostri clementiss. *Maximiliani Josephi. Coriphilus solitarius*, quocum a cl. *Lesson (Bullet. univers. des scienc. nat. 1825. n. 11. pag. 409.) C. Kuhlii* unitur, species distincta, toto coelo diversa.

XIII. Genus. *Domicella*. Pag. 33.

1. *D. atricapilla*. Pileus totus niger; occiput obscure lilacinum; capitis latera, jugulum ejusque latera, crissum et reliquae gastraei partes coccinea, exceptis plumis in parte infima juguli basi luteis (unde colli fascia lutea occulta), et tiliarum azureis, basi viridibus; tectrices alarum inferiores minores, ac totus alarum margo azureo-violacea; collum posticum, dorsum, tergum, uropygium, caudae tectrices superiores ac pennae scapulares coccineo-purpureae; plumae harum partium in basi obscure virescentes; alae supra obscure virides, unicolores; remiges intus a basi ultra medium luteae, dein paullo nigrae, secundariae apice virides; rectrices omnes subtus coccineae, supra coccineo-purpureae, large obscure lilacino-terminatae. *Mas et Foem. adult.*

*The second black-capped Lory Edw. 4. t. 171 (fig. bona). Lory mâle des Indes orientales Buff. Pl. enl. 119 (fig. mala). Psittacus Domicella (inclusa varietate  $\beta$ ) Auctor. Le Perroquet Lory à collier jaune. Le Vaill. l. c. t. 95 (fig. bona).*

*Avis junior.* Plumae flavae fasciae inferioris juguli magis occultatae (aut nullae?); tibiae fere toto virides.

*Lory des Indes orientales Buff. Pl. enl. 84 (fig. mediocr.). Variété du Lori à collier Lc. Vaill. l. c. t. 95 (fig. bona).*

*Var. a.* Alae, tibiae ac colli fascia prorsus flavae; caput dilute rufescens; hoc alarumque margo nitide azurea.

*Le Perroquet Lori Radhia Le Vaill. l. c. t. 94. Psittacus*

*Raja Shaw*. Gen. Zool. 8. p. 537. t. 82 (icon. *Vaill.*). *Psittacus Rex Bechst.* in *Lath.* Uebers. der Vög. S. 92. n. 135. *Psittacus Radhea Vieill.* N. D. 25. p. 337. *Id.* Encycl. meth. p. 1380.

Rostrum flavo-aurantium, apicis lateribus vix emarginatum; regio ophthalmica et stria in loris nudiusculis, subpilosis cinereae; cera cinerea; lingua crassa, apice integra, nigricans; irides aurantio-rubicundae; pedes intense cinereo-nigricantes, unguibus nigris; cauda mediocris, fere aequalis. Longitudo  $11\frac{1}{4}$ " , caudae 4" , alae  $6\frac{1}{2}$ " , rostri ad frontem  $1'' 2\frac{1}{2}'''$  , tarsi  $\frac{3}{4}$ " , digiti antici externi, excluso ungue,  $11'''$  . Habitat in insulis *Moluccis*, et satis frequens in *Nova-Guinea*. (*Mus. Paris, Monac.*; multas vivas vidi.)

*Observatio.* Auctorum *Psittacus atricapillus* a cl. *Kuhl* cum hac specie unitus, non solum piloseos pictura sed cauda quoque gradata, longiore diversus, spectat verisimile ad *Eoem ornatam*. — Avis a *Le Vaillant* in operis sui tabula 95 exhibita, mera huius speciei varietas, in Museo Lugdunensi Batav. obvia.

2. *D. Lory*. Pileus totus ater; occiput nonnihil in coeruleum vergens; capitis latera, totum collum, pectoris ac ventris latera, tibiae basi, tergum, uropygium, tectrices caudae superiores et alarum inferiores coccinea, harum superiores, pennae scapulares remigesque omnes extus saturate virides, solum remigis primae pogonium externum nigrum, internum a basi usque ultra medium laete flavum, reliqua parte nigrum; remiges sequentes maxima parte flavae, apice nigrae, quindecima intus nigra, macula rotunda, flava notata, omnes subtus nigrae; suffrago violacea; cervix, dorsum supremum, pectus in medio, venter, abdomen et crissum elegantnr violacea; rectrices duae intermediae coeruleo-virescentes, reliquae coeruleae, intus flavidae; alarum margo flavescens. *Mas et Foem. adult.*

*The first black-capped Lory Edw.* 4. p. 170. t. 170 (fig. et descript. opt.). *Lorius philippensis Briss.* 4. p. 225 (descrip-



tio e specimine adulterato). *Lory des Philippines Buff.* Pl. enl. 168 (icon e specimine Brissoniano). *Psittacus Lory Auctor.* (Descript. quoad caudae picturam falsa). *Le Perroquet Lori à scapulaire bleu Le Vaill.* l. c. t. 123 (fig. inaccurata (?) *gastreaem coeruleum monstrans*) et t. 124 (fig. opt.).

Rostrum aurantium; lingua integra, nigra; regio ophthalmica largiuscule nuda et cera obscure incarnatae; irides aurantiae, circa pupillam paullo pallidiores; pedes unguisque nigri; cauda mediocris, subaequalis. Longitudo 11 1/2". Habitat satis frequens in *Nova-Guinea*. (*Mus. Paris.*; multas vivas vidi.)

*Observatio.* Specimini a *Brissonio* descripto caudam *Domicellae garrulae* insertam fuisse, mihi persuasum est. Ornithologi recentiores hanc adulterationem praetervidebant.

3. *D. punicea.* Caput, jugulum, collum, dorsum totum, uropygium, caudae alarumque tectrices superiores omnes, pennae scapulares, remiges ultimae supra ac reliquae extus saturate coccinea, haec intus nigrae; pectus, venter, latera, tibiae, crissum alarumque tectrices inferiores minores obscure violacea, harum majores nigricantes; tectrices saturate coccineae, apice sordide rubicundae.

*Lorius amboinensis* *Briss.* Ornith. 4. p. 231. n. 19. *Psittacus puniceus* *Auctor.*

Rostrum obscure rubrum; regio ophthalmica nudiuscula, nigricans; irides aurantiae; pedes fusci, unguibus nigris. Longitudo 11 1/2", caudae 4", rostri ad oris angulum 11 1/2", tarsi 10", digiti antici externi, incluso ungue, 16". Habitat in *Nova-Guinea* (inquilinis *Manambieffe* dicta (in *Amboina, Ceram. Brisson*). (Non vidi).

*Observatio.* Tabula Browniana ab auctoribus citata ad *Electum grandem* referri et icon *Buffonii* vitari debet, cum speci-

mine alis avis alius exstructo innitatur. — Species certo distincta, cum *Eclecto grandi* a cl. *Kuhl* false unita.

4. *D. coeruleata*. Ptilosis totius corporis coccineo-rubra, exceptis pennis scapularibus, cauda tota, remigibus duabus ultimis et abdomine infimo eleganter coeruleis; tectrices alarum superiores majores coccineae, coeruleo-limbatae; remiges brunnescenti-nigrae; margine extimo paullo coeruleo-reflectentes; rostrum aurantium.

*Le Perroquet Lori à queue bleue* *Le Vaill.* l. c. p. 45. t. 97. *Psittacus coeruleatus* *Bechst.* in *Lath.* Uebers. der Vög. S. 93. n. 141. *Psittacus cyanurus* *Shaw* Gen. Zool., *Vieill.* N. D., *Kuhl* l. c. p. 41. n. 59.

Pedes unguesque nigri; cauda apice subrotundata. Habitus et fere magnitudo *Domicellae garrulae*. Habitat in *Borneo*. *Le Vaill.* (Olim in museo Rayano Amstelodami). (Non vidi.)

5. *D. garrula*. Rostrum totum aurantium; lora plumosa; caput ac collum totum, crissum ac omnes gastraei partes coccinea, exceptis tibiis toto flavis; dorsum, tergum, uropygium caudaeque tectrices superiores capite obscurius coccinea; dorsum supremum plumis nonnullis apice flavis variegatum; rectrices omnes supra a basi ultra medium coccineae, dein obscure olivaceo-virides, ibi extus nonnihil violaceo-reflectentes, intermediae duae reliquis dilutius rubrae, ad baseos latera virescentes, omnes subtus a basi usque ad medium coccineae, dein obscure virescentes, reflexu nonnullo coccineo; alarum flexura flava; tectrices alarum superiores omnes remigumque omnium pogonium externum viridia, primariarum pogonium internum a basi ultra medium roseo-rubrum, apice, sicut secundariarum, toto nigrum, tectrices inferiores virescenti-olivaceae, flavo variegatae. *Mas et Foem. adult.*

*The scarlet Lory* *Edw.* Av. 4. t. 172. *Psittacus humeris luteo-variegatis*. *Bris.* Av. 4. p. 219. n. 14. t. 23. fig. 1 (*descr.*

opt.). *Lory des Moluques Buff.* Pl. enl. 216 (fig. mala). *Psittacus garrulus* (inclusis varietatibus, descriptionibus mancis nixis) et *Psittacus mexicanus Auctor.* *Le Perroquet-Lori Nouara.* *Le Vaill.* l. c. t. 96 (fig. bona).

*Var. α.* Tectrices alarum superiores coeruleo-maculatae.

Regio ophthalmica nudiuscula et cera albo-cinereae; irides annulis duobus, externo aurantio, interno strictissimo flavo; lingua crassa, apice integra; rostri apex ad latera parum angulatus; cauda mediocris, subgradato-rotundata; pedes cinereo-nigricantes, unguibus nigris. Longitudo 11½", caudae 4¼", alae 6¾", tarsi 7", digiti externi, excluso ungue, 1". Habitat in *insulis Moluccis*, frequens in *Java*; avis garrula, irritata castoris ad instar stridens ac voce concrepante clamans, gulam eodem tempore inflans; simiae in modum humo assidue exsilit (*Mus. Paris.*, *Monac.*; multas vivas vidi; sexus dissectione speciminum nonnullorum constitui.)

*Observatio.* *Sebae* icon ac descriptio satis clara *Domicellam garrulam* manifeste exhibent.

#### XIV. Genus. *Eclectus*. Pag. 33.

1. *E. Linnaei*. Tab. XXII. Caput ac collum totum, *pectus, epigastrium, crissumque pure coccinea*; *circulus palpebrarum plumulosus, strictissimus cyaneus*; *fascia ventris lata, abdomen medium, tectrices alarum inferiores, alarum margo totus ac fascia colli supremi ante dorsum angustiuscula, laete et pure cyanea*; *tectrices alarum superiores omnes, remiges secundariae extus (intus coeruleae limbo obscure virescente) ac ultimae supra, pennae scapulares, dorsum, tergum, uropygium caudaeque tectrices superiores purpureae*; *alulae pennae intense coeruleae, limbo externo coerulescentes; remiges primariae ac anteriores secundariae maxima ex parte intense cyanae, limbo interno nigro, externo angustiore virescente, omnes subtus*

toto nigrae; *rectrices a basi usque ultra medium purpureae* (dorso paullo pallidiores), versus apicem *sensim, subtus toto cinnabarino-roseae, juxta rhachin* (non in apice) paullo flavido reflectentes; rostrum totum atrum. *Av. adult.*

Habitus *Eclecti grandis*, primo intuitu simillimi, eodem tamen validior; rostrum quam in hac ave robustius, culmine acutius compressum, apice profundius emarginatum; regio ophthalmica tota plumosa; irides flavae; cauda mediocris aequalis, quam in *Eclecto grandi* brevior; pedes unguesque nigri. Longitudo fere 15", rostri ad frontem 1 $\frac{3}{4}$ ", caudae 4" 8"', alae 8 $\frac{3}{4}$ ", tarsi 8"', digiti antici externi, excluso ungue, 1 $\frac{1}{4}$ ". Habitat in *India orientali*. (*Mus. Monac.*)

*Observatio.* Vivam avem vidi apud regem nostrum clement. *Maximilianum Josephum*. In hac ave, sicut in sequente colli pectorisque plumae laxae sunt, rigidiusculae et fere ut in *Ramphastis* formatae.

2. *E. grandis.* *Palpebrae* plumosae, caput ac *collum superius* pure coccinea; *collum totum inferius, pectus, epigastrium, venter, hujus latera, abdomen medium ac tibiae ad basin violascenti-lilacina*; pectoris plumae versus basin rubentes; alarum margo cyaneus, flexurae inferior alarumque tectrices inferiores ventri concolores; harum superiores omnes, pennae scapulares, dorsum, tergum, uropygium, caudae tectrices superiores, remiges ultimae supra ac secundariae extus *coccineo-purpurea; reetricum taenia apicalis latiuscula crissique plumae luteae, hae basi rubentes*, illae reliqua parte dorso concolores, subtus paullo dilutiores; hypochondriorum plumae dorso concolores, nonnihil viridi-terminatae; remiges penultimae intus obscure virescentes, secundariae ibidem juxta rhachin et in apice obscure coeruleae, in parte reliqua obscure virescentes, primariae cya-

neae, intus ad marginem et subtus nigrae. *Mas et Foem. adult.*

*Brown* Illustr. t. 6. *Perroquet grand Lori, mâle. Le Vaill.* l. c. t. 126 (fig. sat. accurat.). *Psittacus grandis*, *Kuhl*, l. c. p. 38. n. 50. *Psittacus janthinus* *Gmel.* *Psittacus quebien-sis* var.  $\beta$ . *Lath.*

*Avis junior.* Avi adultae similis; plumae pectoris, epigastrii, ventris abdominisque coccineae nitore lilacino, viridi-limbatae.

*Lory de la Nouvelle Guinée Buff.* Pl. enl. 683 (fig. valde mediocr.). *Psittacus grandis* *Gmel.*, *Lath.* — *Le Vaill.* l. c. t. 127.

*Avis juvenilis.* Praecedenti similis; pectus viride, paullo lilacino-variegatum; reliquae gastraei partes rubro- et viridi-variae.

*Le Vaill.* l. c. t. 128.

Rostrum totum nigrum; culminis acies rotundata; regio ophthalmica tota plumosa; irides flavae; cauda mediocris, aequalis, pedes unguisque nigri. Longitudo 13" 11"', caudae 5", alae 8", rostri ad frontem 1" 8"', tarsi 7 $\frac{1}{2}$ "', digiti antici externi, excluso ungue, 1". Habitat in insulis *Moluccis*. (*Mus. Paris.*, *Monac.*; multos vivos vidi.)

*Observationes.* Quae sit *Lathamii* sic dicta varietas hujus avis, prorsus ignoro. Hoc modo describitur: Caput, collum pectusque eleganter rubra; corpus supra fuscum, viridi-coeruleoque varium; epigastrium venterque coerulea; crissum coeruleum virescenti-mixtum; tibiae intense castanae, plumis viridi-marginatis; alarum margo ac tectrices inferiores coerulea; remiges obscurae, intense coeruleo-marginatae, cauda castanea, apice dilutior; rostrum nigrum; cera et pedes obscura. Magnitudo *E. grandis*.

A cl. *Latham* ad specimen Musei Hunteriani descriptus. An hornotinus *Ecl. grandis*?

Ad *Eclectum grandem* referendus est auctorum *Psittacus janthinus* (*Psittacus guebiensis* var.  $\beta$ . *Lath.*) a *Fermin* satis accurate sed false pro *Americae* incola descriptus. — Dedit idem auctor nostrum *Picum viridem* pro *Americae* incola! Auctorum *Psittacus puniceus* a cel. *Huhl.* cum *Eclecto grandi* unitus, species distincta est, nostra *Domic. punicea*.

XV. Genus. *Psittacodis*. Pag. 33.

$\alpha$ . Ptilosi nigro-rubra.

1. *Ps. Parugua*. Tab. XXIII. Cauda hujusque tectrices, alae totae, caput ac totum collum nitide nigra; tergum, gastraei pars reliqua et annulus periorbitalis (an hic nudus?) coccinea.

*Paragua Marcgr.* Hist. rer. natur. Brasil. Lib. IX. p. 207. (*Lichtenst.* Abhandl. der Berlin. Akad. d. W. 1816—17. p. 167.) *Psittacus paraguayanus* Auctor. *Psittacus Stavorini*. *Less.* Voy. de la Coq. aut. du monde. p. 628. *Desm.* Dict. des sc. nat. 39.

Rostrum cinereo-nigricans; irides cinereo-fuscescentes (non rubrae); pedes albido-grisei; cauda aequalis. Habitus et fere magnitudo *Eclecti grandis*. Longitudo circiter 12½", maxillae ad frontem 9", alae 6" 5", tarsi circiter 6". Alae complicatae caudae basin transcendunt. Habitat in insula *Waigiou* (fide *Less.*), non in *Brasilia*.

*Observatio.* *Marcgrave* hanc avem isto modo describit: „*Psittacus* est niger magnitudine *Airu-curcu* (*Psit. ochroceph.*) pectore, dorso et ventre medietate anteriore insigniter rubro. Oculis nigris, circello rubro. Rostro fusco seu obscure cinereo; cruribus et pedibus obscure cinereis.“ Descriptionem ac mensuram hausi ex

*Marcgravei* icone, quam accurate depictam mecum communicavit *Lichtenstein*. Eadem icon monstrat plumas virides in femoribus. Cel. *Lesson* tergum rubrum, tectricibus scapularibus superincumbentibus in ave viva sine dubio tectum, describere omisit.

β. Ptilosi viridi.

1 2. *Ps. magnus*. Maxilla roseo-rubra, apice flava; mandibula tota nigra; caput, collum, totus truncus supra ac subtus, nec non alae supra saturate gramineo-viridia, splendentia; macula epigastrii lateralis maxima tectricesque alarum inferiores omnes minores saturate coccineae, harum majores ac remigum pagina inferior aterrima; alarum margo totus cyaneus; rectrices duae intermediae dorso concolores, in apicis medio cyaneae, sequens utrinque concolor, sed magis coerulea, proximae utrinque duae cyaneae, extus large viridi-, intus nigricanti-viridi-limbatae, extima tota cyanea, excluso margine pogonii interni nigro, omnes subtus aterrimae, apice extimo obsolete flavidae; remiges primariae supra intense-coeruleae, margine pogonii interni nigrae, secundariae extus basin versus virides, versus apicem cyaneae, intus juxta rhachin intense cyaneae, dein nigrae. *Mas et Foem adult.*

*The green and red Parrot from China Edw. 1. t. 231 (fig. bona).* *Psittacus sinensis Briss. 4. p. 291 (descript. opt.). Perroquet de la Chine Buff. Pl. enl. 514 (fig. pessima).* *Le grand Perroquet verd de la Nouvelle Guinée. Sonner. Voy. à la Nouv. Guin. p. 174. t. 108. Psittacus sinensis. Auctor. Psittacus magnus Gmel., Psittacus viridis Lath. Perroquet à flancs rouges Le Vaill. l. c. t. 132 (fig. mala).* *Psittacus lateralis Shaw. Gen. Zool.*

Maxilla valida, intumida, tomis integerrima; regio ophthalmica

prorsus plumosa; cera vix conspicua; palpebrae cinerascens; pupilla maxima; iris strictissima, crocea, margine inferiore flava; pedes nigricantes, squamularum interstitiis albo-pulverulentis; unguis nigri; cauda longula, aequalis, lata. Longitudo  $15\frac{3}{4}$ " , caudae 6" , alae  $10\frac{1}{4}$ " , rostri ad frontem 1" 10" , digiti antici externi, excluso ungue, 1" 5" . Habitat in *Insulis moluccis*, frequens in *Nova-Guinea* et in *Waigiou*; iridem pro lubitu avis dilatare ac contrahere valet. (*Mus. Paris., Monac.*; multos vivos vidi; marem et foeminam dissecti ipse). Foemina, mare paullo minor, est 15" longa.

*Observatio.* *Psittacus Sonneratii* a cel. *Kuhl* cum hac avē unita, species diversa, cauda longa insignis, noster *Palaeornis Alexandri*.

3. *Ps. sumatranus*. Ptilosis tota viridis, colli plumis in flavidum vergentibus, uropygii coerulescentibus; remiges intus nigrae; regio ophthalmica nudiuscula, nigricans; rostrum dilute incarnatum.

*Psittacus sumatranus Raffles* Transact. of the Linn. Soc. 13. p. 281. n. 5.

Irides albae; cauda mediocris, aequalis; pedes plumbeo-coerulescentes; caput reliquis corporis partibus dilutius viride. Longitudo 12 sive 14" (mens. angl.). Habitat in *Sumatra*, inquilinis *Kéké* dictus (*Raffles*). Non vidi.

4. *Ps. gramineus*. Frons, vertex, occiput supremum ac capistrum coerulea, hoc in medio lineola atra notatum; collum posticum, dorsum, tergum ac alae supra saturate gramineo-viridia; remiges extus coeruleae, intus nigricantes; genae, gula, collum anticum ac reliquae gastraei partes viridi-flavida, nonnihil in olivaceum vergentia; rectrices mediae virides, laterales coeruleae, omnes subtus flavofuscescentes.

*Perroquet d'Amboine Buff.* Pl. enl. 862. *Psittacus grami-*



*neus Auctor. Perroquet à calotte bleue. Le Vaill. l. c. p. 80. t. 121 (fig. cum descriptione non satis congruens).*

Habitus et magnitudo *Psittaci pulverulenti*; cauda apice subrotunda; rostrum rubicundum; pedes plumbei. Habitat in *Amboina* (olim in Museo *Parisiensi*). Non vidi.

γ. Ptilosi viridi-rubra.

5. *Ps. Tarabe*. Olivaceo-viridis; caput, collum totum, pectoris pars suprema et cauda fere a medio ad finem coccinea; rostrum fuscum; pedes pallidi.

*Tarabe Marcgr.* Hist. rer. natur. Brasil. Lib. t. IX. p. 207. *Lichtenst.* l. c. p. 168. *Psittacus Tarabe Auctor.*

Cauda aequalis; alae caudae basin paullo transcendentes; circulus periophthalmicus (an nudus?) ochraceus; irides cinereo-fuscescentes. Magnitudo *Psittaci aestivi*. Longitudo 12" 5"', maxillae ad frontem 1 1/4", alae 5 3/4". Certe non *Brasiliae*, sed, ut videtur, *Indiae* sive *Novae-Guineae* incola!

*Observationes. Marcgravei* descriptio huius avis haec est: „*Tarabe* Brasiliensibus, psittacus est viridis, major quam *Paragua*, capite rubro et pectore atque initio alarum. Rostro et pedibus obscure cinereis.“ Descriptio et mensura ex *Marcgravei* icone, quam depictam cel. *Lichtenstein* mecum communicavit. In eadem alarum initium rubrum non observo. *Psittacus Fieldii* species admodum affinis an sane diversa? — *Psittacoidis Tarabe* forsitan ad genus diversum pertinet.

? Genus . . . . . Pag. 34.

1. *Ps. Fieldii*. Caput totum intense castaneo-rubrum, mento genisque paullo dilutioribus, paullo virentibus; notaeum totum eleganter

gramineum, pro vario ad lucem objectu aureo-flavo-, sive fusco-variis; gastraeum concolor, ad flavum nonnihil vergens; alae basi, prope pennas scapulares, macula parva rubicunda notatae; remiges intense virides intus obscure nigrae; tectrices alarum inferiores nitide coeruleae; rectrices supra virides, intus et subtus flavae.

*Psittacus Fieldii Swains.* Quarterly Journal of science, literature and the arts XIX. 1825. p. 199.

Quam *Ceram Lory* (?) validior; rostrum pro avis mole crassum et validum; maxillae culmen lineari-exaratum; mandibula longior quam alta, gonyde ascendente, apice lato et obtuso (ut in *Psittacis*), parte inferiore obsolete triangulari; cera tota nuda; narium apertura lata, rotundata; cauda modice longa, apice rotundata, rectricum apice ovato-acuminato; pedes breves, nigri. Habitat in *Nova-Hollandia Swainson*.

*A Psitt. Tarabe* perquam affini praesertim inopia fasciae rubrae in apice caudae pedibusque nigris differre videtur. Nec hanc avem vidi, nec *Psitt. Tarabe*, cujus cauda, ut in congeneribus, apicem aequalem habet.

#### XVI. Genus. *Psittacus*. Pag. 34.

α. Pilei plumis brevissimis, adpressis.

1. *Ps. Erithacus*. Frontis latera, capistrum ac tota facies nuda, subpapillosa, quasi albo-pulverulenta; plumae capitis, colli ac totius gastraei canescenti-ardesiaceae, omnium margo apicalis canescens; abdomen infimum, tibiae crissumque collo paullo dilutiora, plumarum margine lilacino-reflectente; dorsum supremum, pennae scapulares alaeque supra toto ardesiaca, plumarum margine vix obscuriore; cauda tota ejusque tectrices superiores puniceae; tergum uropygiumque perlaceo-canescencia, plumarum margine obscuriore, lilacino-reflectente; remiges omnes toto ardesiaco-nigrae; tectrices alarum inferiores pectori concolores. *Mas et Foem. adult.*

*Gesn. Ornith. I. p. 722. Psittacus cinereus Aldrov. 1. p. 676. Psittacus guineensis cinereus Briss. 4. p. 310. n. 49. Perroquet cendré de Guinée. Buff. Pl. enl. 311 (fig. mediocr.). Psittacus Erithacus Auctor.*

*Var. α.* Ptilosis plus minusve puniceo-variegata.

*Psittacus erythroleucus Aldrov. p. 677 et Auctor. The ashcolour'd and red Parrot Edw. 4. t. 163. Psittacus Erithacus var. β, γ, δ. Psittacus ruber Scop. Ann. 1. p. 52. Le Perroquet cendré tapiré Le Vaill. 1. c. t. 101.*

*Var. β.* Ptilosis tota cana, excepta cauda cum tectricibus superioribus punicea.

*Le Vaill. 1. c. t. 100.*

*Var. γ.* Ptilosis tota in nigrum vergens; cauda rubicundo-ardesiaca.

*Le Vaill. 1. c. t. 102. (Hanc varietatem raram in mus. Paris. vidi.)*

Rostrum nigrum mediocre, maxillae apice multum producto, sinuato; maxillae culmen apicem versus in dilute corneum vergens; irides flavo-albae; lora singulis pilis brevibus albidis obsita, pedes nigri albo-pulverulenti; ungues corneo-nigricantes; cauda brevis, apice recto-truncata; alae longae caudae apicem fere excedentes. Longitudo 14", rostri ad frontem fere 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>", caudae 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>", alae 9<sup>3</sup>/<sub>4</sub>", tarsi 9<sup>'''</sup>, digiti antici externi, excluso ungue, 1" 4<sup>'''</sup>. Habitat frequentissimus in *Africa occidentali*; ova parit, columbinis paullo minora, toto alba; avis egregie loquax varias modulatur gutture voces, scurrili strepitu, quicquid et audit, ait, cantat. (*Mus. Paris., Berol., Monac.*; multos vivos vidi.)

β. Pilei plumis latiusculis, laxioribus, nuchae compactis, squamoso-positis.

2. *Ps. festivus*. Tergi infimi uropygiique plumae coccineo-sanguineae, basi flavae; fascia frontis strictissima cum utroque apice ad oculum ducta ibique dilatata castaneo-purpurina; vitta supra oculos versus verticis et occipitis latera ducta et macula menti longitudinalis indistincte marginata, turcino-cyanea; capitis partes superiores omnes virides, pro vario ad lucem objectu nonnihil in coeruleum vergentes; alarum margo totus, tectrices superiores ac inferiores, collum, capitis partes reliquae ac totius trunci partes superiores et inferiores viridia; notaeum gastraeo obscurius; alulae pennae tectricisque alarum majores pone illas sitae, remiges primariae ac secundariae pogonio externo intense cyanae, hae apice et interno pogonio nigrae, pagina inferiore nigrae, limbo interno magna ex parte malachitaceo; rectrix extrema viridis, externo latere limbo dilute cyaneo, secunda tota viridis, rectrices reliquae, exceptis duabus intermediis toto viridibus, ejusdem coloris, versus basin flavam macula pallide coccinea notatae, omnes subtus malachitaceo-virescentes, tectrices superiores virides. *Mas et Foem. adult.*

*Le Perroquet Tahua de Caj. Buff. Pl. enl. 480 (fig. mala).*  
*Psittacus festivus Auctor. Perroquet Tavoua Le Vaill l. c. t. 129 (fig. opt.).*

*Var. α. Ptiloseos pars viridis rubro-maculata.*

*L'Amazone tapiré en rouge Le Vaill l. c. t. 89 (fig. opt.).*

*Var. β. Verticis plumae fuscescenti-marginatae.*

Rostrum pallide corneo-nigricans, culmine bianguloso, medio exarato, oculi iride aureo-flava (fide *Le Vaill.*), pedes plumbeo-nigri; unguibus nigris, cauda aequalis. Longitudo 15  $\frac{1}{4}$ " , caudae

4" 4"', alae 8", tarsi fere 8"', rostri ad frontem 1" 7"'. Habitat in *Guiana*, satis frequens in *Brasilia* versus flumen Amazonum, ac, ut dicitur, in *Cajenna*; docilis. (*Mus. Paris.*, *Berol.*, *Monac.*)

3. *Ps. poecilorhynchus*. Rostrum corneo-nigricans, macula in maxillae basi testaceo-rubicunda magna notatum; mandibula circa basin rufescenti-flavida; macula sincipitis majuscula lutea; alarum flexura coccinea; capitis partes superiores reliquae, laterales, colli antici et lateralis ac totum gastraeum viridia, in malachitaceo-viride vergentia; tectrices alarum superiores, remiges ultimae extus, pennae scapulares, collum posticum, dorsum, tergum et uropygium saturate viridia; alulae pennae ejusdem coloris, intus versus basin nigrae; remiges extus intense cyanaeae, intus nigrae, penultima extus a basi ultra medium virides, dein cyanaeae, intus nigrae, omnes subtus latere externo nigrae, interno malachitaceae; tectrices alarum inferiores ac caudae superiores virescentes; rectrices extus a basi ultra medium virides, dein virescenti-flavae, intus luteae, medio macula rotunda obscure viridi, versus basin altera oblonga coccinea notatae; rectrices quatuor intermediae absque rubore, a basi ultra medium virides, dein viridi-flavae. *Mas et Foem. adult.*

*Psittacus viridis*, alarum costa superne rubente. *Aldrov.* I. p. 669. *Id. Psittacus poecilorhynchus*. p. 670., *Shaw Gen. Zool.* 8. p. 491. *Psittacus amazonicus poecilorhynchus* *Briss.* 4. p. 270. *Psittacus ochrocephalus* var.  $\gamma$ . *Gmel.* *Psittacus amazonicus* var.  $\gamma$ . *Lath.* — *Psittacus flavifrons* *Herm.* *Observ. Zool.* p. 126.

*Avis junior*. Viredo minus pura; tectrices alarum superiores majores ac remiges penultima flavido-marginatae (praesertim latere interno); sincipitis macula minus extensa; flexura alae parum aut vix coccinea.

Rostrum mediocre, culminis biangulosi medio subcanaliculatum;

lingua nigricans; regio ophthalmica (quam in *Ps. pulverulento* minus large nuda) nudiuscula, alba; iris circulis tribus, quorum primus igneo-isabellinus, secundus flavus, tertius, pupillam ambiens, pallide olivaceus; pedes albido-plumbei, unguibus cinereo-nigricantibus. *Psittaco ochrocephalo* paullo major, ejusdem habitu. Cauda medio-cris, aequalis. Longitudo fere 13", caudae 4½", rostri ad frontem 19", tarsi 10". Habitat in *Brasilia* versus flumen Amazonum. (*Mus. Paris.*, *Monac.*; tres vivos vidi.)

*Observatio.* Haec species distinctissima facile distinguitur a simili varietate *Psittaci pulverulenti* humeris coccineis, rostri minoris rectricumque pictura, statura minore caet.

4. *Ps. pulverulentus.* Cauda absque rubedine; rectrices duae intermediae toto virides, caeterae a basi ad medium virides, reliqua parte, praesertim interna, flavidae, pro vario ad lucem objectu viridi-reflectentes, omnes subtus ejusdem coloris; plumae colli postici longiusculae, ac totius capitis superioris latiusculae, rectiusculo-truncatae, apice nigricanti-limbatae; carpi plumae obsolete coccineae; limbus plumarum in capite in coeruleum vergens; plumae humeri ac flexurae alae, dorsi, tergi, uropygii, pennae scapulares alarumque tectrices superiores virides, quasi albo-pulverulentae; capitis ac colli totius ptilosis reliqua, nec non totius gastraei alarumque tectrices inferiores ejusdem picturae, paullo minus pulverulenta; alulae pennae tectricesque pone has sitae virides, pogonio interno versus basin nigrae; remix prima supra toto nigra; remiges sequentes octo intus nigrae, extus a basi ultra medium virides, reliqua parte cyanaeae, sequentes 3 extus basi virides, dein ultra medium roseo-coccineae, tum paullo viridi-tinctae, reliqua parte cyanaeae, intus nigrae; remiges reliquae ejusdem picturae, absque rubedine, omnes subtus pogonio interno maxima parte malachitaceo-virides; rostrum nigrum, maxilla basi macula flavida, mandibula tali flavido-nigricante notatae. *Mas et Foem. adult.*

*Le Perroquet Meunier de Caj. Buff. Pl. enl. 861 (fig. satis accurat.).*

*Var. α. (Avis domefacta.)* Ptiloseos pictura ordinaria, excepta sincipitis macula magna, aureo-flava.

*Psittacus pulverulentus Auctor., Kuhl. L' Amazone, femelle. Le Vaill. l. c. t. 85 (fig. opt. falso pro foemina Ps. ochrocephali indicata). Jd. Perroquet Meunier. t. 92 (fig. opt.).*

*Var. β. (Avis domef.)* Sinciput macula flava, coccineo-variegata notatum.

*Spix Av. Brasil. 1. p. 43.*

Habitus *Ps. ochrocephali*, eodem multo robustior; rostrum culmine biangulosum, robustum; regio ophthalmica largiuscule nuda ac cera alba; irides circulis duobus, primo angustissimo, croceo, altero lato, fusco; pedes albi, unguibus nigris; cauda subaequalis, mediocris. Longitudo 15 1/2", rostri ad frontem 1 3/4", alae 9 1/2", caudae 5 1/2", tarsi 9". Habitat in *Cajenna* et in *Brasilia*, versus flumen Amazonum; docilis. (*Mus. Paris., Berol., Monac.*; multos vivos vidi.)

*Observatio.* Species sequens similis differt constanter statura minore, rostro minus valido, alio modo colorato, et oculorum pictura.

5. *Ps. xanthops.* Rostrum totum album, subincarnatum, validum; frons, vertex, capitis latera ac tibiae ranunculaceo-flava; alarum flexura coccinea, margo intimus flavidus; remiges mediae basi coccineae, reliqua parte nec non primariae virides, exclusa omnium parte apicali cyanea; rectrices supra laete virides, apice lato flavido-virescente, omnes, exceptis intermediis, intus magna ex parte rubrae, interstitio viridi; extimae latere externo paullo coerulescentes; genarum pars inferior, collum ac reliquae trunci et

alarum partes viridia, plumae notae paullo nigricanti-marginatae; pedes et ungues albidi. *Mas et Foem. adult.*

*L'Amazone à tête jaune Le Vaill. l. c. t. 86 (fig. accurat., exceptis tibiis viridibus).*

*Var. α.* Caput, gula humerique toto ranunculaceo-flava; frons cinereo-alba; humerorum gulaeque plumae basi rubrae; rostrum pedesque alba. 13" l.

*Psittacus amazonicus gutture luteo Briss. 4. p. 287. Psittacus ochropterus Auctor. Le Perroquet à épaulettes jaunes, mâle. Le Vaill. l. c. t. 98 (bis.). Psittacus poecilorhynchus Shaw.*

*Var. β.* Simillimus praecedenti, pileo toto flavo.

*Le Vaill. l. c. t. 98.*

Magnitudo fere et habitus *Psittaci pulverulenti*; regio ophthalmica nudiuscula ac cera albae; oculorum iris circulis tribus, primo croceo, secundo flavo, tertio, pupillam ambiente, pallide olivaceo, sub-obsolete; lingua alba. Habitat in *America meridionali.* (*Mus. Berol.*; quatuor vivos vidi.)

*Observatio.* Species distinctissima, praeter capitis tiliarumque picturam a *Psittaco ochrocephalo* non solum corpore majori, sed rostro quoque validiori, albo et linguae colore prorsus diversa. An varietates, a me non visae, distinctae species?

6. *Ps. ochrocephalus.* Frons ac sinciput ex parte turcino-coerulescentia; verticis pars, regio tota rostrum inter et oculos ac infra hos, gulaeque latera laete flavo-ochracea; *rectrix prima extus basi viridis, medio pallide cyanea, reliqua parte flavida, nonnihil coeruleo-reflectens, intus basi flava, dein macula roseo-*



*coccinea, altera macula subsequente connata viridi minore notata, reliqua parte virescenti-flava; rectrices sequentes concolores „pogonio externo sine nitore cyaneo“; macula rubra, versus rectrices intermedias sensim minore, alterius pogonii marginem quoque juxta fascia attingente; rectrices quatuor intermediae virides, laterales large flavido-, duae intermediae vix flavido-limbatae; humerorum ac flexurae margo coccineo-ruber; margo ac tectrices alarum inferiores incluso carpi margine virescentes, tibiae interno latere, extus basi ochraceo-flavae; plumae capitis, supremi reliquae, colli postici, lateralis ac dorsi supremi limbo apice nigro-limbatae; pennae scapulares, caudae et alarum tectrices superiores omnes, tergum, uropygium remigesque ultimae intense viridia; crissum ac reliquae corporis partes inferiores virides, flavido-reflectentes, margo apicalis plumarum laterum rectisculo-truncatarum nigricans, subobsoletus; *remix prima* nigra, limbo externo cyaneo-relucente; remiges 2—10 extus a basi ad pogonii subsinuati medium virides, reliqua parte coeruleae, intus toto nigrae, 10—15 extus basi infima virides, dein ultra medium coccineo-sanguineae, reliqua parte cyanae, intus nigrae; 15 macula obsoleta rubra notata; reliquae extus fere toto virides, apice nonnihil cyaneo-reflectentes, limbo interno nigricante; omnes subtus maxima ex parte in limbo interno malachitaceae; tectrices inferiores majores ejusdem coloris; alulae pennae tectricesque pone has sitae virides; rostrum toto nigrum. *Mas adult.**

*Psittacus viridis melanorhynchus* Aldrov. 1. p. 672. *Psittacus amazonicus jamaicensis* Briss. Av. 4. p. 276. (*Psitt. aestiv. var. γ. Gmel., Lath.*) — *Aiuru-curau* Marcgr. Hist. rer. nat. Brasil. lib. IX. p. 205 (*Lichtenst. l. c. p. 166.*) *Psittacus barbadensis* Gmel., Lath. (*descriptio ex Albini icone pessima*). *Psittacus decorus* Herm. Observ. Zool. p. 126. *Psittacus amazonicus* Kuhl l. c. p. 74. *L'Amazone mâle* Le Vaill. l. c. p. 23. t. 84. (*fig. opt.*). *Id. L'Amazone à calotte bleue* t. 87 (*fig.*

opt.). *Le Perroquet à tête jaune Azar. Voy. n. 285. Psitt. aestiv. cum var. 1. Spix Av. Bras. p. 44.*

*Foemina.* Mari simillima, capitis flavedine solum minus extensa.

*Juvenis.* Avi adultae similis minus laete viridis, plumarum margine parum aut vix conspicuo; caput tibiaeque viridia, absque flavedine aut hic et illic plumula flava variegata; frons ac sinciput turcino-coerulescentia; humeri virides, plumulis rubris singulis varii; reliqua alae rectricumque pictura adulti, rostrum plumbeo-nigricans fuscescenti-nubilatum. (Abdominis plumae interdum basi subtilissime vinaceo-lavatae).

*Perroquet vert et rouge de Cajenne Buff. Pl. enl. 312 (fig., excepto rostro rubro, satis accurata, a nemine recte dijudicata). Psitt. ochroceph. var. β. Gmel. Psitt. amaz. var. β. Lath. Psitt. aestivus var. 4. Spix Av. Bras. p. 44.*

*Var. α.* Ptilosis viridis, plus minusve flavo-variegata; humeri rubri; frons turcino-coerulescens.

*Edw. t. 162. Psitt. amazon. varius Briss. l. c. p. 281. n. 37. t. 26. fig. 2. Perroquet Amazone varié du Bresil Buff. Pl. enl. 120. L'Amazone tapirè en jaune Le Vaill. l. c. t. 89 (fig. opt.).*

*Var. β.* Ptilosis tota flava, exceptis humeris remigumque pognio interno versus basin coccineis.

*Perroquet jaune Buff. Pl. enl. 13. Psitt. Aurora Auctor.*

*Var. γ.* Ptilosis ordinaria, pro vario ad lucem objectu in aureo-flavum vergens.

*Azar l. c. p. 74.*

*Var. δ.* Rostrum ac cera, os, lingua, pedes remigesque alba,

harum intermediae et omnes rectrices rubro-flavoque maculatae; alarum tectrices, dorsum supremum ac pennae scapulares albo-flavae; tectrices inferiores laete flavae; ptilosis reliqua straminea; oculorum iris aurantia, pupilla annulo viridi cincta. *Azar* l. c.

*Var. e.* Ptiloseos pictura ordinaria; sincipite albo. (*Descriptio haec mea e specimine vivo senili.*)

*Aiuru curau*, secunda species. *Marcgr.* l. c. p. 205.

Rostrum culmine subbiangulosum; cera subsetulosa nigricans; regio ophthalmica parum nuda, albida; oculorum iris circulis tribus, primo croceo, sequente flavo, tertio, pupillam cingente pallide olivaceo, subobsoleto; pedes albidi; ungues plumbeo-nigricantes; cauda fere aequalis; mediocris. Longitudo  $14\frac{1}{4}$ " , caudae  $5\frac{1}{4}$ " , alae 9" , maxillae 10" , tarsi 9" . Habitat congenerum vulgatissimus in *Suriname*, *Guiana*, *Brasilia* et *Paraguay* usque ad flumen *la Plata*, gregarius, perquam clamosus, vespere in sylvas rediens, plantationibus citrorum infestissimus, ova tria alba pariens; specierum fere omnium docillima, quam ob rem in Europam tam frequenter allata. Iridis circulos prolubitu dilatare tali modo valet, ut circulus secundus flavus primo externo croceo prorsus obtegatur. (*Mus. Paris.*, *Berol.* et *Monac.* habent specimina fera).

*Observationes.* Species haec domefacta variat miro modo, sed fere omnes varietates prope suffraginem aut in tota tibia flavae, in humeris siye in carpo plus minusve coccineae sunt. Frontis plumulis rigidiusculis, rectricum pictura, tibiis viridibus, rostro toto nigro species haec a praecedente, humeris coccineis, rostri ac oculorum pictura a sequente distingui potest. *Marcgravei Aiuru-apara* est varietas *Psittaci ochrocephali* (*Lichtenst.* l. c. p. 168). — Varietates 2, 3 a cel. *Spix* l. c. indicatae spectant ad juniorem *Psittacum amazonicum*.

7. *Ps. amazonicus*. *Rectrices* quatuor laterales extus medio virides, basi et apice flavicantes, *intus flavae*, *macula intermedia maxima pallide coccinea*, *in medio macula altera transversa viridi*, *versus rectrices intermedias sensim latiore, dissecta*; *rectrix quinta et sexta extus a basi ad medium virides, dein flavidae*; *intus basi et apice flavae, medio virides*; *rectrix subsequens macula pallide rosea notata*; *rectrices reliquae a basi subflavescente ultra medium virides, reliqua parte flavidae, subtus pallidiores*; *regio prope oris angulum, genarum pars anterior mentique latera ochraceo-lutea*; *frontis plumae ac sincipitis, nec non vittae supra et ultra oculos ductae laete amethystino-coerulescentes, basi flavae*; *plumae occipitis, colli totius postici et lateralis dilatatae limpo apicali subnigricante notatae, dorsi, tergi, uropygii ac totius corporis inferioris, crissi ac tiliarum, pennae scapulares, humerorum margo et flexura alae, tectrices alarum superiores ac inferiores laete viridia*; *corporis partes inferiores non in flavidum vergentes*; *carpi margo non-nihil aurantio-rubicundus*; *remix prima supra toto nigra, subtus limbo interno subbasali malachitacea*; *remiges 2, 3, 4. supra latere externo a basi ad medium subcyaneum pogonii subsinuati virides, intus et reliqua parte nigrae absque pictura coerulea*; *5, 6, 7, 8 extus a basi ad medium virides, dein intense coeruleae, intus nigrae*; *9, 10, 11 et 12 extus basi paullo virescentes, dein ultra medium laete testaceo-sanguineae, reliqua parte intense coeruleae, intus nigrae (duodecima macula rubra obsoleta insignis)*; *reliquae ejusdem picturae absque rubore, omnes subtus magna parte pogonii interni malachitaceae. Mas et Foem. adult.*

*Acuru-curuca* *Marcgr.* Hist. rer. natur. Brasil. lib. IX. p. 205. *Lichtenstein* l. c. p. 166. *Psittacus amazonicus* *Briss.* Av. 4. p. 256 (*descript. opt.*). *Le Perroquet Amazone* *Buff.* Pl. enl. 547 (*fig. admod. mediocr.*) *Id. Perroquet Crique de Caj.* (*fig. mediocr. ab auctoribus ad Psitt. agil. falso relata.*) *Femelle du*

*Perroquet Acourou Couracou Le Vaill.* l. c. t. 110 bis (fig. bona).  
*Psittacus Aourou Shaw.* Gen. Zool. *Psittacus aestivus Kuhl*  
 (synonymiae expositio non satis accurat.). *Psittacus amazonicus*  
*Spix*, Av. Brasil. p. 45.

*Av. junior.* Avi adultae simillima, verticis plumae flavae magis  
 extensae, coeruleae potius supra et ultra oculos ductae.

*Psittacus amazonicus fronte lutea Briss.* Av. 4. p. 261. n.  
 32 (descript. opt.). *Psittacus amazonicus, Gmel., Psittacus*  
*aestivus* var. 2. *Lath.* — *Le Perroquet Acourou Couracou Le*  
*Vaill.* l. c. t. 110 (fig. bona). *Psitt. aestiv.* var. 2, 3. *Spix* Av.  
 Bras. p. 44.

*Pullus.* Frons, sinciput ac vertex, regio ante et pone oculos,  
 genae ac regio parotica toto flava; plumae occipitis, colli ac to-  
 tius corporis inferioris flavido-virescentes, limbo apicali latiusculo  
 obscurius viridi; *remiges omnes* extus malachitaceo-virides, in-  
 tus nigrae, versus apicem fusciscenti-albido-marginatum virescen-  
 tes, subtus maxima parte malachitaceae; alarum margo viridis, paullo  
 flavido-lavatus; tectrices alarum superiores ac inferiores omnes, pen-  
 nae scapulares, remiges ultimae margine flavo-terminatae; dorsum,  
 tergum, uropygium caudaeque tectrices superiores intense viridia, hae  
 in flavidum vergentes; rectrices duae intermediae virides, basi flavae,  
 reliquae virescenti-flavae, macula subbasali magna pallide sanguineo-  
 rubra notatae, pogonio externo versus basin virescenti-lavatae; man-  
 dibula cum cera albida, maxilla in utroque baseos latere citrino-flava,  
 apice albida, reliqua parte corneo-nigricans; irides aurantiae.

*Psitt. luteus Gmel.* 114. *Psittac. luteolus Lath.* *Psitt. xan-*  
*thops Spix* Av. Bras. l. c. t. 26 (fig. accur.).

*Rostrum basi citrino-flavum*, versus apicem corneo-albescens  
 aut fusciscentis, quam in *Ps. ochroceph.* minus validum; regio oph-

thalmica et cera albae, oculorum iris circulis duobus, primo croceocinnabarino angusto, altero, pupillam ambiente, fusco lato; lingua supra nigricans; pedes robusti plumbeo-albidi, unguibus corneofuscescentibus; cauda mediocris, subaequalis. Longitudo 12" 8"', alae 7 $\frac{1}{4}$ "', caudae 4" 1"', tarsi 6 $\frac{1}{2}$ "'. Habitat in *Guiana*, satis frequens in *Brasilia*, praesertim versus flumen Amazonum, gregarius juxta ripas et ostia fluviorum in fruticibus *Rhizophorae Mangle* degens, in truncis cavis harum arborum nidificans; citrorum plantationibus infestus, docilis; Brasiliensibus *Curica*; nuchae plumas saepius in altum erigit.

*Observationes.* Ad hanc speciem spectat pars synonymiae *Psittaci aestivi*, *Ps. amazonici* et *Ps. ochrocephali* auctorum. Hae auctorum aves ob earum synonymiam perturbatam vix solubilem ex systemate prorsus rejiciendae. *Brissonii* descriptiones optimae solummodo citandae, reliquorum auctorum, e speciminibus domefactis, colore mire variantibus, hanc ob rem fugiendae sunt.

*Psittacus agilis* a cel. *Kuhl.* in synonymiam *Psittaci amazonici* receptus differt ab hoc toto coelo, sed tabula *Buffoniana* huc pertinet. — *Marcgravi* *Acuru-curuca* varietatibus hujus avis adnumerandus est.

8. *Ps. hypochondriacus.* Viridis; abdominis fascia lata, ranunculaceo-flava in utroque latere macula sanguineo-rubra terminata, caput brachiique margo lutea; rectrices duae intermediae toto virides, reliquae virescenti-flavae, macula ante medium rubra notatae; remiges nigrae, extus virides; rostrum citrino-flavum, culmine maxillae ad latera nigrescente.

*Psittacus hypochondriacus Lichtenst.* in Mus. Berol.

Regio ophthalmica nudiuscula; cauda recto-truncata; pedes flavidi, unguibus flavis. Habitus et magnitudo *Psittaci ochrocephali*.

Longitudo 12", caudae 3 1/2", alae 7" 8", rostri ad frontem 1 1/2", tarsi 6". Habitat in *Brasilia*. (*Mus. Berol.*).

9. *Ps. autumnalis*. Vitta ex oris angulo infra oculos et aures ducta aureo-flava, prope orem paullo rubro-irrorata; macula in loris et altera in fronte magna coccinea; stria supra oculos stricta flavo-rubroque variolosa; plumae sincipitis, verticis occipitisque turcino-coerulescentes, basi virescentes; plumae colli postici elongatae, latae, recto-truncatae, virides, fasciola apicali amethystina nigricanti-terminata notatae; genae, gastraeum totum, alarum margo totus ac tectrices inferiores omnes laete viridia; carpi margo flavescens; caudae alarumque tectrices superiores omnes, pennae scapulares ac reliquae partes notaei virides; alulae pennae virides, apice paullo cyanaeae; remix prima supra toto nigra; remiges sequentes 6 extus a basi ad medium cyaneum virides, reliqua parte nigrae; sequentes quatuor extus basi virides, dein ultra medium sanguineo-rubrae, in hoc virides, reliqua parte cyanaeae, intus nigrae; penultima extus virides, apice toto cyanaeae, intus nigricantes, omnes latere inferiore fere a medio ad apicem nigrae, reliqua parte malachitaceae; rectrices supra a basi ultra medium virides, reliqua parte dilute virescenti-flavae; extimae intus juxta rhacheos basin paullo rubro-lavatae. *Adult.*

*The lesser green Parrot* *Edw.* 4. t. 164 (*fig. sat. accurat.*). *Psittacus autumnalis* *Linn., Gmel., Lath. (exclusis varietat.)*, *Kuhl. Le Perroquet à joues oranges* *Le Vaill.* 1. c t. 111 (*an mutuata tabula Edwardsiana?*). *Psittacus aurantius Vieill.* N. D.

*Av. junior.* Avi adultae similis; verticis plumae minus coerulescentes, versus basin flavido-virescentes, colli postici virides breviores, hic et illic plumis intermixtis flavis.

*Psittacus Diadema* *Spix.* *Av. Brasil.* 1. t. 32.

Regio ophthalmica nudiuscula alba; irides laete flavo-aurantiae; pedes unguesque obscuri; rostrum luteum, circa tomia obscurum. Habitus et magnitudo *Psittaci vinacei*, ei subsimilis. Longitudo  $14\frac{3}{4}$ " , alae  $8'' 1'''$ , caudae aequalis  $4\frac{3}{4}$ " , rostri ad frontem  $1\frac{3}{4}$ " , tarsi fere  $9'''$ . Habitat in *Brasilia* et *Mexico*. (*Mus. Berol., Monac.*)

*Observationes.* *Spixii* icon et descriptio e specimine domo-facto mutilo. Auctorum varietas  $\beta$ . spectat speciem distinctam, *Psittacum Bouqueti*, *Lathamii* varietas  $\delta$ . *Psittacum brasiliensem*; var.  $\gamma$  (var.  $\delta$ . *Gmelini*) vix determinari potest.

10. *Ps. brasiliensis*. Frons ac capistrum coccinea; aurium macula magna supra genas ducta subrotunda coerulea; vertex viridiflavus; occiput et nucha saturate viridia; gastraeum a margine inferiore menti rubri ad crissi subflavidi finem viride, nonnihil ad flavidum inclinans; alarum flexura flava; carpi margo ruber; remiges primae obscurae, sequentes pogonio externo coeruleae, ultimae virides, extus flavo-limbatae; tectrices alarum superiores mediae et magnae saturate virides, flavo-marginatae, parvae pallidius virides; plumae colli postici ac dorsi supremi virides, obscure purpurino-limbatae; dorsi, uropygii, caudae tectrices superiores ac pennae scapulares virides; rectrix extima pogonio externo coerulea, sequens coccinea; rectrices duae intermediae virides, reliquae interno pogonio coccineae, externo virides, omnes fascia flava terminatae.

*The brasilian green Parrot* Edw. Av. 4. t. 161. *Psittacus brasiliensis* Linn., Gmel. *Psittacus autumnalis*, var.  $\delta$ . *Lath.* *Le Perroquet à joues bleues* Le Vaill. l. c. p. 57. t. 106. *Psittacus cyanotis* Kuhl l. c. n. 133.

Habitus et magnitudo *Psittaci Dufresneani*; rostrum dente subobsoleto munitum, incarnatum; cera obscura; regio ophthalmica nudiuscula dilute cinerea; irides intense fusco-atrae; cauda subaequa-



lis, pedes fuscescenti-cinerei. Habitat in *Brasilia* versus *Peru* (*Edwards*). Non vidi.

11. *Ps. Bouqueti*. Rostrum corneo-cinereum; maxilla in medio macula oblonga isabellino-aurantia notata; frons, mentum, facies ac regio circa oculum violaceo-coerulea; gula collumque supremum in medio coccinea, rubedine in acumen terminata; remiges primariae anteriores toto coeruleae; mediae concolores, attamen a basi ad medium coccineae; ultimae, occiput ac totum notaeum nec non alarum margo viridia; collum laterale anticum ac reliquae trunci partes inferiores viridia, dorso pallidiora; tectrices alarum inferiores flavido-virides; rectrices supra virides, fascia lata flavescente terminatae, subtus virescenti-flavidae, laterales pogonio interno versus basin paullo coccineae. *Av. adult.*

*The blue-faced green Parrot Edw. Av. 1. t. 230 (fig. bona). Psittacus autumnalis var. β. Gmel., Lath. Le Perroquet Bouquet Le Vaill. l. c. t. 104. t. 135 (fig. bona). Psittacus Bouqueti Bechstein in Lath. Uebers. d. Vög. p. 99. n. 167. Kuhl l. c. Psittacus coerulifrons Shaw. Gen. Zool. 3. p. 515. Psittacus cyaneocapillus Vieill. Encycl. meth. Livr. 95. p. 137. 3.*

Regio ophthalmica nudiuscula pallide incarnata; irides laete aurantiae; cauda aequalis. Habitus et magnitudo *Psittaci autumnalis*. Habitat in *Brasilia*: (Vivum vidi in *Portu Gratiae*.)

12. *Ps. erythrurus*. Viridis; plumae dorsi ac corporis inferioris basi flavae, margine nigrae; cauda alarumque margo internus coccinea, illa apice fascia flava notata; sinciput et regio inter rostrum et oculum rubro-purpurea; facies ac gula coerulea, plumarum basi rubra; occipitis plumae coeruleo-marginatae.

*Psittacus erythrurus Kuhl. l. c. p. 77. n. 134.*

Magnitudo et habitus *Psittaci autumnalis*. Habitat in *Brasilia*.  
(*Mus. Paris.*, fide *Huhl.*) Non vidi.

13. *Ps. Dufresneanus*. Rostrum coccineum apice albidum; frons, sinciput verticisque pars anterior coccinea; regio inter oris angulum et oculum aureo-flava, paullo rubro-variegata; genae et gula coeruleae, plumularum limbo in turcinum vergente; regio parotica viridis; capitis plumae reliquae, colli postici, dorsi supremi et pennae scapulares intense virides, margine apicali nigricante; gastraeum a gulae parte infima ad crissi finem viride, ventris abdominisque plumis basi pallide cineraceo-rubicundis; rectrices supra a basi ad medium virides, ibi macula magna sanguineo-rubicunda (in prima rectrice solum interno latere conspicua) et interno pogonio versus basin altera concolore, pallidiore, minore notatae, omnes flavido-terminatae, subtus ejusdem picturae, sed pallidioris; tergum, uropygium, caudae alarumque tectrices superiores ac inferiores nec non remiges ultimae virides; alarum margo viridis, eo carpi paullo obscurior; remix prima tota nigra; remiges sequentes octo extus virides, apice cyanaeae, intus nigrae; sequentes tres extus basi virides, medio macula magna coccinea notatae, dein virides, apice cyanaeae, intus nigrae; sequentes ejusdem picturae absque rubedine. *Mas* et *Foem. adult.*

*Psittacus Dufresneanus Huhl* l. c. p. 78. n. 136 (*descript. opt.*).

*Avis junior.* Avi adultae similis; frons aurantio-rubra, sinciput magis aurantium; genae, gula ac colli supremi latera dilutius coerulea; alarum speculum rubrum, in aurantium vergens; maxilla flavo-fusca, versus basin rubicunda, mandibula fuscescens.

*Le Perroquet Dufresne Le Vaill.* l. c. p. 34. t. 91 (*fig. accur.*). *Psittacus Dufresneanus Shaw.* Gen. Zool.

Regio ophthalmica parum nuda; irides eleganter aurantiae; pedes

flavido-nigricantes, unguibus nigricantibus; cauda aequalis. Habitus *Psittaci ochrocephali*, hoc paullo robustior. Longitudo  $14\frac{3}{4}$ " , rostri ad frontem  $1''\ 7'''$  , alae  $8''\ 5'''$  , caudae  $4''\ 5'''$  , tarsi  $5'''$  . — Habitat in *Cajenna* et *Brasilia*. (*Mus. Paris.*, *Berol.*, *Monac.*)

14. *Ps. vinaceus*. Rostrum parvum coccineum, apice albidum; macula ante oculos attenuata, supra frontis marginem ducta, coccinea; plumae colli postici elongatae, latissimae, recto-truncatae, virides, ante apicem fasciola nigra terminatum pallide sed laete cano-cyanae, colli totius antici pectorisque supremi longiusculae, latiusculae, recto-truncatae, vinaceae, limbo laterali subvirescente, apicali subconspicuo, strictissimo, nigricante; plumae in capitis partibus reliquis ad gulae latera rectiusculo-truncatae, dorsi supremi et pennae scapulares intense virides, apice nigro-limbatae; tergum, uropygium, caudae alarumque tectrices superiores ac inferiores omnes, flexura alae ac remiges ultimae intense virides; margo antibrachii aurantio-flavus, rubro-variegatus; remiges intus toto nigrae, subtus malachitaceae, primariae extus basi virides, reliqua parte coeruleae, 5, 6, 7 et 8 extus virides, 9, 10 et 11 extus virides, macula in medio pogonii magna coccinea, in undecima in flavidum vergente notatae; rectrices virides, apice flavidae, tres extimae macula in basi magna coccinea signatae, intus largissime aureo-flavo-limbatae; pictura eadem in latere inferiore tectricum pallidior; tibiae, abdomen infimum crissumque flavido-viridia; plumae reliquae partis gastraei plumis pectoris concolores, sed basi solum vinaceae. *Mas et Foem. adult.*

*Le Perroquet à cou rouge Azar. Voy. n. 286 (Psittacus Tarabe Kuhl l. c. p. 321). Psittacus vinaceus Wied Reise nach Brasil. 2. S. 198., Kuhl Consp. Psitt. (descript. opt.). Psittacus columbinus Spix Av. Brasil. 1. t. 27 (fig. bona).*

Regio ophthalmica parum nuda alba; mandibulae pagina antica lata, lateraliter angulosa; maxillae culmen biangulosum; irides auran-

tiae; pedes cinerei, unguibus corneo-nigricantibus; cauda mediocris, aequalis. Habitus, vitae ratio et vox *Psitt. ochrocephali*. Longitudo 12 1/2", caudae 4" 11"', alae 7" 11"', tarsi 7"', rostri ad frontem 13"'. — Habitat gregarius in *Brasilia* ac in *Paraguay* locis desertis, vesperi gregatim cum clamore sylvas petens. (*Mus. Paris., Monac.*; vivum vidi).

15. *Ps. havanensis*. Crissum viridi-luteum; capitis pars anterior et collum inferius cinereo-coerulea, ad violaceum vergentia; reliquae capitis plumae, cervicis, dorsi totius ac uropygii virides, nec non pennae scapulares virides, nigricanti-marginatae; caudae tectrices superiores viridi-flavicantes; plumae pectoris ventrisque virides, coerulescenti-, laterum nigro-marginatae; alarum tectrices superiores minores et inferiores remigesque ultimae virides; remix prima nigra; remiges novem sequentes extus a basi ad medium saturate virides, dein intense violaceae, apice et interno latere nigrae; tres sequentes a basi ad medium rubrae, dein intense virides, apice et interno pogonio nigrae; remix sequens extus basi rubra, dehinc viridis, tandem saturate violaceo- et nigro-terminata; remiges reliquae intus nigrae, extus virides, apice saturate violaceae, omnes subtus viridi-coeruleae; rectrices duae intermediae virides; viridi-luteo-terminatae, proximae extus virides, viridi-luteo-terminatae, intus basi nigricantes, dein virides, reliqua parte viridi-luteae; rectrix quarta et quinta extus praecedentibus pictura similis, intus basi rubrae, dehinc virides, apice viridi-luteae; extimae duae praecedentibus similes, lateris superioris viredine paullo in coeruleum vergente.

*Psittacus amazonicus gutture coeruleo* *Briss. Av.* 4. p. 266. t. 25. f. 1 (*descript. compl.*). *Perroquet de la Havane Buff.* Pl. enl. 360. *Psittacus havanensis* *Auctor. Le Perroquet à face bleue Le Vaill.* l. c. t. 122. *Psittacus cyanopsis* *Vieill.* N. D.

Rostrum albidum, apice nigricans; pedes grisei unguibus nigris, regio ophthalmica nudiuscula et cera dilute cinerea. Habitus *Psittaci vinacei*, ei subsimilis. Longitudo 15", rostri ad oris angulum 15"', caudae 5 $\frac{1}{4}$ ", tarsi 10'''. Habitat in *America* (*Briss.*). Non vidi.

*Observatio.* An *Huhl*i *Psittacus havanensis* p. 79. n. 138 sane eadem, adulta avis?

16. *Ps. agilis*. Viridis, gastraeum nonnihil in flavidum vergens; remigum pogonium externum coeruleum, internum nigrum; harum ultimae supra virides; pteromata coccinea; tectrices alarum inferiores ac superiores virides; rectrices duae intermediae toto, reliquae extus virides, exceptis duabus extimis pogonio externo coerulescentibus; laterales intus a basi ultra medium coccineae, reliqua parte virides.

*The little green Parrot* *Edw.* 4. t. 168 (*descriptio optima; fig. a cel. Kuhl* falso ad *Psit. amazonicum* relata). *Psittacus agilis* *Gmel.*, *Lath.*, *Vieill.*, *Shaw.* (*exclusa citata tabula Buffoniana, Psit. amaz. spectante*). *Le petit Perroquet vert* *Le Vaill.* l. c. p. 55. t. 105. *Psittacus virescens* *Bechst.* in *Lath.* Uebers. der Vög. S. 99. n. 169 (*sed non Lath. et Gmel.*). *Psittacus signatus* *Shaw.* Gen. Zool. 8. p. 510, *Huhl* l. c. p. 71. n. 123. *Psittacus minor* *Vieill.* N. D. 25. p. 314. *Id.* Encycl. meth. Livr. 93. p. 1367.

Rostrum validiusculum dilute cinereum, apice paullo obscurius, versus basin albidum; regio ophthalmica largiuscula nuda et cera cinerascenti-albae; oculi iride obscure avellanea; pedes cinerei; cauda mediocris apice rotundata. *Piono menstruo* parum major. Habitus *Ps. amazonici*. Habitat in *America meridionali*; avis agillima, clamosa (*Edw.*). Non vidi.

17. *Ps. dominicensis*. Rostrum album, maxillae basi pallide

citrino-flavidum; macula in utroque frontis latere coccinea, in fronte angustata; capitis pars reliqua, cauda, alae ac tota corporis ptilosis intense herbaceo-virides, pro vario ad lucem objectu in smaragdinum vergentes; remiges primariae extus, secundariae fere toto turcino-coeruleae; illae intus nigrae, omnes subtus malachitaceae, versus rhachin et in apice nigrae; crissi plumae flavescenti-virides, totius colli, pectoris, epigastrii, ventris, dorsi et pennae scapulares latae, rectiusculo-truncatae, margine apicali nigro, in plumis colli postici praesertim conspicuo; rectrices supra et subtus virides, extimae extus paullo turcino-lavatae, intus flavidae et juxta rhacheos basin macula parva, oblonga, rubra signatae. *Mas adult.*

*Perroquet de St. Domingue Buff.* Pl. enl. 792 (fig. satis accurat.). *Psittacus dominicensis Gmel.*, *Lath.* *La femelle du Perroquet à face rouge Le Vaill.* l. c. t. 108 (fig. opt.). *Psittacus leucocephalus foemina Kuhl* l. c.

*Foemina.* Mari similis, frontis macula minore.

*Avis hornot.* Avi adultae simillima, exclusa fronte sine rubore.

*Perroquet à face rouge dans son premier âge Le Vaill.* l. c. t. 108 (fig. opt.). *Psit. leucoceph. hornot. Kuhl* l. c.

*Var. α.* Ptilosis plumis intermixtis aurantio-flavis varia.

*Var. β.* Gulae pectorisque plumis basi rubicundis.

Habitus et magnitudo *Psit. leucocephali*; pedes albicantes, unguibus corneo-nigricantibus; oculorum iris angustiuscula, isabellina; regio ophthalmica largiuscule nuda, alba, subtilissime coeruleo-lavata; cauda aequalis, breviuscula; rostrum validum, laevissimum, subintumidum; lingua nigricans. Longitudo 11 1/2", rostri ad frontem 1" 5"', alae 6 3/4", caudae 3 1/2", tarsi 7'''. Habitat in *Dominicensi insula.* (*Mus. Paris.*, *Monac.* Specimina dua viva vidi Lutet. Parisiorum; tertium foemineum dissecavi ipse).

*Observationes.* Species haec distinctissima a cel. *Le Vaillant* primum, dein a cel. *Huhl* aliisque ornithologis recentioribus pro foemina *Ps. leucocephali* habita, differt ab hoc non solum ptiloseos pictura universali, sed oculorum quoque colore, macula regionis ophthalmicae nudae latiore, rostro multo validiori, cauda alisque multo brevioribus caet. Nec in *Ps. leucocephalo*, nec in hac specie irides rubicundae sunt, ut habet cel. *Le Vaillant*, sed in primo intense fusco-atrae, in altero isabellinae.

18. *Ps. leucocephalus*. Frons cum parte sincipitis pure alba; genarum pars anterior, mentum ac gula laete coccineo-rosea, plumis apice subtilissime albido-marginatis; macula aurium intense cinerea; plumae verticis (interdum in coeruleum vergentes), occipitis, colli postici ac lateralis, dorsi, tergi, uropygii, colli antichi inferioris, pectoris, epigastrii, laterum et alarum tectrices superiores ac inferiores mediae ac minores, nec non pennae scapulares herbaceo-virides, limbo apicali distinctissimo nigro; reliquae tectrices alarum ac caudae tam superiores quam inferiores, nec non remiges ultimae virides; plumae ventris abdominisque medii laete lilacinae, limbo in apice virescente notatae; alulae pennae, tectrices marginales ante has remigumque primariarum ac secundariarum pogonium externum coerulea; harum pogonium internum nigrum; remiges subtus nigrae, pogonio interno a basi ultra medium malachitaceo-virides; alae flexura viridis; rectrices quatuor intermediae supra et subtus toto virides, reliquae pogonio externo virides, versus ejus apicem in coeruleum vergentes, pogonio interno flavae, excepta macula magna a basi fere usque ad medium ducta, marginem non attingente, coccinea. *Mas et Foem. adult.*

*Psittacus leucocephalus Aldrov.* I. p. 673. *The white headed Parrot Edw.* 4. t. 166 (*fig. mala*). *Psittacus martinicanus Briss.* 4. p. 242. *Id. Psit. martinic. gutture rubro* p. 244. *Id. Psit. martinic. cyanocephalos* p. 251. *Perroquet à front*

blanc du Sénégal Buff. Pl. enl. 335 (fig. mediocris). Id. Perroquet de la Martinique l. c. t. 549 (fig. mala). *Psittacus leucocephalus* Linn., Gmel., Lath. (cum varietatib.  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ), Kuhl (exclusa descriptione foeminae et juv. av.) p. 50. *Psittacus collaris* Auctor. (descript. imperfecta). Le Perroquet à face rouge, mâle Le Vaill. l. c. t. 107 et t. 107 bis (fig. optima).

*Juv. avis.* Adultae similis, frons solummodo alba; vertex viridi-coeruleus; collum anticum viride, mento rubro-variolofo; rostrum totum albidum.

*Le Vaill.* l. c. t. 109 (fig. opt.).

*Var.  $\alpha$ .* Gulae plumae rubrae viridi-marginatae.

*Var.  $\beta$ .* Ptilosis trunci plus minusve rubro-variolofo.

*Var.  $\gamma$ .* Luteus; trunci plumae rubicundo-marginatae, gula, venter, rectricum basis et irides rubra; remiges primariae albae.

*Catesb.* Carol. t. 10. *Perroquet de Cuba* Buff. Pl. enl. 336, *Psittacus Paradisi* Gmel., Lath.

*Var.  $\delta$ .* Caput ac collum supremum fere toto alba, ptilosis plus minusve varia.

*Psittacus Gerini* Lath., Kuhl.

Rostrum mediocre compressiusculum, culmine biangulosum, totum albicans; cera narium incarnato-alba; lora subplumosa, regio periphthalmica nuda, coerulescenti-alba; iris avis junioris et adultae atro-fusca, pedes incarnato-subgrisei, unguibus nigris, cauda mediocris, apice subrotundata; alae acutae. Longitudo 12", caudae 4½"; alae 7", maxillae 1¼", tarsi 8". Habitat in insulis *Martinique*, *Dominique*, *Cuba*, ac, ut dicitur, in *Jamaica*; avis docilis, crebro in Europam translata. (*Mus. Paris.*, *Berol.*, *Monac.*; multos vivos vidi.).



*Observatio.* *Psitt. dominicensis* a cel. *Kuhl* aliisque auctoribus cum hac ave unitus, species distincta est. — Vidi specimen *Ps. leucocephali* cum iride albo-fusca, flavido-cincta. —

19. *Ps. albifrons.* Viridis; colli pectorisque plumae nec non pennae scapulares nigro-marginatae; frontis margo anterior, circulus oculus ambiens, lora alulaeque pennae laete coccinea; frons alba; sinciput cyaneum; remix prima tota nigra; remiges sequentes quatuor extus a basi ad medium virides, dein nigrae, nitore cyaneo, reliquae extus cyanae, intus nigrae, omnes subtus pogonio interno virides; rectrices quatuor intermediae toto virides, reliquae a basi ad medium coccineae, dein virescentes; brachii margo ac tibiae toto virides; rostrum magnum luteum, apice albidum, culmine rotundatum. *Mas adult.*

*Quiltoton Hernand.* Thes. p. 38. cap. 117. *Psittacus albifrons Sparrm.* Mus. Carlsr. Fasc. 3. t. 52. *Lath., Kuhl* l. c.

Regio ophthalmica nudiuscula; oculi iride obscure fusca; pedes grisei unguibus nigricantibus; cauda rectiusculo-truncata.

Habitus et magnitudo *Ps. leucocephali.* Longitudo  $11\frac{3}{4}$ " , alae 7" , caudae  $3\frac{3}{4}$ " , maxillae 1" 4" . Habitat in *Mexico*, inquilinis *Cototo* dictus. (*Mus. Berol.*)

*Observatio.* Lora non flava sunt, ut cel. *Kuhl* habet, sed rubra.

20. *Ps. Pretrei.* Viridis; plumae capitis, colli, trunci superioris ac inferioris alarumque tectrices nigro-marginatae; frons tota, lora ac circulus oculus cingens strictus, brachii margo tibiarumque pars infima coccinea; alulae pennae virides, extus coccineae; remix prima tota nigra, reliquae extus virides, apice versus ultimas magis magisque cyanae, intus nigrae, omnes subtus pogonio interno virides;

rectrices duae intermediae toto virides; reliquae a basi ad medium virides, dein flavescentes; rostrum parvum coccineum, culmine bianguloso. (*Av. adult.*)

*De altero Cocho Hernand.* Thes. p. 44. cap. 146. *Psittacus Pretrei Temm.* Pl. col. 492 (*fig. non satis accur.*).

Regio ophthalmica nudiuscula; irides luteae; pedes grisei unguibus dilute corneis; cauda apice rotundata. Habitus speciei praecedentis. Longitudo  $14\frac{1}{2}$ " , alae  $7\frac{3}{4}$ " , caudae  $4\frac{1}{2}$ " , maxillae  $13$ ". Habitat in *Mexico*. (*Mus. Berol.*)

*Observatio.* Differt haec species a praecedente non solum frontis, alarum, pedum caudaeque pictura, sed imprimis quoque alis caudaeque longioribus, rostro in culmine bianguloso, minori, rubro. — *Temminckii* icon false exhibet rostrum album.

XVII. Genus. *Pionus*. Pag. 35.

*A. Rostro subparvo, compressiusculo.*

*α. Crisso rubro.*

1. *P. menstruus*. Caput, collum ac pectus intense cyanea; aurium plumae nigricantes, epigastrii, ventris, abdominis ac tibiarum virides, margine apicali latiusculo, plus minusve intense turcino-coerulescente, crissi roseo-coccineae, macula in apicis medio coerulea notatae; rectrices duae utrinque laterales pogonio externo toto, sequentes apice cyanae, intus a basi ultra medium nigricanti-lavatum roseo-coccineae, dein virescentes, reliqua parte cyanae, intermediae quatuor toto virides; hypochondria, alarum tectrices inferiores, superiores majores ac mediae margine toto, *remiges omnes* extus ac intus juxta rhachin (excepta prima margine externo paullo cyanescenti-lavata), dorsum, tergum, uropygium, caudae tectrices superiores ac pennae scapulares intense viridia, nonnihil in olivaceum vergentia;

tectrices alarum superiores reliquae ejusdem coloris, pro vario ad lucem objectu aureo-flavo- et olivaceo-reflectentes; remigum pogonium internum supra nigrum, subtus intense malachitaceo- viride; tectrices alarum inferiores hic et illic maculis turcino-coeruleis variae; rostrum corneo-nigricans, mandibulae latere antico paullo dilutiori; maxilla macula infra nares coccineo-rubra notata. *Avis adult.*

*The blue-headed Parrot Edw. 3. t. 314 (fig. accur.). Psittacus gujanensis cyanocephalus Briss. Av. 4. p. 247. Perroquet à tête bleue de la Guiane Buff. Pl. enl. 584 (fig. accur.). Psittacus menstruus Auctor.*

*Avis junior.* Rostrum quam in ave adulta dilutius; maxillae macula rubra latior, in testaceum vergens; caput, collum pectusque coerulea, plumis intermixtis virescentibus; plumae colli antici medii coeruleae, versus basin vinaceo-rubicundae; aurium nigricanti-virescentes; alarum tectrices superiores omnes ac plumae gastraei a pectore ad crissum dorso concolores, illae absque flavedine; crissi plumae rubrae, macula viridi in apice notatae; partes reliquae avis adultae.

*Perroquet à camail bleu Le Vaill. 1. c. t. 114 (fig. opt.).*

Rostrum mediocre; maxilla apice perquam emarginata, culmine biangulosa; mandibula ad latera admodum sinuata, pagina antica acie intermedia longitudinali insignis; oculi iride fusco-nigra; regio ophthalmica nudiuscula, incarnata; cera nigra; maxilla rubicundo-nigricans; pedes cinerei unguibus nigricantibus; cauda brevis, aequalis, alas cum apice non excedens. Longitudo 10" 5"', maxillae 1" 4"', alae 6½", caudae 3¼", tarsi 7". Habitat in *Surinamo, Guiana* ac *Brasilia* satis frequens, facile mansuescens, attamen parum docilis. (*Mus. Paris, Berol., Monac.; multos vivos vidi.*)

2. *P. Maximiliani.* Rostrum flavidum; maxilla versus basin

fuliginoso-fusca; plumae occipitis ac colli postici apice rotundatae, squamoso-positae, albae, viridi-limbatae, in lateribus capitis et colli virides, limbo apicali coerulescente; plumae colli antici et pectoris olivascenti-virides limbo latiusculo cyaneo; vertex viridis, versus frontem nonnihil cinerascens; lora nigrescentia; gastraei pars reliqua olivascenti-viridis, excluso crisso coccineo; corporis partes superiores sordide et obscure virides; pennae scapulares limbo fusciscente; rectrices alarum superiores magnae ac remiges laete virides, intus nigrescentes, harum primariae extus subtiliter cyaneo-limbatae; rectrices quatuor utrinque laterales extus eleganter cyanae, duae extimae intus macula rubra notatae; intermediae reliquae virides. *Mas et Foem. adult.*

*Le Sij Azar. Voy. 4. n. 287. Psittacus Maximiliani Kuhl l. c. p. 72. Psittacus flavirostris Spix Av. Brasil. 1. t. 31 (fig. satis accur.).*

*Juv.* Plumae juguli fere sine reflexu coeruleo; ptilosis reliqua quam in ave adulta minus nitida; rectrices laterales plerumque sine rubedine.

Habitu et colore speciei praecedenti simillimus; irides intense fuscae; pedes obscure cinerei, unguibus nigris. Longitudo 11" 2"', rostri 1" 2½"', caudae 9" 2—3"', alae 6" 7"'. Habitat gregarius in *Brasilia*. (*Mus. Paris., Berol., Monac.*).

*Observatio.* - In *Azarae* descriptione hujus avis legas „les couvertures inferieures de la queue“ pro: „les couvertures superieures caet.“

3. *P. senilis*. Frons, sinciput, vertex (ex parte) ac maxillae basis pure alba; menti plumae albae, rhachi grisescens; plumae genarum ac regionis *paroticae* nec non colli supremi lateralis breves, apice rotundatae, squamoso-positae, virescenti-coeruleae, limbo apicali

intense coeruleo, occipitis ac colli postici ejusdem formae ac coloris, attamen pallidiores; plumae pectoris et epigastrii basi olivaceo-virides, limbo lato apicali violaceo-coeruleo; dorsum, tergum, uropygium, caudae tectrices superiores, pennae scapulares ultimae et remiges laete olivaceo-viridia; *pennae alulae superincumbentes toto, remiges primariae extus a basi ultra medium, intus juxta rhamchin egregie cyanae, apice virides*, limbo interno nigrae; *secundariae virides, attamen supra in utroque latere rhacheos intense cyanae*, limbo interno nigrae; omnes subtus nigrae, pogonio interno malachitaceo-virides, nitentes; tectrices alarum inferiores omnes viridi-coeruleae, superiores olivascenti-brunnescentes, apice pallide ochraceo-limbatae, majores dorso concolores; plumae reliquae partis gastraci virides, limbo apicali coerulescente, exceptis plumis crissi roseo-coccineis ac hypochondriorum viridibus paullo roseo-rubromixtis; *rectrices duae intermediae cyanae, limbo utroque laterali viridi; rectrix sequens utrinque medio versus apicem cyanea, intus versus basin rubescens, reliqua parte virescens; proxima ejusdem picturae, attamen rubedine intensiore extus quoque in medio pogonii conspicua insignis; rectrices reliquae intus a basi ultra medium lacte roseo-coccineae, dein cyanae ac margine interno paullo virides, extus toto cyanae*; omnes subtus roseo-rubrae, margine externo et apice malachitaceo-virescentes. *Av. adult.*

*Psittacus senilis*, Spix Av. Brasil. t. 31. f. 1. *Psittacus leucorhynchus* Swains. Philos. Magaz. 1827. p. 438.

*Rostrum*, quam in *P. menstruo* majus, *album*, versus *basin flavum*; *cera* ac regio ophthalmica nuda pallidae; *pedes pallidi* unguibus corneo-nigrescentibus; *cauda brevis, aequalis, alarum apicem non transcendens. Longitudo 10", caudae 8", alae 6" 7"', maxillae 1 1/4", tarsi 7"'*. Habitat in *Mexico (Mus. Monac.)*.

*Observatio.* A *Piono purpureo* alarum caudaeque pictura af-

fini differt rostri, capitis, dorsi abdominisque colore. Specimen musei nostri, unicum quod hucusque vidi, vivum extitit in collectione regis nostri clementissimi *Maximiliani Josephi*. Oculorum iris, ni fallor, obscure fusca est. In alarum flexura plumulas nonnullas observo rubicundas. An eadem in omnibus speciminibus conspicuae?

4. *P. purpureus*. Gastraeum a gula ad crissum cinereo-fuliginosum, pro vario ad lucem objectu violaceo-resplendens, plumis omnibus margine apicali obscure purpurinis; caput totum obscure violaceum, exclusis striolis longitudinalibus in plumis laterum occipitis ac genarum fuscescenti-albis ac striola pone nares horizontali rubra; rectrices supra remigesque primariae toto saturate violaceae, secundariae extus in obscure viride vergentes; rectrices intus a basi ad medium ac plumae crissi maxima ex parte purpurino-rubrae; tectrices alarum superiores, pone pennas scapulares sitae nigricantes; plumae colli postici, dorsi, tergi caudaeque tectrices superiores abdomini concolores, hoc paullo obscuriores. *Mas et Foem. adult.*

*The little dusky Parrot Edw. 3. tab. 315 (fig. bona). Perroquet varié de Caj. Buff. Pl. enl. 408 (fig satis accurat.). Psittacus purpureus Auctor, Kuhl. — Psittacus cyanocephalus Scop. Ann. 1. p. 33.*

*Avis junior.* Avi adultae subsimilis; fasciola pone nares plumulis nonnullis rubris indicata; genarum et pilei plumae cyanescentes, illarum albedo-fuscescenti-marginatae, aurium fuscescentes, paullo cyaneo-variolosae, colli postici, dorsi, tergi, pennae scapulares et tectrices his affines fuscae, limbo apicali dilutiore; plumae uropygii ac caudae tectrices superiores fuscae, paullo purpurino-reflectentes; color alarum, caudae ac totius gastraei idem qui in ave adulta, abdominis minus nitidus; maxilla et mandibula basi flavae, versus apicem plumbeo-corneae.

*Femelle du Perroquet à camail bleu. Le Vaill. l. c. t. 115*  
(fig. mediocr.).

Habitus *Pioni menstrui*, hoc paullo minor; rostrum plumbeo-nigrum, maxilla apice macula aurantio-flava notata; irides atrofuscae; regio ophthalmica largiuscule nuda, albido-caesia; pedes incarnato-nigricantes, unguibus fuscis; cauda brevis, aequalis; alae ejus apicem attingentes. Longitudo fere  $9\frac{3}{4}$ " , alae  $6\frac{1}{4}$ " , caudae  $2''\ 8'''$  , maxillae  $13\frac{1}{2}'''$  , tarsi  $6'''$  . Habitat in *Surinamo*, *Guiana* ac in *Brasilia* versus flumen *Amazonum*. (*Mus. Paris., Berol., Monac.*; vivum vidi.)

*Observatio.* Haec species a cel. *Lichtenstein* (*Verz. der Doubl. des Berl. zool. Mus. S. 6.*) falso pro juvenili *Piono menstruo* habita, differt ab hoc non solum ptiloseos pictura, toto coelo diversa, sed statura quoque minore, cauda brevior, aequali caet.

5. *P. sordidus*. Rostrum culmine nigrum; mentum gulaque eleganter coerulea; crissum coccineum; jugulum, tibiae ac reliquae corporis partes inferiores obscure fusca; frons et reliquae capitis partes superiores fusco-virescentes; nucha, genae collique latera viridia; dorsum medium, uropygium caudaeque tectrices superiores viridibrunnescentia, pro vario ad lucem objectu plus minusve viridisive brunneo-reflectentia; pennae scapulares vertici concolores; alae supra toto virides; remigum posteriorum limbus externus flavus; cauda supra viridis, subtus viridifusca, exceptis reatricibus utrinque binis extimis pogonio externo eleganter coeruleis.

*The dusky Parrot Edw. Av. 4. p. 167. t. 167. Psittacus sordidus Auctor. Le Perroquet brun Le Vaill. l. c. p. 53. t. 104.*

Cera nigricans; regio ophthalmica nuda griseo-albicans; oculorum iris obscure avellanea; pedes ardesiaci unguibus nigris; cauda aequalis. Magnitudo *Psittaci leucocephali*. Habitat in *Nova-Hispania Edw.* (Non vidi).

β. Capite obscuro.

6. *P. melanocephalus*. Pileus totus aterrimus, macula pone oris angulum plumosa malachitaceo-viridis; collum supremum laterale ac jugulum, tibiae, abdomen, crissum et hypochondria citrino-flava, haec paullo in aurantium vergentia; pectus ac reliquae partes gastraei sericeo-albida, lateribus pallide roseo-lavata; collum posticum pallide roseum; alarum tectrices inferiores, cauda, alae ac reliqua trunci ptilosis laete virides; rectrices intus versus basin, subtus a basi ad medium nigricantes, ibidem reliqua parte pro vario ad lucem objectu flavido-micantes; remiges intus nigrae, extus cyanae, margine stric-tissimo viridi, subtus toto cinereo-nigricantes. *Mas et Foem. adult.*

*White breasted Parrot* Edw. 4. 1. 169 (fig. mala). *Petite Perruche Maïpouri de Caj.* Buff. Pl. enl. 527 (fig. mala). *Psittacus melanocephalus* Auctor., Mill. Cimel. physic. t. 4 (fig. mediocr.). *Hahn* Ausl. Vög. Lief. 2. f. 1 (fig. accur., exceptis orbitis ac rostro). — *Perroquet Maïpouri* Le Vaill. l. c. p. 77. t. 119 (fig. opt.).

*Avis junior*. Avi adultae subsimilis; pilei plumae nigro-fusces-centes, viridi-limbatae, colli postici sordide roseae et juguli ochraceo-flavae, nec non abdominis margine virescentes, pectoris ventrisque albae, intus flavae, isabellino-cinctae; corporis superioris color viridis magis in flavidum vergens; rostrum flavidum culmine fusco.

*Le Vaill.* l. c. t. 120.

*Avis hornot*. Caput et collum supra isabellina; lora, capitis collique latera, gula et crissum ochraceo-flava; pectus, epigastrium et venter alba; tibiae, dorsum, tergum et uropygium, caudae et alarum tectrices superiores rectricesque viridia; remiges avis adultae; rostrum, pedes et ungues alba.



*Avis ptilosi junioris se induens.* Avi hornotinae similis; vertex nigro-variegatus; ungues apice nigricantes.

*Psittacus leucogaster* Kuhl l. c. p. 70. n. 121.

Rostrum cinereo-corneum, cera nigricante; pedes cinerascetes, unguibus corneo-cinereis; iris miniato-rubra, pupilla annulo obscure fusco cincta; regio periophthalmica largiuscule nuda, nigricans; cauda brevis subaequalis; pectoris ventrisque plumae limbo apicali subsericeo. Longitudo  $9\frac{1}{4}$ " , maxillae 15" , alae 4" 2" , tarsi 6" , caudae 2" 10" . Habitat in *Cajenna* et *Guiana* satis frequens, rarior in *Brasilia*. (*Mus. Paris., Berol., Monac. etc.*; multos vivos vidi.)

7. *P. Caica.* Caput totum, mentum ac jugulum magna ex parte atra; plumae omnes colli postici ochraceo-aurantiae, paullo fusco-marginatae; colli antici pars reliqua et pectus olivacea, non-nihil in ochraceum vergentia; ptilosis reliqua tota laetissime viridis, splendens, gastraei pro vario ad lucem objectu flavido-micans; rectrices virides, exceptis duabus mediis apice cyaneis, intus latere inferiori flavido-resplendentes; remiges coeruleo-nigrae, extus viridilimbatae; pennae flexurae alae alulaeque cyanae; regio periophthalmica nuda, alba. *Mas et Foem. adult.*

*Perruche à tête noire de Caj.* Buff. Pl. enl. 744 (fig. mala).  
*Psittacus pileatus* Gmel., Kuhl, *Psittacus Caica* Lath., Vieill.  
*Le Perroquet Caica* Le Vaill. l. c. t. 133 (fig. bona).

*Av. junior.* Collum posticum viride; caput viridi-nigricans.

Rostrum rubicundum; pedes cinerascetes. Habitus et magnitudo *Pioni melanocephali*. Habitat in *Cajenna*. (*Mus. Paris.*)

*Observatio.* Inter aves e *Brasilia* missas hanc speciem nondum offendi.

1 ♂ *P. Barrabandi*. Caput totum incluso mento aterrimum (absque nitore), exclusa genarum macula magna, versus gulae latera ducta, ovata, ochraceo-aurantia; jugulum ac pectus supremum flavido-olivacea; alarum tectrices inferiores omnes ac alarum margo sanguinea; harum flexura ac tectrices minores superiores, nec non humerales tibiaeque laete aureo-aurantiae; remiges intus toto nigrae, subtus laete malachitaceo-virescentes, limbo externo latissimo nigricante, extus nigrae, pro vario ad lucem objectu violaceo-resplendentes; rectrices quatuor intermediae virides, reliquae ejusdem coloris, intus flavae, omnes apice violaceae; reliqua ptilosis laete viridis, nitens. *Av. adult.*

*Le Caica Barraband. Le Vaill. l. c. p. 102. t. 134 (fig. opt.). Psittacus Barrabandi Kuhl. Consp. p. 61. n. 101. Spix Av. Brasil. p. 45.*

Irides rubrae; pedes cinerei, unguibus corneo-fuscis; regio periophthalmica largiusculè nuda ac cera rubicundae (?); rostrum nigricanti-corneum, plumbeo-lavatum; cauda brevis, aequalis; rectrix extrema solummodo reliquis paullo brevior. Longitudo 10", caudae 2" 8"', alae 5" 10"', maxillae 13"'. Habitat in *Brasilia* ad flumen *Amazonum* rarus. (*Mus. Paris.*, *Monac.*)

9. *P. vulturinus*. Tab. XXIV. Fig. 1. Caput totum nudum, nigrum, pilis singulis obsitum, fronte pallida; collum posticum nigrum, superius fascia lata cinctum; pectus supremum olivaceum; partes gastraei reliquae virides; venter et abdomen in medio in turcino-coeruleum vergentia; suffraginis plumae coccineae; pennae scapulares, dorsum, tergum, uropygium, caudae alarumque tectrices superiores saturate viridia, harum inferiores ac carpi margo coccinea; humeri aurantii; alula tectricumque majorum limbus externus cyanea; remiges nigrae, pogonio externo obscure coeruleae, subtus malachitaceae; rectrices duae intermediae virides apice cyanae, reliquae pogonio externo virides, interno luteae, apice cyanae. *Mas et Foem. adult.*

*Psittacus vulturinus* Illig. in Mus. Berol., Kuhl Consp. p. 622 n. 62. *Psittacus vulturinus* Illig. in Mus. Berol. p. 622 n. 62.

Habitus et magnitudo *Pioni Barrabandi*; cauda brevis recto-truncata; rostrum flavum, culmine et apice nigrum; pedes unguesque nigri. Longitudo  $9\frac{1}{4}$ " , caudae  $2\frac{3}{4}$ " , alae fere 6" , maxillae 1" . Habitat in *Brasiliae* provincia *Para*. (Mus. Berol.)

10. *P. fuscicapillus*. Viridis, partes gastraei nonnihil ad flavidum vergentes; caput totum et humerorum macula parva castanea; remiges primariae pogonio externo dilute coeruleae; tectrices alarum inferiores minores, supremae cyanae; rectrices virides, intus ac subtus flavae. *Adult*.

*Psittacus fuscicapillus* Vieill. N. D. 25. p. 316. *Id.* Encycl. meth. Livr. 93. p. 1368. *Psittacus spadiceocephalus* Kuhl. l. c. p. 84. n. 148.

Rostrum rubicundum; pedes grisei; cauda brevis, aequalis; corpus crassum. Habitus et magnitudo *Pioni melanocephali*,  $8\frac{1}{4}$ " longus. Habitat in insula *Java*. (Mus. Paris.)

γ. Cauda fasciata.

11. *P. guineensis*. Viridis; caput ac collum coccinea; fascia supra gulam infra oculos ducta alba; vitta superciliaris latiuscula flava; gastraeum cinerascens-album, excluso pectore flavo; cauda albo-cinerascens, fascia rubra terminata; tectrices alarum superiores virides; remiges coeruleae, stricte flavido-marginatae.

*Psittacus guineensis* Miller. Cimel. phys. t. 29. Gmel., Lath., Vieill., Kuhl.

Rostrum nigrum; cera ac regio ophthalmica nudiuscula albae;

pedes obscuri, unguibus nigris; cauda brevis, aequalis. Habitus et magnitudo *Pioni menstrui*, 10" longus. Habitat in *Guinea*, fide *Shaw*. An potius *Americae* incola? Non vidi.

*B. Rostro magno, paratonis convexo.*

*α. Regione ophthalmica nudiuscula.*

12. *P. senegalus*. Caput totum ac collum cana; fascia ante pectus lata, laete viridis, in pectore in acumen trigonum desinens; collum posticum infimum, dorsum alarumque tectrices superiores omnes laete viridia; plumae tergi uropygii caudaeque tectrices superiores splendide virescentes; gastraei partes reliquae croceo-aurantiae, exceptis tibiis viridibus; tectrices alarum inferiores aurantiae; majores remigesque supra ac subtus cinereo-nigricantes, hae stricte viridilimbatae, ultimae extus toto virides; rectrices omnes subtus cinerascetes, pro vario ad lucem objectu subviridi-reflectentes, supra fuscescenti-cinereae, virescenti-lavatae, apice et limbo externo virescentes; irides latae, egregie croceo-flavae. *Mas et Foem. adult.*

*Psittacus senegalensis* *Briss.* h. p. 400. n. 92. t. 24. f. 2. *Petite Perruche du Sénégal Buff.* Pl. enl. 288. *Psittacus senegalus* *Auctor.* *Le Perroquet à tête grise, mâle* *Le Vaill.* l. c. t. 116 (*fig. opt.*).

*Avis hornot. et junior.* Viredo pallidior, minus pura; caput ac collum obscurius cana, fere cinerea; corporis partes inferiores pallide flavae aut flavae; irides sordide flavae, circa pupillam subgriseae.

*Le Vaill.* l. c. t. 117.

*Var. α.* Ptilosis tota flava, excepto alarum apice nigricante.

*Le Vaill.* l. c. t. 118.

*Var. β.* Caput et alae flavo-variegatae.

Rostrum validum, lateribus convexum, ad latera apicis acuti sinuatum, nigricans; pedes nigricantes, incarnato-lavati; cera ac orbitarum regio parum nuda cinereo-nigricantes; cauda brevis, aequalis; alae longae, caudae apicem attingentes. Longitudo  $9\frac{1}{2}''$ , rostri ad frontem  $13\frac{1}{2}'''$ , alae  $5''\ 10'''$ , caudae  $2\frac{3}{4}''$ . Habitat gregibus parvis in *Senegambia*; oculi iridem pro lubitu contrahere ac dilatare valet; dormit capite et trunco oblique demissis. (*Mus. Paris.*, *Berol.*, *Monac.*; multos vivos vidi.)

13. *P. Meyeri*. Caput et collum murino-grisea; dorsum, pennae scapulares ac alae supra virescenti-cinerae, humeri ac tectrices inferiores alarum ranunculaceo-flava; tergum, uropygium, caudae tectrices superiores ac inferiores, nec non gastraeum totum coeruleo-iridia (aeruginosa); cauda remigesque dorso concolores.

*Psittacus Meyeri*. *Rüppel*. Zoolog. Atl. p. 18. tab. 11 (*fig. opt.*).

*Var. a.* Capite plumis flavis variegato.

Rostrum plumbeo nigricans, cera obscura; pedes et regio ophthalmica nudiuscula nigra; irides aurantio-flavae; ungues corneo-nigri; cauda brevis recto-truncata. Habitus et fere magnitudo *Pioni senegali*. Longitudo  $8\frac{1}{2}''$ , caudae  $3''$ , alae  $5\frac{1}{2}''$ , maxillae  $1''\ 1'''$ , tarsi  $6'''$ . Habitat in *Nubia (Hordofan)*. (Specimen descripsi in *Mus. Berol.*)

14. *P. brachyurus*. Lineola e pilis brevibus nigris formata a naribus versus oculos ducta; cauda brevis virescens, rectrices quatuor utrinque lateribus intus a basi subflavida fere usque ad medium vinaceo-rubicundae; brachii margo posticus obscure vinaceus; ptilosis capitis, colli, alarum ac totius trunci viridis, unicolor, in partibus corporis inferioribus paullo pallidior quam in superioribus; remiges extus laete et intense virides, pogonio externo strictissime flavido-

marginatae; intus nigrae, subtus pogonio interno maxima ex parte malachitaceo-virides; alarum margo ac tectrices inferiores virides; rostrum flavum apice corneo-fuscum.

*Avis junior.* Avi adultae similis; brachii margo viridis; rostrum fuscescens.

*Psittacus brachyurus* Kuhl. Consp. Psitt. p. 72. n. 125. *Psittacus Pumilio* Spix. Av. Bras. 1. t. 29. fig. 2 (fig. bona). *Psittacus viridissimus* Swains. Zool. Illustr. n. 52. t. 155 (fig. opt.).

Habitus *Pioni senegali*; alae magnae, caudae brevis subaequalis apicem fere excedentes; rostrum robustum, intumidum, laeve; pedes nigricanti-fuscescentes, unguibus corneo-fuscescentibus; regio ophthalmica nudiuscula. Longitudo  $3\frac{1}{4}$ " , caudae  $2''\ 2'''$  , alae  $5\frac{1}{4}$ " , maxillae  $13'''$  , tarsi  $6'''$  . Habitat rarus in *Cajenna*, in *Brasilia* versus flumen Amazonum (*Mus. Berol.*; *Monac.*):

*Observatio.* In specimine a cel. *Swainson*. descripto ac depicto supra lineolam in loris nigram altera flava adest; talem in speciminibus meis non observavi.

### β. Regione ophthalmica plumosa.

15. *P. Le Vaillantii*. Caput ac collum flavido-grisea, plumis basi olivaceis, in mento obsolete rufo-lavatis; lora nigricantia; alarum margo ac tiliarum pars interna ac infera aurantio-cinnabarina; tergum, uropygium, caudae tectrices superiores ac inferiores et reliquae partes gastraei nitide viridia; plumae dorsi, tergi alarumque tectrices superiores ac inferiores nigricantes, limbo lato obscure viridi; remiges rectricesque supra et subtus toto fusco-nigrae, absque nitore; rostrum permagnum albidum, apice gracili longe producto, culmine bianguloso.

*Psittacus robustus* Gmel., *Lath.* (descript. opt.), *Kuhl.*,

*Vieill.*, *Psittacus Le Vaillantii*. *Lath. Suppl.*, *Kuhl* p. 83.,  
*Vieill.*, *Psittacus caffer* *Lichtenst.* *Catalog. rer. rariss. Hamb.*  
 1793. p. 6, *Bechst.* l. c. *Perroquet à franges souci* *Le Vaill.*  
 t. 130. 131 (*fig. opt.*). *Psittacus flammipes*. *Bechst.* in *Lath.*  
 deutsch. Uebers. *Psittacus infuscatus* *Shaw*.

*Avis junior*. *Avi adultae* similis, ptilosi quam in hac minus nitida;  
 frons croceo-rubra (*Mus. Berol.*).

*Psittacus fuscicollis* *Kuhl* l. c. p. 93. n. 171.

Regio ophthalmica tota plumosa; pedes grisei, unguibus corneis;  
 cauda recto-truncata, rectricibus in apicis medio in acumen breve  
 desinentibus; alae apicem caudae fere transcendentes. Longitudo  $12\frac{3}{4}$ "  
 maxillae  $1\frac{3}{4}$ " , alae  $8'' 5'''$  , caudae  $3\frac{3}{4}$ " . Habitat in *Terra Caff-*  
*rorum*. (*Mus. Paris.*, *Berol.*)

#### XVIII. Genus. *Psittacula*. Pag. 36.

##### a. Rectricibus lanceolato-acuminatis.

1. *Ps. pileata*. Pileus totus cum occipite ejusque lateribus, lora  
 ac oculorum margo inferior rubro-coccinea; macula aurium obsolete  
 purpurina; alarum margo, tectrices, flexurae alae ac alulae pennae  
 intense coeruleae; remiges secundariae extus intense cyanae, prima-  
 riae ibidem dilutius coeruleae, limbo marginali viridi, intus nigrae,  
 subtus toto malachitaceo-virescentes; rectrices laterales fere toto cy-  
 anae, limbo externo strictissimo; interno latiore viridi, intermediae  
 quatuor fere toto virides, apicem versus sensim cyanae, omnes sub-  
 tus malachitaceo-virescentes; tectrices alarum inferiores malachitaceo-  
 virides, harum marginales extimae cyanae; reliqua ptilosis herbaceo-  
 viridis, unicolor, attamen pro vario ad lucem objectu nonnihil in  
 flavum vergens. *Mas adult.*

*Psittacus pileatus* *Scopoli*. *Annus* 1. *Historico-naturalis*

(Lipsiae 1769) p. 33. n. 32.; *Lath.* *Le Maracana à tête rouge.*  
*Azar.* Voy. n. 184. *Psittacus erythrocephalus.* *Vieill.* N. D. 25.  
 p. 372. *Psittacus mitratus* *Wied.* Reise nach Brasil. 1. S. 263.,  
*Huhl* Consp. p. 70. n. 122.; *Temm.* Pl. col. 207 (*fig. opt.*)  
*Psittacus Maitaca Spix* Av. Brasil. t. 29. f. 1 (*fig. bona*).

*Foemina adulta.* Mari similis, diversa capite absque rubedine, fronte nonnihil cyaneo-induta, alis caudaque minus nitide cyaneis, reetricibus quatuor intermediis viridibus, solum apice prope rhachin paullo cyaneo-lavatis, reliquis largius viridi-limbatis, viredine ptiloseos reliquae minus nitida; rostri pedumque pictura eadem quae maris.

*Spix* l. c. t. 30 (*fig. bona*).

*Juvenis.* Foeminae similis, ptiloseos color quam in hac minus intensus ac purus.

*Mas juv. adulti ptilosi se induens.* Vertex, frons et occiput viridia, plumis rubris plus minusve variegata.

Maxilla et mandibula albicantes, macula in basi corneo-plumbea majuscula notatae; irides fuscae; pedes viridi-nigricantes; ungues pallide cornei, margine inferiore albido; cauda brevis aequalis, reetricibus lanceolato-terminatis. — Longitudo maris 8" (foeminae 7½"), alae 5" 5"', caudae 3" 1"', tarsi 5"', maxillae fere 11"'. Habitat satis frequens et gregaria in *Brasilia*, inquilinis *Maitaca* sive *Tui Maitaca* dicta; avis lentiginosa, parum docilis et garrula.

*Observatio.* Mentum interdum plumis rubicundis varium. — Cel. *Latham* descriptionem *Scopoli* mutuata reddidit, nam autor hic neutiquam dicit alarum marginem et caudae apicem flavum, sed remiges et rectrices in hac ave coeruleo-limbatis esse affirmat.

2. *Ps. passerina.* Tergum infimum, uropygium, caudae tectrices



superiores, alarum inferiores omnes, superiorum majores ac remiges secundariae eleganter cyanea; ptilosis reliqua viridis, gastraei quam notaei pallidior, unicolor, exceptis remigibus primariis extus intense viridibus, intus nigricantibus; remiges omnes subtus in malachitaceum vergentes; rectrices lanceolatae, acuminatae, supra ac subtus virides.  
*Mas adult.*

*Tui-ete Marcgr.* Hist. rer. nat. Bras. lib. IX. p. 206 (*Lichtenst.* l. c. p. 167). *Psittacus passerinus Auctor.* (*descriptio plurimorum auctorum spectat marem juniorem*). *Le Perroquet nain Azar.* Voy. n. 288. *Psittacus passerinus Spix* Av. Brasil. 1. t. 33. f. 1 (*fig. opt.*).

*Foemina.* Ptilosis sine pictura coerulea, tota viridis, quam in mare pallidior; uropygium, caudae tectrices superiores, alarum inferiores subtiliter thalassino-induta; remiges intense nigricantes, subtus pogonii interni margine paullo malachitaceo-relucentes; rostrum quam in mare pallidius.

*Tui-Tirica Marcgr.* l. c. p. 206 (*Lichtenst.* l. c. p. 167). *Psittaculus gregarius ♀ Spix* Av. Bras. 1. t. 34. f. 4 (*fig. bona*).

*Mas junior.* Foeminae similis; remiges secundariae ac tectrices alarum superiores majores cyanae, harum inferiores ac uropygium thalassino-viridia, plus minusve cyaneo-variegata.

*Petite Perruche du Cap Buff.* Pl. enl. 455. f. 1 (*fig. mediocr.*). *Psittacus capensis Gmel., Lath., Shaw* (a *Kuhlio aliisque autoribus falso pro foemina indicatus*). *Psittaculus passerinus ♀ Spix* l. c. t. 33. f. 2.

*Av. hornot.* Foeminae similis; ptilosis quam in hac pallidior, rostrum intumidius, corneo-albidum; frons, capitis latera ac jugulum plus minusve sordide flavido-lavata.

*Psittacus St. Thomae* Huhl l. c. p. 58. n. 94. *Psittacus gregarius* ♀ Spix. l. c. t. 34. f. 2. 3.

Rostrum corneo-rubicundum, apice dilutius; pedes griseo-virescentes; irides fusco-atrae; cauda subaequalis, in statu complicato conica, rectricibus lanceolato-terminatis. Longitudo 5", caudae 1" 8"', alae 3", maxillae 6"', tarsi 4"'. Habitat satis frequens in *Paraguay* ac *Brasilia* in arbustis, gregibus parvis (8—20) ut plurimum in humo ambulans, voce gridula, penetrante clamans, rapide volans, in nidis a *Furnariis* (e. gr. *Turd. Figul. Lichtenst.*) aliisque avibus congeneribus relictis nidificans, ac ova quatuor pariens, indocilis; in Europa difficillime hospitans. (*Mus. Paris., Berol., Monac.* caet.).

*Observatio.* Auctorum *Psittacus Tirica* species distincta, nostra *Sittace Tirica*.

β. Rectricibus apice subtrigonis.

3. *Ps. purpurata*. Rectrices eleganter purpureae, apice virides, taeniola nigra limbatae, intermediae quatuor virides, apice nigrae; caput et collum supra fusco-cinerascentia; carpi margo, apex pennarum alulae spuriae, tergum infimum uropygiumque eleganter coerulea; tectrices alarum, pennae scapulares remigesque brunnescenti-nigrae, hae extus viridi-limbatae; ptilosis dorsi medii et reliquarum partium corporis viridis; gastraeum notaeo paullo pallidius; hypochondria in flavidum vergentia. *Av. adult.*

*Psittacus purpuratus* Lath., Gmel., Huhl (*descript. opt.*).  
*Psittacus porphyryrus* Shaw. Nat. Misc. Vol. 1. t. 16. 8. p. 547.  
*Id.* Gen. Zool.

Rostrum flavescens; pedes cinerei unguibus flavidis; cauda aequalis, brevis; supra tectricibus longis tecta. Longitudo 6" 5"'. Habitat in *Cajenna*. (*Mus. Paris.*)

*Observatio.* A *Psittacula melanota* admodum affini differt colore uropygii, abdominis et marginis alarum caet. — Specimen a cel. *Latham* descriptum discedit de Parisiensi solummodo capitis pileo cinereo ac colli parte suprema pallide cinerea. An aetate an sexu diversum?

4. *Ps. Hueti.* Caput, collum, notaeum, gastraeum rectricesque duae intermediae laete viridia; gastraeum in flavidum vergens; fascia in frontis parte antica ac alulae pennae atrae; pileus fere flavus; macula pone oris angulum et tectrices alarum superiores majores laete cyanae; alarum flexura ac margo carpi coccinea; remiges nigrae, limbo externo virides; rectrices reliquae purpureo-lilacinae, fasciola in apice nigra, viridi-terminata signatae.

*Psittacus Hueti Temm.* Pl. col. 49.

Habitus et magnitudo *Psittaculae purpuratae*; rostrum flavum apice dilatiori; regio ophthalmica nudiuscula; pedes grisei. Habitat in *America meridionali.* (*Mus. Lugd. Batav.*) Non vidi.

5. *Ps. melanoptera.* Capistrum flavidum; vertex, regio parotica collique latera laete viridia; jugulum et pectus cano-virescentia; reliquae corporis partes inferiores flavido-virides; plumae colli postici squamoso-positae, flavae, nigro-cinctae; dorsum, tergum, uropygium, pennae scapulares et remiges nigrae; tectrices alarum superiores majores flavae, amethystino-terminatae; alulae pennae nigrae, apice amethystinae; remiges primariae extus strictissime viridi-marginatae, ultimae extus flavae et virides; carpi margo ruber; tectrices alarum inferiores amethystino-cyanae; caudae tectrices superiores virides, duae intermediae longae, nigrae; rectrices lilacinae, egregie amethystino-relucentes, in pogonio interno fasciola nigra ante apicem notatae, quatuor intermediae non fasciolatae. *Av. adult.*

*Petite Perruche de Batavia Buff.* Pl. enl. 791. f. 1 (fig. 20\*)

*mala*). *La petite Perruche de l'isle de Java* Sonner. Voy. à la Nouv. Guin. p. 78. t. 41. *Psittacus melanopterus* Gmel., Lath., Kuhl., Shaw l. c. t. 132 (fig. bona), Brown Illustr. t. 8 (fig. mala). *La Perruche Javane* Le Vaill. l. c. p. 131. t. 69 (fig. opt.). *Psittacus micropterus* Kuhl l. c. p. 67. n. 113.

Rostrum flavidum; regio ophthalmica nudiuscula; irides flavo-rubrae; pedes unguisque flavi; cauda recto-truncata, reatricibus fere trigono-terminatis. Habitus et magnitudo *Psittaculae melanotae*, ei similis. Longitudo  $6\frac{1}{2}$ " , caudae 2" , alae 4" , maxillae 9" . Habitat (non in *India orientali*) in *America (Columbia)*. (*Mus. Paris.*, *Berol.*)

6. *Ps. melanota*. Laete viridis; dorsum et pennae scapulares fuliginosa; brachii margo supremus, alulae pennae strictissime viridimarginatae, remigum omnium apex ac pogonium internum nigra; truncus subtus virescens, lateribus canescens; tectrices alarum caudaeque inferiores ac superiores laete virides; retrices duae intermediae toto virides, reliquae rubro-lilacinae, apice extimo virides, fascia antecedente nigra latiuscula notatae; pro fascia in rectrice extima macula rotunda in pogonio interno. *Mas et Foem. adult.*

*Psittacus melanotus* Lichtenst. in *Mus. Berol.*, Kuhl. l. c. p. 59. n. 97. *Psittacus erythrurus* Wied.

Cauda brevis, rectiusculo-truncata, reatricum apice trigono; rostrum albidum basi, paullo obscurius; cera virenti-fuscescens; irides fuscescentes, angustae; palpebrarum margo et regio periophthalmica stricte nuda, lateritia; pedes et ungues pallidi. Longitudo  $6\frac{3}{4}$ " , alae  $4'' 4'''$  , caudae  $1'' 11'''$  , maxillae 7" , tarsi  $3\frac{1}{2}'''$  . Habitat in *Brasiliae* provincia *Bahia*. (*Mus. Berol.*; vivam vidi Londini.)

γ. Rectricibus apice recto-truncatis.

7. *Ps. surda*. Viridis; pilei collique postici plumae obscurius

limbatae; pennae scapulares fuliginoso-olivaceae; alulae pennae nigrae; capistrum sordide flavidum; jugulum ac reliquae corporis partes inferiores virescentia; ventris latera ad flavum vergentia; rectrices duae intermediae virides, fascia nigra terminatae; reliquae aureo-ochraceae, linea in apice et strictiore ad marginem externum nigra limbatae; tectrices alarum inferiores virides. *Mas adult.*

*Psittacus surdus* *Lichtenst.* in *Mus. Berol.*, *Kuhl* l. c. p. 59. n. 96. *Psittacus chrysurus* *Swains.* *Zool. Illustr.* n. 29. t. 141 (*fig. bona.*).

*Foemina.* Ptilosis quam in mare pallidior, facies pallidius flavido-fuscenscens; rostrum virenti-corneum, subflavidum.

*Avi junior.* Avi adultae similis, colli et pilei plumae marginibus obsoletis; rectrices duae intermediae toto virides; rectrix utrinque sequens viridis, medio ex fulvo-viridis; reliquae ex fulvo-virides apice virides, margine externo nigricantes.

Rostrum maris adulti virescens, versus apicem sensim pallidiorem flavido-virens; cera sordide viridis; regio ophthalmica nudiuscula, obscure cinerea; pedes caesio-nigricantes unguibus pallide corneis; irides ex annulis duobus fuscis compositae, quorum externus interno obscurior; cauda rectissimo-truncata, reatricibus omnibus apice recto-truncatis. Longitudo 7", alae 4½", caudae 2", maxillae 8½", tarsi 3". Habitat in *Brasiliae* provincia *Para* (*Mus. Berol.*, *Paris.*; duas vivas vidi).

#### δ. Rectricibus apice obtusis.

8. *Ps. Swindereniana.* Capitis pileus et nucha splendide viridia, haec fasciola nigra terminata; dorsum, tergum alaeque supra toto saturate viridia; pectus ac totum collum viridi-olivacea; uropygium caudaeque tectrices superiores azurea; facies, abdomen ac cris-

sum flavescenti-viridia; rectrices duae intermediae toto saturate virides; reliquae prima medietate cinnabarinae, reliqua parte saturate virides, exclusa fasciola obliqua rubrum colorem terminante nigra; rectricum pars inferior apicalis coeruleascens; remigum pogonium internum nigrum. *Av. adult.*

*Psittacus Swinderenianus* *Huhl* l. c. p. 62. n. 104 tab. 2 (fig. bona).

Rostrum, pedes unguesque nigra; regio ophthalmica plumosa; cauda brevis, subaequalis; alae longae, cum apice caudae finem attingentes. Habitus et magnitudo *Psittaculae pullariae*. Longitudo  $6\frac{1}{2}$ "", caudae fere  $1\frac{1}{4}$ "", alae  $3\frac{1}{4}$ ". Habitat, ut dicitur, in *Africa meridionali*. *Huhl*. Non vidi.

9. *Ps. pullaria*. Frons, sinciput, lora, gula hujusque latera roseo-coccinea; uropygium cyaneum; *tectrices alarum inferiores velutino-nigrae*; flexura alae nigra, paullo cyaneo-varia; carpi margo flavus, albo- et cyaneo-variolosus; remiges omnes subtus et intus nigrae, extus supra virides; *rectrices* quatuor intermediae toto virides, apice subflavae; reliquae supra et subtus basi virescenti-flavae, medio eleganter cinnabarinae; fascia subsequente, colorem rubrum terminante nigra subobliqua notatae, *apice laete flavo-virescentes*; *caudae tectrices superiores* laete flavido-virides; penna scapulares, alarum *tectrices superiores omnes*, tergum, dorsum, collum posticum ac laterale, occiput et vertex laete viridia; capitis latera ac gastracum totum virescentia. *Adult.*

*Psittacus minimus* *Clus*. *Exotic.* p. 365. c. fig. *The little red-headed Parroquet* *Edw*, l. c. t. 237 (fig. mediocr.). *Psittacula guineensis* *Brisson*, 4. p. 387. *Petite Perruche mâle de Guinée* *Buff.* Pl. enl. 60 (fig. mediocr.). *Psittacus pullarius* *Auctor.*

*Juvenis (et Foemina?)*. Avi adultae similis, exceptis tectricibus alarum inferioribus ac margine carpi viridibus; capistrum solum ac mentum roseo-rubra, nonnihil in aurantio-rubrum vergentia.

Rostrum roseo-rubrum; irides fusco-atrae; regio ophthalmica, imo palpebrarum margo plumosa; pedes pallide ex incarnato-plumbei; ungues pallidi; cauda brevis, subaequalis; alae magnae, cum fine caudae apicem attingentes. Longitudo 5" 10"', alae 3 1/2", caudae 1 3/4", maxilla 7 1/2"', tarsi 4"'. Habitat satis frequens in India orientali, mare foeminaque semper consociatis. Mus. (Paris., Berol., Monac.; multos vivos vidi.)

*Observatio*. *Psittaculae roseicolli* proxima, ab hac characteribus exhibitis satis diversa.

10. *Ps. roseicollis*. Frons, sinciput ac superciliarum regio rubra; genae ac jugulum dilute rosea; uropygium caudaeque tectrices superiores laete azurea; rectrices duae intermediae, capitis pars reliqua, collum posticum, dorsum, tergum alaeque supra, pectus ac omnes corporis partes inferiores virescentia, hae superioribus dilutiores; tectrices alarum inferiores coerulescenti-virides; rectrices reliquae a basi fere usque ad medium rubrae, fascia subsequente atra notatae, apice coeruleo-virescentes, pogonio externo virides. Mas adult.

*Psittacus pullarius* var.  $\beta$  Linn., *Lichtenst.* Catal. rer. nat. rariss. Hamb. 1793. p. 7. n. 74, *Meyer* Zool. Annal. Bd. I. p. 141.

*Psittacus roseicollis* Vieill. N. D. 25. p. 377. *Id.* Encycl. meth. Livr. 93. p. 1408, *Kuhl* l. c. p. 63.

Habitus *Psittaculae pullariae* simillimae; rostrum validum pedesque incarnata. Longitudo 6". Habitat satis frequens ad Caput bonae spei (Mus. Paris.)

11. *Ps. batavensis*. Laete viridis; frons ad latera, lora, genae et mentum cinnabarina; vertex et occiput violaceo-coerulea; alarum tectrices inferiores eleganter coeruleae; remiges intus nigrae; crissi plumae apice paullo coerulescentes; venter pro vario ad lucem objectu nonnihil in coeruleum vergens; maxilla rubra, apice flavida; mandibula obscure rubicundo-fusca. *Mas et Foem. adult.*

*Psittacus batavensis* Lath., Kuhl. Perroquet Geoffroy Le Vaill. l. c. p. 68. t. 112 (fig. opt.). *Psittacus personatus* Shaw. Gen. Zool. 8. §. 2. p. 544. *Psittacus Geoffroyanus* Vieill. N. D. 25. p. 311. *Psittacus Geoffroyi* Kuhl l. c. p. 85. n. 151.

*Juvenis.* Ptilosis tota viridis, exceptis alarum tectricibus inferioribus coeruleis; rostrum nonnihil in fuscum vergens.

*Avis junior adultae ptilosi se induens.* Ptilosis avis juvenilis, genae rubro-variolosae.

*Le Vaill.* l. c. t. 113.

Cauda mediocris, subaequalis; pedes nigricantes; corpus validum. Longitudo  $11\frac{3}{4}$ " , caudae 4". Habitat, ut dicitur, in insula *Java* et satis frequens in *Nova Hollandia australi* (*Mus. Paris.*).

*Observatio.* *Lathamii* descriptio *Psittaci batavensis* manca sine dubio ex icone, ad specimen junius, rostro adhuc obscuro exstructum, elaborata.

12. *Ps. Tovi*. Pileus ac totum notaeum, inclusis caudae tectricibus superioribus pennisque scapularibus, eleganter viridia; jugulum viride, nonnihil in obscure flavum vergens, hujus pars inferior et pectus viridi-lutea; gula macula exigua rotunda aurantia notata; alarum tectrices superiores minores jugulo concolores; harum mediae castaneo-aureae, nonnihil in viride vergentes, taeniam in ala latam



transversam efficientes, majores a trunco remotiores prasinæ, corpori proximæ virides, paullum ad luteum inclinantes, inferiores eleganter luteæ; venter, latera, crura et crissum dilute viridia, nonnihil ad luteum inclinantia; remiges subtus dilute virides, juxta rhachin saturate cinereæ, primariæ supra prasinæ, secundariæ viridi-luteæ, omnium rhachis nigra; rectrices virides, limbo interno subluteo.

*Psittacula gutture luteo* *Briss.* Ornith. 4. p. 396. t. 30. f. 3.  
*Psittacus Tovi* *Gmel.*, *Psittacus Tovi* *Lath.*

Rostrum dilute griseum; pedes unguesque grisei; cauda brevis, subaequalis. Longitudo  $6\frac{3}{4}$ "", pedis  $4\frac{1}{2}$ "", maxillæ ad oris angulum  $7\frac{1}{2}$ "", ejusdem crassities 8"". Habitat . . . (*Brisson*).

*Observatio.* Species sane distincta, a *Brissonio* ad naturam descripta, a *Ruhlio* non indicata; nam *Psittacus Tovi* (v. *Sitt. Tuipara*) quam citat, innititur solum icone Buffoniana (Pl. enl. n. 190. f. 1), quæ a *Gmelino* ac *Lathamio* huic avi falso annumeratur.

13. *Ps. cana.* Caput ac collum totum pectusque albescenti-cana, pro vario ad lucem objectu violaceo-reflectentia; dorsum, tergum, uropygium, caudæ et alarum tectrices superiores, nec non pennæ scapulares viridia; epigastrium, venter, tibiæ crissumque dilute viridia; tectrices alarum inferiores nigrae; remiges intus et subtus nigricantes, extus strictissime flavido-marginatæ; rectrices virides, omnes ante apicem fascia lata nigra notatæ, laterales pogonio interno versus basin flavidæ. *Mas adult.*

*Psittacula madagascariensis* *Briss.* 4. p. 394. t. 30. f. 2.  
*Petite Perruche de Madagascar* *Buff.* Pl. enl. 791. fig. 2 (*fig. valde mediocr.*). *Psittacus canus* *Auctor.*, *Shaw.* Nat. Misc. t. 425. *Psittacus poliocar* *R. Forster* Icon. inedit. tab. 51.

*Foemina adult.* Mari similis; caput et collum viridia; caput collo dilutius.

*Avis hornot.* Foeminae similis; ptiloseos pictura quam in hac minus pura.

*Avis junior adultae ptilosi se induens.* Caput solum canescenti-album, viridi-variegatum.

Rostrum pedesque canescentia, illud basi plumbeum; regio ophthalmica tota plumosa; ungues diluti; irides perlaceo-albae; cauda longula subcuneata, rectricibus obtuse acuminatis. Habitus *Psittaculae pullariae*. Longitudo  $5\frac{3}{4}$ " , caudae fere 2" , alae  $3\frac{1}{2}$ " , maxillae  $6\frac{1}{4}$ " . Habitat in insula *Madagascar, St. Mauritii et St. Francisci.* (*Mus. Berol., Paris.*)

14. *Ps. Galgulus.* Laete viridis; verticis macula subrotunda cyanea; cervix fascia eleganter aurantia notata; tergum flavum, uropygium, caudae tectrices superiores (rectricum apicem attingentes) jugulique macula maxima coccinea; remiges apice obscurae, pogonio interno nigrae, subtus glaucae; alarum tectrices inferiores ac superiores omnes, remiges extus et caudae pagina superior virides, hujus latus inferius turcino-coeruleum; rostrum atrum; pedes nigricantes.  
*Mas adultus.*

*The sapphire-crowned Parrakeet* Edw. 2. t. 177 (*fig. opt.*).  
*Petite Perruche du Pérou* Buff. Pl. enl. 190. fig. 1 (*fig. non satis accurat.*), *Sonner. Voy. à la Nouv. Guin.* p. 76. t. 38 (*fig. infer.*). *Psittacus Galgulus (exclusa varietate β)* Auctor., *Kuhl* l. c. p. 64. n. 106.

*Foem.* Viridis; vertex cyaneus; uropygium caudaeque tectrices superiores coccinea; rostrum et pedes rubicunda.

*Avicula ex Malacca insula* Aldrov. Av. T. III. p. 560. *Psittacula malaccensis* Briss. IV. p. 386.

*Mas junior.* Viridis; uropygium caudaeque tectrices superiores coccinea; juguli macula magna fulva; rostrum rubicundum, maxillae apice nigricans. (*Mus. Berol.*)

*Sapphire crowned Parrakeet Female (?) Lath. Synops. 1.*  
p. 313.

*Juvenis.* Viridis; gastraei viredo ad flavidum vergens; uropygium et caudae tectrices superiores elongatae, rectricum apicem attingentes, intense coccinea; rostrum rubicundum; pedes incarnati, unguibus pallidis.

*Psittacus vernalis Sparrm. Mus. Carls. t. 29, Lath., Kuhl.*  
I. c. p. 65. n. 108.

*Av. hornot.* Pallide viridis; uropygii plumae pallide coccineae, basi virides; tectrices caudae superiores pallide coccineae, rectricum medium attingentes; hae stricte flavido-terminatae; rostrum pallide rubicundum.

Rostrum pusillum, dente obsoleto auctum; regio ophthalmica nudiuscula; alae fere caudae apicem attingentes; cauda brevis, fere aequalis. Longitudo  $4\frac{1}{4}$ " , alae  $2''\ 11'''$ , caudae  $1''\ 5'''$ , tarsi  $3\frac{1}{4}'''$ . Habitat satis frequens in insulis *Java*, *Timor* et *Sumatra*, Javanis *Silindit*, sive *Silinditun*, *Sumatranis Serindit* dicta. Pede altero suspensus dormit. (*Mus. Paris., Berol., Monac.*)

*Observatio.* Auctorum varietas  $\beta$ . *Psittaci Galguli* spectat sequentem speciem.

15. *Ps. Culacissi.* Frontis macula magna, jugulum et pectus ex parte, uropygium caudaeque tectrices superiores coccinea; fascia nuchae aurantio-rubra; capitis partes reliquae flavido-virides; collum supra et ad latera, dorsum, tergum, pennae scapulares, tectrices alarum superiores omnes remigumque pogonium externum viridia; cris-

sum et reliquae corporis partes inferiores dorsi colore, tamen paullo dilutiore, nonnihil ad flavidum vergentia; remigum pogonium internum coeruleo-beryllinum, nigro-limbatum; alarum tectrices inferiores majores viridi-coeruleae; rectrices supra virides, subtus coeruleo-beryllinae. *Mas adult.*

*Psittacula philippensis* Briss. 4. p. 392. t. 30. f. 1 (*descript. opt.*). *Perruche mâle des Philippines* Buff. Pl. enl. 520. f. 1 (*fig. sat. accurat.*). *Sonnerat* Voy. à la Nouv. Guin. p. 76. 4ième espèce (*solum descriptio foeminae*) t. 40. fig. sup. *Psittacus Galgulus* var.  $\beta$ . *Gmel., Lath. Psittacus minor* (*solum foeminae descriptio*) *Gmel., Lath., Vieill. N. D. et Encycl. Livr. 93. Psittacus Coulacissi* *Vieill. l. c. p. 1405. t. 130. f. 1. Psittacus philippensis* *Huhl l. c. p. 64. n. 107 (descript. manca).*

*Foemina adulta.* Mari similis, frons solummodo, uropygium caudaeque tectrices superiores coccinea; jugulum virescens; nucha absque fascia, toto viridis; regio rostrum inter et oculos viridi-coerulea.

*Psittacula rubrifrons* *Vigors. Philos. Mag. 1831. p. 147.*

Rostrum rubrum; regio ophthalmica parum nuda; irides flavae; pedes ungueque rubicundi; caudae tectrices superiores quam in praecedente specie multo breviores; cauda brevis, subaequalis. Longitudo 4" 9½", caudae 1½", tarsi fere 5". Habitat in insulis *Philippinis*, inquilinis *Culacissi* dicta.

16. *Ps. minor.* Caput et collum livide virescentia; illud supra totum rubrum; jugulum coeruleum; collum posticum, pennae scapulares, dorsum, alarum tectrices superiores omnes, remigum pogonium externum ac cauda supra obscure viridia; remiges et rectrices subtus coeruleo-beryllinae, illae supra interno pogonio nigrae; corporis partes inferiores omnes laete flavescenti-virides; uropygium caudaeque tectrices superiores, rectricum medium attingentes, pur-

pureo - rubra; rostrum totum nigrum; pedes fusciscentes. *Mus adult.*

*The smallest green and red indian Paroquet* Edw. I. t. 6 (fig. satis accurat.). *Sonner. Voy. à la Nouv. Guin.* p. 76. 4ième espèce (solum descriptio maris). *Psittacus minor* Gmel., *Lath. Vieill.* (exclusa descriptione foeminae), *Encycl. meth.* Livr. 93. t. 230. f. 5. *Psittacus indicus* Gmel., *Kuhl. l. c.* p. 65. n. 109. *Psittacus asiaticus* *Lath., Vieill.*

*Foemina adulta.* Mari similis; pileus coerulescenti-viridis.

Regio ophthalmica nudiuscula, incarnata; irides flavae; rostrum rubrum absque dente; pedes unguisque pallidè rubicundi; caudae tectrices superiores rectrices prima medietate tegentes; cauda brevis, subaequalis. Habitus et magnitudo speciei praecedentis. Habitat in insula *Luçon* (*Mus. Paris.*).

17. *Ps. Desmarestii.* Frons coccinea; pileus ac occiput flavo-aurantia; fascia juguli lata inferius altera angustiore ferruginea terminata; macula infra oculos ac alarum flexura cyanaeae; capitis pars reliqua, collum anticum ac laterale, crissum caeteraeque gastraei partes flavo-virentia; alae supra, cauda, dorsum totum collumque posticum fusco-viridia; remiges subtus pogonio interno nigrae, externo virides, strictissime flavido-marginatae, secundariae latere interno nigrae, macula in margine flava, in tertiariis sensim in aurantium vergente notatae.

*Psittacula Desmarestii* *Lesson et Garnot Dupperry* *Voy. aut. du monde.* Part. Zool. t. 35. *Less. Man. d'Ornith.* II. p. 149.

Rostrum validum pedesque validiusculi nigra; facies tota plumosa; cauda in statu complicato conica; hujus tectrices superiores

rectricum primam medietatem longitudine aequantes. Longitudo  $8\frac{1}{2}$ ". Habitat in *Nova-Guinea*, in sylvis densis portui *Dorery* confinibus. *Lesson*. (Non vidi.)

18. *Ps. malaccensis*. Rostrum maximum, maxilla aurantio-rubra, mandibula lilacino-grisea; frons ac vertex, uropygium caudaeque tectrices superiores nitide coeruleae; alarum tectrices inferiores et epigastrii latera coccinea; alulae pennae viridi-coeruleae; facies, collum laterale ac pectus cinerascenti-viridia; dorsum obscure viride, nigro-reflectens; reliquae corporis partes inferiores virides; tectrices alarum superiores saturate virides, flavo-marginatae; remiges nigrae, extus coeruleo virides; rectrices duae intermediae toto virides, reliquae flavae, viridi-limbatae, subtus flavae, rhachi nigra. *Av. adult.*

*Petit Perroquet de Malacca Sonner. Voy. aux Ind. 2. p. 212. Psittacus malaccensis Lath., sed non Gmel., qui est Pal. malac. Kuhl. l. c. p. 67. n. 114., Swains. Zoologic. Illustr. t. 154 (fig. bona). Psittacus incertus Shaw. Nat. Misc. t. 769, Kuhl. l. c. p. 68. n. 115. Psittacus macropterus in Mus. Paris.*

Maxillae apex perquam longus ac deductus, lateraliter profunde emarginatus; regio ophthalmica plumosa; irides rubrae; alae maximae, caudae apicem fere excedentes; pedes obscuri; cauda brevis, subaequalis. Longitudo  $5'' 9'''$ , caudae  $1'' 5'''$ . Habitat in *Malacca*. Habitus *Psittaculae melanopterae*. (*Mus. Paris.*)

*Observatio. Shawii* tabulam a cl. *Kuhl* laudatam nondum vidi, *Kuhlii* vero descriptio *Psittaci incerti* ad avem hic exhibitam omnino quadrat.

19. *Ps. torquata*. Ptilosis tota laete viridis; partes corporis superiores gastraeo obscuriores; hoc nonnihil in flavidum vergens; collum posticum fascia e plumis dilute flavis, nigro-marginatis composita insigne. *Mas.*

*Les petites Perruches à collier de l'isle de Luçon Sonner. Voy. à la Nouv. Guin. p. 77. t. 39. Psittacus torquatus Gmel., Lath., Kuhl.*

*Foemina.* Mari similis, exceptis plumis fasciae in collo coeruleis, nigro-marginatis.

Habitus et magnitudo *Psittaculae passerinae*; cauda brevis, subaequalis; rostrum pedesque griseo-nigricantia; irides nigricantes. Habitat in insula *Luçon* (*Sonner.*). Avis a me nusquam visa.

XIX. Genus. *Nasiterna.* Pag. 36.

1. *N. pygmaea.* Notaeum totum intense, gastraeum flavido-viride; capitis latera in flavidum vergentia; remiges nigrae, pogonio externo stricte viridi-flavo-marginatae; rectrices supra (an omnes?) viridi coeruleae, subtus nigrae, in apice pogonii interni macula viridiflava notatae; rectricum rhachis in cirrum brevem nudum desinens; rostrum obscure incarnatum. *Mas.*

*Perruche Pygmée Quoy et Gaim. in D'Urville Voy. de la Corv. l'Astrol. Trois. div. Ois. t. 21. f. 1 (f. 3—4. rostr.).*

*Foemina.* Mari similis, pilosi pallidiore; rectrices cirrosae supra virides, duae (?) mediae coeruleae; rostrum pallidum, versus basin obscurum.

*Quoy et Gaim. l. c. f. 2.*

Pedes incarnati, unguibus pallidis; digitus posticus externus prae longus; regio periorbitalis tota plumosa; maxillae apex supra hunc mandibulae multum porrectus, attenuatus, acutissimus, parum curvatus, incisura profunda rectangula ad latera tomiorum formatus et culmine distincto compresso ad frontem desinente insignis; mandibula majuscula, subcompressa, utrinque ante apicem profunde si-

nuata; ejus apex angulo incisurae illi in maxilla recto oppositus; caena brevis, rotundata, alis fere tecta; rectrices apice rotundatae; harum rhachis in utroque sexu in cirrum brevem nudum excurrens. Habitus *Psittaculae passerinae*, eadem minor. *Psittacorum* hoc tempore notorum minimus. Longitudo 3" 2". Habitat in *Nova-Guinea*.

*Observatio.* Descriptio mea hujus avis ex iconibus supra citatis.

XX. Genus. *Triclaria*. Pag. 37.

1. *Tr. cyanogastra*. Ptilosis intense ac laete herbaceo-viridis; macula a ventris medio usque ad crissum ducta (attamen hoc non obtegens) laete cyanea, pro vario ad lucem objectu nonnihil in liliacinum vergens; rectrices et remiges latere inferiori malachitaceo-virides; remigum pogonium internum supra nigrum, versus rhachin virescens, externum viride; rectrix extrema extus latere superiore, praesertim versus basin, rectrices reliquae apice cyanae, intermediae fere toto virides; tectrices alarum inferiores dorso concolores; rostrum album, versus basin vix conspicue fuscescenti-nebulatum. *Mas adult.*

*Psittacus cyanogaster Vieill.* N. D. 25. p. 328. *Id.* Encycl. meth. Livr. 93. p. 1375., *Max v. Wied* Reise n. Bras. 1. p. 263., *Kuhl.* Consp. p. 71.

*Foemina.* Mari simillima absque macula abdominis cyanea; abdomen totum reliquis trunci partibus concolor; rostrum totum album.

*Psittacus malachitaceus Spix* Av. Bras. 1. t. 28 (*fig. bona*).

*Juv. viril.* Foeminae similis, plumarum color minus intensus ac nitidus.

Rostrum albicans culmen angustum, angulosum; cera nigricans;



pedes cinerei, unguis nigricantes; cauda longiuscula, aequalis, exclusa rectrice extima reliquis reatricibus paullo brevior; regio periophthalmica parum nuda. Longitudo  $11\frac{1}{4}$ "", alae  $5'' 10'''$ , maxillae  $13\frac{1}{2}'''$ , caudae  $4'' 10'''$ , tarsi  $6'''$ . Habitat in *Brasilia* non infrequens (*Mus. Paris., Berol., Monac.*).

XXI. Genus. *Sittace*. Pag. 37.

1. *S. Tuipara*. Viridis; pileus coerulescens; frontis fasciola stricta, menti supremi macula pusilla alulaeque pennae toto isabellino-rubrae; remiges nigrae, longitudinaliter juxta rhachin cyanae; margine externo virides, subtus nitide halichlorae; rectrices toto virides, limbo interno vix flavidae, subtus pro vario ad lucem objectu glauco-reflectentes; tectrices alarum inferiores virides; rostrum totum album, culmine compresso acuto: *Av. adult.*

*Tuipara Marcgr.* Hist. rer. nat. Bras. Lib. IX. p. 206 (*Lichtenst.* l. c. p. 167.) *Psittacus Tuipara* Linn., Gmel., Lath. *The golden-winged Parrakeet* Edw. 2. p. 177. t. 293. f. 2 (*fig. mala e specimine domefacto*). *Psittacus chrysopterus* Gmel., Lath. *La Perruche à tâche souci, mâle* Le Vaill. l. c. p. 117. t. 58 (*fig. non satis accur.*). *Psittacus Sosove* Bechst. in Lath. Uebers. p. 86. n. 105. *Kuhl* l. c. p. 27. n. 28. *variet.* (*sed non Gmel. et Lath.*). *Psittacus calthopticus* Vieill. N. D. 25. p. 369. *Psittacus cajennensis* Swains. Zool. Illustr. 1. t. 1 (*fig. mediocr.*).

*Avis junior.* Avi adultae similis, alulae pennae virides aut isabellino-rubro-variae; macula menti sordide aurantia; frontis vitta fuscescens, strictissima.

*Petite Perruche à gorge jaune d'Amerique* Buff. Pl. enl. 190. f. 1 (*fig. mala ab auctoribus false ad Psittacum Tovi relata*), *Le Vaill.* l. c. t. 59. *Psittacus Sosove* Kuhl.

Regio ophthalmica parum nuda; cauda longula, conica; pedes pallide fusci, unguibus dilute corneis. Habitus *Sit. virescentis*. Longitudo 7" 4"', alae 4 $\frac{3}{4}$ ", caudae 3", maxillae 11". Habitat in *Brasilia, Guiana, Cajenna*; nidificat, fide *Marcgrave*, in cumulis a formicis relictis, qui in arboribus reperiuntur. (*Mus. Paris., Berol.*).

*Observationes.* Auctorum *Psittacus Sosove*, speciei huic similis, sed in crisso uropygioque flavus, ac sine frontis striola et macula menti, mihi prorsus ignotus. *Edwardsi* icon *Psittaci chrysopteri* e specimine domefacto in quo remiges secundariae flavae; specimē vivum simili modo coloratum ipse vidi.

2. *S. Tui*. Frons et sinciput lutea; capitis pars reliqua, collum posticum ac laterale viridia, ad malachitaceum nonnihil vergentia; jugulum cum reliqua gastraei parte, alarum tectrices inferiores, caudae superiores, uropygium ac tergum flavido-virescentia; dorsum, pennae scapulares et alarum tectrices superiores omnes intense viridia; alulae pennae et remiges supra intense viridia, vix coeruleonitentes; hae latere superiore interno nigricantes, ibidem latere inferiori malachitaceae, externo nigricantes; rectrices omnes subtus flavido-virescentes, supra pogonio interno flavidae, limbo externo virescente, versus intermedias rectrices toto virides sensim obscuriore. *Mas. adult.*

*Tui*, quarta species. *Marcgr.* Hist. Rer. nat. Bras. Lib. IX. p. 206, *Lichtenst.* l. c. p. 167. *Petite Perruche de l'isle de St. Thomas Buff.* Pl. enl. 456. f. 1 (*fig. mediocr.*). *Psittacus Tui* Auctor. (*descriptio plurimor. inaccurat.*). *La Perruche Tui Le Vaill.* l. c. p. 133. t. 70 (*fig. et descript. opt.*).

*Foemina et avis junior.* Mari similis; ptiloseos pictura quam in hoc minus intensa; caput et collum posticum dorsi colore; rostrum totum corneo-fuscum.

Rostrum corneo-brunneum, apice paullo albidum; orbitalium regio parum nuda, flavida (?); rostri cera diluta; pedes incarnati, unguibus fuscescentibus; cauda breviuscula conica. Longitudo 7", alae 4", maxillae 9"', caudae 2" 5"', tarsi 4 $\frac{1}{2}$ ". Habitat in *Cajenna, Brasilia*, ac, ut dicitur, in *insula St. Thomae*. (*Mus. Paris., Berol., Monac.*).

3. *S. xanthoptera*. Ptilosis viridis; gastraeum dilutius quam notaeum; tectrices alarum superiores majores externae intense luteae; alulae pennae versus apicem cyaneae; *remiges omnes* intense virides, limbo interno nigrae, subtus limbo externo nigrae, interno malachitaceae; margo remigis primae externus paullo in coeruleum vergens; rectrices subtus flavido-virescentes, pro vario ad lucem objectu malachitaceo - resplendentes; margo superior internus strictissimus flavidus; tectrices alarum inferiores abdominis colore. *Mas et Foem. adult.*

*Aratinga xanthopterus* *Spix*. Av. Bras. 1. t. 15. f. 2 (*fig. bona*).

*Avis pulla*. Avi adultae simillima; ptiloseos viredo et tetricum flavedo minus intensae; cauda brevis, alas vix aut parum transcendens; rectrices in flavidum vergentes; remigum pogonium externum subtiliter flavo-marginatum; alulae pennae parum in coeruleum vergentes; rostrum culmine et apice albidum, reliqua parte corneo-fuscescens.

*Psittacus xanthopterygius* ♂ *Spix* l. c. t. 34. f. 1 (*fig. mediocr.*).

Habitus et magnitudo *Sit. virescentis*; rostrum incarnato-fuscescens; irides fusco-atrae; regio circa oculos parum nuda ac cera albedo-incarnatae; lora plumosa; pedes incarnati, unguibus corneo-fuscescentibus; cauda elongata, lanceolata. Longitudo 8 $\frac{1}{4}$ "

fere 9<sup>'''</sup>, alae 4½<sup>''</sup>, tarsi 5<sup>'''</sup>. Habitat in *Brasilia* versus flumen Amazonum. (*Mus. Monac.*)

*Observationes.* *Spixii Psittaculus xanthopterygius foemina* ad hornotinum *Psittaculam passerinam* referri debet. — A *Sit. virescente* primo adpectu simillima rostro validiori ac alarum pictura haec species satis discedit.

4. *S. virescens.* Ptilosis viridis, in gastraeo quam in nota eo dilutior; alarum tectrices superiores majores citrino-flavae, basi albae, inferiores pallide virescentes; remiges secundariae albae, margine apicali nigricanti-virescentes, extus subtiliter flavido-indutae; penultima extus flavae, intus albae, in medio longitudinaliter virescenti-tinctae; primariae intus nigrae, juxta rhachin vix virescenti-lavatae, extus coerulescenti-virides; remix quarta aut sexta intus maxima ex parte alba, versus apicem viridi-nigricans; alulae pennae in coeruleum vergentes; alae subtus malachitaceo-relucentes; cauda supra dorso concolor, subtus malachitaceo-virescens. *Mas et Foem. adult.*

*Psittaca cayennensis* *Briss.* Av. 4. p. 334. t. 27. f. 2 (*descript. opt.*). *Petite Perruche verte de Cajenne Buff.* Pl. enl. 359 (*fig. pessim.*). *Psittacus virescens* *Auctor.*, *Perruche à ailes variées* *Le Vaill.* l. c. t. 57 (*fig. sat. accurat.*). *Le Maracana aux ailes jaunes* *Azar.* Voy. n. 283. *Psittacus Chiriri Vieill.* N. D. 25. p. 359.

Regio circa orbitas ac lora nudiuscula, albida; rostrum perquam compressum, totum albidum; cera albida; pedes pallide incarnati, unguibus dilute corneis; irides fusco-atrae; cauda elongata, lanceolata. Longitudo 8½<sup>''</sup>, caudae solius 3½<sup>''</sup>, rostri ad frontem 9½<sup>'''</sup>, alae 4¼<sup>''</sup>, tarsi vix 5<sup>'''</sup>. Habitat satis frequens in *Cajenna* ac *Brasilia*, rarior in *Paraguay*, in Europa facile hospitans mansuescit. (*Mus. Paris., Berol., Monac.; multos vivos vidi.*)

*Observatio.* Auctorum *Psittacus chrysopterus* a cls. *Le Vaillant* et *Kuhl* cum *Psittaco virescente* unitus spectat *Sit. Tuipara*. Species haec caveis inclusa circa rostri basin canescit.

5. *S. Tirica*. Ptilosis viridis, in gastraeo dilutior quam in notaeo; remiges primariae intus nigrae, extus juxta rhachin cyanae, margine virescentes, secundariae extus ejusdem coloris, intus subcyanae, apice virides; tectrices alarum superiores majores (pone alulasitae) cyanae, inferiores flavidae; rectrices supra et subtus virides, paullo malachitaceo-nitentes; remigum limbus inferior internus pallide malachitaceus; pedes pallide rosei; regio ophthalmica parum nuda. *Mas et Foem. adult.*

*Psittacus rufirostris* Illig., *Lichtenst.* Abh. d. Berl. Akad. 1815 — 16. p. 167. *Psittacus viridissimus* Kuhl. l. c. p. 25. n. 24. *Aratinga acutirostris* Spix Av. Bras. 1. t. 15. f. 1 (*fig. bona*).

*Avis pulla*. Avi adultae similis, ptiloseos viredo minus saturata, cauda plus minusve brevis; rostrum et pedes avis adultae.

*Petite Perruche apellée la petite Jaseuse* Buff. Pl. enl. 837 (*fig. accur.*). *Psittacus Tirica* Gmel., *Lāth.*

Rostrum incarnato-fuscescens; cera ac regio ophthalmica nuda alba, vix coeruleo-lavatae; regio circa rostri basin plumosa; ungues albido-fuscescentes; irides intense fuscae; cauda elongata, admodum gradata, lanceolata. Habitus et magnitudo *Sit. virescentis*. Longitudo 9 $\frac{1}{4}$ "", caudae 4 $\frac{3}{4}$ "", alae 3" 11"', rostri ad frontem 10"', tarsi 4 $\frac{1}{2}$ "'. Habitat satis frequens in *Brasilia*; facile mansuescens sed indocilis. (*Mus. Paris., Berol., Monac.; multos vivos vidi.*)

*Observationes.* Huc sane pertinere videtur *Marcgravei* „*Tui, prima species*“ l. c. p. 206. Vide *Lichtenst.* l. c. — Citatur a cl. *Kuhl* auctorum varietas *Psittaci rufirostris*, quae, quoad

descriptionis partem maximam, ad *Marcgravei Aiuru-catinga* (*Sit. Macavuana*) spectat (vide *Sit. Macav.*): *Marcgravei Tirica* spectat foeminam *Psittaculae passerinae* (vide *Lichtenst.* „Die Werke *Marcgr.*“ in den Abh. d. Berl. Ak. d. Wiss. Jahrg. 1815—16. S. 167).

6. *S. euops*. Tab. XXIV. Fig. 2. Ptilosis laete viridis, in gastraeo paullo dilutior quam in nota eo; alarum margo totus ac earum tectrices inferiores minores omnes coccinea; remiges subtus nigrae, pogonio interno flavido-reflectentes, extus superiori latere saturate virides, ad coeruleum parum vergentes, intus nigrae; suffrago vix conspicue rubicundus; cauda supra tota viridis, subtus flavescens. *Av. adult.*

*Avis senilis.* Avi descriptae simillima, vertex et nucha plumis singulis coccineis variegata.

Rostrum totum incarnato-albidum, breve, crassum, intumidum, laevissimum; mandibula praesertim valida ac rotundata; maxillae apex acutus, lateraliter sinuatus, culmine ad basin subanguloso; regio periophthalmica stricte nuda, ex griseo-alba; irides ex annulis duobus compositae, quorum internus pupillam cingens pallide, externus strictissimus saturate isabellinus; cera pallide rosea; pedes robusti, incarnati, unguibus corneo-nigris; cauda elongata gradato-lanceolata. *Habitus Sit. Tirica*, eadem paullo major, robustior; sedens sive ambulans avis haec agilis semper corpus deorsum mittit iterumque in altum extollit. Habitat in *America* (quatuor vivas Monachii vidi, quarum unam depingi curavi.)

*Observatio.* Cum *Linnaei Psittaco nobili* non confundenda, qui, fide *Linnaeo*, *Turturis* magnitudine, genas nudas habet.

7. *S. murina*. Viridis; frons et vertex, lora, genarum pars anterior, collum anticum, totum pectus et epigastrium dilute grisea; margo plumarum in pectore pallide virens; alulae pennae et remiges

cyanae, hac extus strictissime virenti-marginatae, pogonio interno nigrae, subtus glauco-reflectentes; abdomen griseum, viridi-indutum; crissum et alarum tectrices inferiores viridia; rectrices virides, juxta rhachin nonnihil in coeruleum vergentes, subtus glauco-reflectentes; rostrum supra culmen admodum dilatatum ac rotundatum, breve, albedo-corneum. *Mas et Foem. adult.*

*Perruche à poitrine grise Buff. Pl. enl. 768 (fig. mediocr.).*  
*Psittacus murinus Auctor. La Perruche souris Le Vaill. l. c. t. 38 (fig. pessima). La jeune veuve Azar. Voy. n. 282.*  
*Psittacus Cotorra Vieill. N. D. 25. p. 362.*

*Abis junior.* Pileus viridis; genae ac collum supremum plus minusve grisea, hujus plumae albedo-marginatae; rectrices pogonio interno flavidae.

*La Perruche à joues grises Le Vaill. l. c. p. 129. t. 67.*  
*Psittacus buccalis Bechst. in Lath. Uebers. d. Vög., Kuhl l. c.*  
*Psittacus cinereicollis Vieill. l. c.*

Facies plumosa, macula pone oculos parva, nuda; oculi minimi, iride fusco-nigra; pedes olivaceo-plumbei; cauda longa admodum gradata, lanceolata. Longitudo  $10\frac{1}{2}$ " , rostri ad frontem 9" , alae  $5\frac{3}{4}$ " , caudae  $4\frac{3}{4}$ " . Habitat in *Brasilia* (*Montevideo* et *Paraguay*), quoque in Buenos Ayres. Struit nidum globosum in arboribus e ramulis spinosis  $3\frac{1}{2}$ ' latum, intus herbis viridibus stratum, ad latera, ut nidus *Picae*, introitu instructum. Foeminae plures interdum, ut dicitur, in uno eodemque nido ovis (3—4) incubant; nidi saltem in una arbore, aut in arboribus vicinis, magno numero et tam arcte sibi adpropinquati struuntur, ut se invicem attingant. Potandi causa Psittaci hi locos inundatos, praeterea campos ac plantationes petunt; reliquis congeneribus melius incedunt. Libidinosi sunt, agiles ac dociles. Foeminae captae non raro ova pariunt. Au-

dit *Cotorra* apud inquilinas in Buenos Ayres *Azar*. (*Mus. Paris., Berol.*; multas vivas adultas, sed nullas juveniles vidi).

*Observationes.* *Swainsonii Psittacus murinus* (Zool. Illustr. n. 18. t. 89) species distincta esse videtur, quae de *Sit. murina* nostra „loris, genis, regione parotica, mento ac toto collo antico coerulescenti-cinereis, fronte verticeque virenti-coeruleis, rectricum apice coerulescente et rostro intense cinereo“ discedit. Avis haec „*Sit. canicollis*“ vocari possit. — *Vigorsii Psittacara nana* (Zool. Journ. 1830. p. 272.), viridis fronte, collo antico pectoreque grisescens, 8 1/2" longa, ex *Jamaica* praeter staturam minorem nostrae a *Sit. murinae* non differre videtur. Descriptio hujus avis completior desideratur.

8. *S. leucotis*. Aurium macula albicans; frontis margo, lora ac macula in buccis, secunda in uropygio, tertia in medio abdominis castaneo-purpurina; plumae juguli, colli infimi lateralis pectorisque malachitaceo-virescentes, in apice albido-notatae; pileus fuscus, paululum malachitaceo-variegatus; lunula in cervice subconspicua coerulescens; humeri coccinei; crissum, tibiae et reliquae corporis partes inferiores, dorsum, tergum, uropygii latera, tectrices alarum inferiores ac superiores, pennae scapulares remigesque ultimae sordide viridia; remiges subtus olivaceo-reflectentes, primariae supra pogonio externo coerulescentes, interno olivaceo-nigricantes; cauda tota cupreo-rubra; rectrices supra basi ac intermediae limbo versus basin virides. *Mas et Foem. adult.*

*Psittacus leucotis Lichtenst.* in *Mus. Berol., Kuhl. Consp. Psitt.* p. 21. n. 15.

*Avis junior.* Avi adultae similis; alae ad humeros et in margine virides, plumulis nonnullis sordide coccineis intermixtae; aurium macula alba minus extensa.



*Aratinga Caixana Spix.* Av. Bras. 1. t. 19. f. 1 (fig. sat. accur.). Addas descriptionem *Psittaci nini* p. 34.

Regio ophthalmica parum nuda; rostri basis plumosa; irides ex annulis duobus compositae, quorum internus, pupillam cingens, obscure fuscus, externus aurantius; rostrum corneo-fuscum; cauda elongata, admodum gradata, lanceolata; pedes nigricantes, unguibus fusciscenti-nigricantibus. Longitudo  $8\frac{1}{2}''$ , caudae  $5''\ 7'''$ , alae  $4\frac{1}{2}''$ , rostri ad frontem  $7\frac{1}{2}'''$ , tarsi fere  $4'''$ . Habitat in *Brasilia* satis frequens, cum *Sit. versicolore* simili, majore, in pectore aliter picto non confundenda. (*Mus. Paris., Berol., Monac.*; vivas vidi).

*Observatio.* *Spixii* descriptio *Psittaci Caixana* (l. c. p. 34.) spectat ad *Sit. cactorum*.

9. *S. vittata.* Plumae totius colli antici ac lateralis medii, pectoris epigastriique supremi ex cinereo olivaceo-flavidae, fasciola flavida, antice nigricanti-marginata, terminatae; aurium plumae discretae, longiusculae bruno-albidae; frons fasciola stricta purpureo-castanea, margine anteriore coccinea, notata; plumulae nonnullae prope maxillae basin fuliginosae; macula in buccis, sinciput, pilei pars reliqua, collum posticum, dorsum supremum, pennae scapulares, remiges ultimae, alulae pennae, caudae alarumque tectrices superiores ac inferiores omnes, margo alarum totus, abdomen, hypochondria ac tibiae viridia; macula in ventre magna, dilute purpurea; tergum et uropygium purpureo-irrorata; rectrices subtus toto sanguineo-cupreae, supra pogonio interno sanguineo-cupreae, externo maxima ex parte virides; remiges primariae extus coerulescentes, pogonio interno nigricantes, omnes apice virides, subtus ad olivaceum vergentes. *Mas adult.*

*Aratinga fasciatus Spix* Av. Bras. 1. t. 21. fig. 1 (fig. bona).

*Foemina.* Mari similis; tergum non coccineo-irroratum, obso-

lete purpureo-indutum, abdominis macula minor, pallide coccinea; pectoris ac colli pictura maris, magis ad olivaceum inclinans.

*Perruche Ara à bandeau rouge* *Le Vaill.* l. c. t. 17 (fig. non sat. accur.). *Psittacus vittatus* *Shaw.* Gen. Zool. *Kuhl.* *Psittacus frontalis* *Vieill.* N. D. *Psitt. undulatus* *Illig.* in *Lichtenst.* Berl. Dubl. Verz. S. 7. *Spix* l. c. f. 2 (fig. bona).

*Avis juvenilis.* Avi adultae similis; venter absque macula rubra; genae undulatae. *Kuhl.* (Non vidi).

Regio ophthalmica nudiuscula ac cera albidae; rostrum corneo-fuscum apice dilutius, culmine subobsolete biangulosum; mandibulae pagina antica acie in medio longitudinali subconspicua aucta; pedes unguesque nigricantes; cauda elongata, admodum gradata. Longitudo 10", caudae 5 1/4", alae 5", rostri ad frontem 10", tarsi 4". Habitat in *Brasilia* satis frequens. (*Mus. Paris., Berol., Monac., Eichstaedt.*).

10. *S. lepida.* Caput, collum posticum ac laterale fusca; macula genarum versus frontem et menti latera extensa, viridis, versus apicem inferiorem ac in fronte in malachitaceum vergens; cervix fasciola subdistincta pallide cyanea cincta; regio parotica grisea, plumae colli antici pectorisque pallide malachitaceae, fasciola albida, anterius paullo obscurius marginata, terminatae; crissum malachitaceo-coerulescens; reliquae corporis partes inferiores laete virides, abdomen in medio paullo coccineo-irroratum; alarum margo ac tectrices inferiores sanguineo-coccinea; alulae pennae remigesque primariae et secundariae latere superiori maxima ex parte intense cyanae, apice et margine interno striato, subtus toto fuliginoso-nigricantes; alarum tectrices superiores omnes, remiges tergo proximae, pennae scapulares, dorsum, tergum, uropygium caudaeque tectrices superiores intense viridia; rectrices supra castaneo-purpureae, subtus nigricantes,

pro vario ad lucem objectu in vinaceum vergentes, omnes basi virescentes, intermediae ibidem paullo cyanae. *Av. adult.*

*Psittacus lepidus* Illig. in Mus. Berol. (*Psitt. versicolor* Huhl. Consp. psit. 22. sed solum descriptio avis sic dictae junioris).  
*Aratinga perlatus* Mas. Spix Av. Bras. 1. t. 20. f. 1 (fig. mediocr.).

Habitus et magnitudo *Sit. versicoloris*; cauda elongata admodum gradata; regio ophthalmica solum nuda; rostrum corneo-fuscescens; pedes admodum verruculosi unguesque nigri. Longitudo  $9\frac{1}{2}$ " , caudae  $4\frac{1}{2}$ " , alae  $4''\ 10'''$  , tarsi  $5\frac{1}{4}$ " , digiti externi antici et postici, excluso ungue, 7" . Habitat in Brasilia versus flumen Amazonum. (*Mus. Berol., Monac.*).

*Observatio.* *Spixii* descriptio non satis accurata est. Jugulo speciminis ab eo falso pro mare speciei sequentis descripto plumae virescenti-fuscae avis alienae insertae erant.

11. *S. chlorogenys*. Macula utrinque ad mandibulae basin paullo infra oculos ducta flavido-virescens, fine halichlora; frons fasciola stricta obsoleta purpurino-castanea notata; sinciput ad halichlorum vergens; *capitis plumae reliquae ac totius colli postici murino-fuscescentes, rhachi et apice albido-griseae*; plumae regionis paroticae longiusculae, angustiusculae, *menti totius, colli antici ac pectoris supremi pallide griseae, pro vario ad lucem objectu nonnihil rubicundo-reflectentes, limbo apicali paullo obscuriore, sericeo-nitente*; pectoris latera inferiora, epigastrium ac venter virescentia, hic rubro-conspersus; margo totus carpi antibrachiique nec non tectrices alarum inferiores coccinea; tectrices alarum inferiores majores ac remiges subtus argenteo-nigrae, harum primariae supra pogonio externo cyanae; *secundariae ac alulae penna malachitaceae*, illae limbo interno nigricantes; *cervicis lunula subdistincta*; *tibiae, hypochondria ac crissum pallide malachitaceae*; tec-

trices alarum superiores omnes, remiges tergo proximae ac pennae scapulares, dorsum, tergum, uropygium caudaeque tectrices superiores olivaceo-virides; *rectrices omnes supra purpurino-castaneae, limbo apicali stricto, dilato*, exceptis intermediis ante apicem in halichlorum vergentibus, omnes basi cyaneo-virescentes, subtus nigricantes. *Mas et Foem. adult.*

*Aratinga perlatus, foemina, Spix Av. Bras. 1. t. 20. f. 2 (fig. mediocr.).*

Rostrum mediocriter albicans, nitore argenteo; rostri basis plumosa; regio ophthalmica nudiuscula, diluta; pedes graciliores fusciscentes, digitis admodum longis, unguibus acutissimis, nigris; cauda elongata, modice gradata, lata, rectricibus latis, apice obtusiusculis. Longitudo  $7\frac{3}{4}$ " , caudae  $3'' 7'''$ , alae  $4''$ , digiti antici et postici externi, excluso ungue,  $8'''$ , tarsi  $5'''$ , rostri ad frontem  $8'''$ . Habitat in *Brasilia* ad flumen Amazonum. (*Mus. Monac.*).

*Observatio.* Haec species differt a praecedente, sane simili, statura multo minore, tarsi digitisque longioribus gracilibus, ac signis supra exhibitis.

12. *S. Chiripepè.* Intense viridis; jugulum totum, colli, aurium regio ac abdomen carmelitino-fusca; pectoris pars infima macula rubra notata; macula similis in ventre; cauda supra rubra, flavo-mixta, subtus fere rubra; frons fasciola brunnea signata; alae latere externo coeruleae; remiges subtus fuscae. *Mas et Foem. adult.*

*Le Chiripepè Azar. Voy. n. 281. Psittacus Chiripepè Vieill. l. c. p. 361.*

Rostrum pedesque nigricantia; regio ophthalmica nuda, albida; orbitae fuscae; caput subparvum; oculi magni, iride rufa. Longitudo  $9\frac{3}{4}$ " , caudae  $4\frac{1}{2}$ " , tarsi  $8'''$ . Habitat in *Paraguay*, gregaria aut

per familias, rapidissime volans, ova tria, ut dicitur, in arboribus ca-  
vis pariens; inquilinis *Chiripepé* ac *Aribaga* dicta. *Azara*. (Non  
vidi).

15. *S. melanura*. *Rectrices supra et subtus fuliginoso-ni-  
grae*, pro vario ad lucem objectu ad castaneo-purpurinum incli-  
nantes, intermediae limbo versus basin viridi-lavato; *tectrices ala-  
rum superiores majores* (pone alulam sitae) *aureo-aurantiae*, ver-  
sus basin *rubrae*, harum *externae sanguineo-rubrae*, *apice aureo-  
flavae*, *rhachi alba*; *tectrices alarum* reliquae mediae ac minores,  
*inferiores omnes*, alarum margo, remigum secundariarum pogonium  
externum, remiges ultimae toto, pennae scapulares, notaeum totum,  
*crissum*, *abdomen*, *venter*, latera, tibiae et epigastrium, *capitis la-  
tera ac pileus*, nec non collum posticum viridia; *remix prima tota  
nigra*; remiges sequentes extus viridi-coerulescentes, intus nigrican-  
tes, omnes subtus nigrae, nonnihil olivaceo-nitentes; frons fasciola  
minuta subobsoleta castaneo-purpurina notata; plumae colli antici,  
lateralis infimi ac pectoris latiusculae, rectiusculo truncatae, virescen-  
tes; limbo apicali albido. *Mas et Foem. adult.*

*Aratinga melanurus Spix* Av. Bras. 1. t. 22. f. 1. 2 (*fig.  
bonae*).

*Avis junior*. *Tectrices alarum superiores majores internae solum  
aureo-flavae*, basi rubescentes, *externae virides*; *ptilosis reliqua ut in  
avi adulta*.

Regio circa rostri basin plumosa, regio ophthalmica large nuda,  
diluta; rostrum corneo-nigricans apice albido; mandibula in pagina  
antica acie longitudinali, stricta aucta; irides aurantiae; pedes et un-  
gues nigricantes; cauda elongata, admodum gradata; alae majusculae.  
Habitus *Sit. fasciatae* subsimilis. Longitudo  $9\frac{3}{4}$ "", caudae  $4'' 5'''$ ,  
alae  $4\frac{3}{4}$ "", rostri ad frontem  $9\frac{1}{4}$ "", tarsi  $5\frac{1}{2}$ "". Habitat in *Brasi-  
lia*, versus flumen *Amazonum* (*Mus. Monac.*).

14. *S. Nenday*. Caput totum nigrum, vertex in medio dilutior, in rubrum vergens; caudae pagina inferior nigricans, superior parte anteriore viridi-flavida, posteriore coerulea; remiges supra virides, versus apicem nigricantem in coeruleum vergentes; tectrices supra incumbentes, laterales apicem versus coeruleae; alae subtus fuscae, micantes, exceptis tectricibus mediis ac parvis viridi-flavidis; reliqua corporis ptilosis viridi-flavida, exceptis plumis ad latera inferiora colli pallide coeruleis ac suffraginis coccineis. *Mas et Foem. adult.*

*Le Nenday Azar. Voy. n. 279. Psittacus melanocephalus Vieill. N. D. 25. p. 366.*

*Avis juvenilis.* Avi adultae similis.

Pedes in olivaceum vergentes; rostrum et regio ophthalmica nigra; irides fusco-atrae; cauda elongata, lanceolata. Longitudo  $13\frac{1}{3}$ " , caudae  $6\frac{1}{3}$ " , tarsi 9" , rostri 10" . Habitat satis frequens in *Paraguay*, locis cultivatis ad sylvarum margines, gregibus perquam numerosis zae segetibus infesta, semper una ave e turba vigilante, reliquis in humo obambulantibus ac victitantibus voce altissima, penetrante, assidue clamantibus; inquilinis *Nenday Azar.* (Non vidi).

*Observatio.* Aliud specimen cum descripto captum describit cl. *Azara* hoc modo: habitus universalis ac magnitudo, nec non vox *Sit. Nenday*, sed ptilosis pure flava, exceptis armillis et capite rubris; rostrum, regio ophthalmica ac pedes dilute olivacea; oculi ut in sic dictis Albinos colorati, rubri. Quae sit haec avis, prorsus ignoro.

15. *S. leporhyncha*. Viridis; frons, striga per oculos caudaque rufae, caput nigrum, abdomen imum rufum, variegata, maxilla elongata, gracillima.

*Psittacara leporhyncha King. Philos. Mag. and Annals of Philos. 1831. p. 65.*

Statura *Sit. cruentatae* aequali. Habitat in insula *Chiloe*. *Sit. Nenday*, ut videtur, proxima. Non vidi.

16. *S. Anaca*. Macula in buccis majuscula et vitta circa regionem ophthalmicam ducta castaneo rubicundae, plumis stricte malachitaceo-terminatis; *plumae gulae, colli lateralis, medii, antici pectorisque fuscae, pectoris in viride vergentes, omnes limbo rufescenti-albido toto cinctae*; aures macula majuscula albida notatae; collum posticum supremum ac pileus fusca; frons macula latiuscula malachitacea notata; cervix fasciola subobsoleta pallide cyanea cincta; humeri sanguineo-rubri; tectrices alarum inferiores, superiores omnes, pennae scapulares, remiges ultimae, dorsum supremum, caudae tectrices superiores ac inferiores, abdomen, tibiae ac hypochondria viridia; tergum ac uropygium purpurea; macula in ventre magna pallide coccinea; cauda tota cupreo-purpurina, subtus pro vario ad lucem objectu in sanguineum vergens; rectricum limbus versus basin viridis; remiges primariae extus cyanaeae, nigro-terminatae; remix prima toto nigra, olivaceo-nitens. *Mas et Foem. adult.*

*Anaca Marcgr.* Hist. rer. nat. Bras. Lib. IX. p. 207 (*Lichtenst.* Abh. d. Berl. Ak. & W. 1815—16. p. 167).

*Psittacus Anaca Auctor.* *Perruche à gorge tachetée de Caj.* Buff. Pl. enl. 144 (*fig. pessima*). *Psittacus versicolor Auctor.* *Perruche Ara à gorge variée Le Vaill.* l. c. t. 16 (*fig. opt.*)

Rostrum intense corneo-fuscum, basi plumosum; regio ophthalmica parum nuda, albida; pedes cinereo-nigricantes; ungues nigricantes; cauda elongata, admodum gradata, lanceolata. Longitudo  $9\frac{1}{4}$ " , caudae solius  $4''\ 7'''$  , alae fere  $4\frac{3}{4}$ " , rostri culmine bianguloso, ad frontem  $8\frac{1}{4}$ " , tarsi  $5'''$  . Habitat satis frequens in *Cajenna, Guiana* ac *Brasilia* (*Mus. Paris., Berol., Monac.*).

*Observatio. Kuhlii* descriptio avis junioris spectat ad *Sit. lepidam*.

17. *S. cruentata*. Taenia ex oris angulo infra oculos ad aures ducta, macula in tergo maxima et altera in ventre purpurinae; collum anticum ac infimum, laterale ac fasciola in colli parte postica infima turcino-coerulescentia; macula pone mandibulae basin versus gulae latera ducta virescens, altera pone aures isabellino-aurantia; plumae totius pilei occipitisque nigrae, versus nucham magis magisque aurantio-limbatae; rectrices omnes supra olivaceo-aureae, apice extimo virentes, subtus toto cupreo-coccineae; humeri coccinei; crissum, tibiae, alarum tectrices superiores omnes, inferiores minores, caudae superiores, margo flexurae ac reliqua trunci ptilosis intense viridia; remix prima nigra, intus juxta rhachin cyaneo-reflectens, limbo flavido-virescente; remiges sequentes tres primae similes, pogonio externo cyanae, margine virescentes, reliquae extus et intus juxta rhachin virides cum limbo praecedentium; apice nigricantes, omnes subtus nigricantes, intus maxima ex parte olivaceo-flavidae; tectrices inferiores majores ex olivaceo-flavidae; alulae pennae virescenti-coerulescentes. *Mas et Foem. adult.*

*Psittacus cruentatus* Max v. *Wied* Reise n. Bras. 1. p. 72, *Temm.* Pl. col. t. 338 (*fig. bona*). *Psitt. erythrogaster* *Lichtenst.* *Dubl. Verz. des Berl. zool. Mus. S. 7.* *Psittacus squamosus* *Kuhl* *Consp. Psitt.* p. 20. n. 13 (*sed non Psitt. squamos. Lathamii*). *Aratinga cyanogularis* *Spix* Av. Brasil. 1. t. 17 (*fig. bona*). *Psittacara Lichtensteinii* *Vigors* *Zool. Journ.* 8. 1826.

*Avis juvenilis.* Avi adultae similis, ptilosi minus nitida; humeri non aut parum rubri; macula pone oculos rufescens, taenia infra oculos dilutior; verticis plumae nigricantes, strictius aut vix rufescenti-limbatae; collum anticum dilutius coeruleum; rostrum obscurius.



Habitus *Sit. versicoloris*; rostrum corneo-fuscum; irides aurantiae; regio ophthalmica nudiuscula; cauda elongata, admodum gradata, lanceolata; pedes fusco-nigricantes unguibus nigris. Longitudo  $10\frac{1}{2}$ "", caudae  $5\frac{1}{4}$ "", alae  $5''\ 4'''$ , rostri ad frontem  $10\frac{1}{2}$ "", tarsi fere 6"". Habitat in *Brasilia*, in sylvis prope Rio de Janeiro satis frequens. (*Mus. Paris., Berol., Monac., Eichstaedt.*).

*Observatio.* *Psittacus squamosus Lathamii*, quocum haec avis a cel. *Huhl* unitur, differt toto coela.

18. *S. aurea*. Fronis ac sinciput ex parte, nec non macula oculos ambiens stricta (interdum quoque regio circa suffraginem) laete isabellino-aurantia; lora ac vertex coerulescentia; genarum pars infima, mentum, gula, collum anticum ac laterale nec non pectus supremum sordide virentia; epigastrium intensius viride; reliquae corporis partes inferiores flavo-virescentes; regio parotica, occiput, collum posticum ac totum notaeum viridia; remiges primariae extus virides, apice solum in cyaneum vergentes; secundariae extus cyanae, omnes pogonio interno et subtus flavido-relucentes; alulae pennae toto virides; tectrices alarum inferiores ac alarum margo laete viridi-flava; crissum virescens; rectrices omnes supra virides, pogonio interno obsolete fulvescentes, subtus aureo-relucentes; rostrum nigricans, apice interdum dilutius. *Mas et Foem. adult.*

*Tui Apute-juba Marcgr.* Hist. rer. nat. Bras. Lib. IX. p. 206 (*Lichtenst.* Abh. d. Berl. Akad. 1815.—16. p. 167). *Golden crowned Parrakeet Edw.* 1. t. 235 (*fig. mediocr.*). *Perruche à front jaune de Caj. Buff.* Pl. enl. 838 (*fig. mediocr.*). *Psittacus aureus Linn., Gmel., Huhl., Donav.* Natural. Repository t. 72. *Psittacus brasiliensis Lath. (sed non Gmel.)*. *Psittacus regulus Shaw.* *La Perruche couronné d'or Le Vaill.* 1. c. t. 41 (*fig. mala, nimis magna*). *Id. Seconde variété de la Perru-*

*che à front jaune* t. 37 (fig. nimis magna). *Maracana à front orange* Azar. Voy. n. 280.

Regio ophthalmica parum nuda, aurantia, orbitae nigricantes; irides aurantio-flavae, pedes unguisque graciles; alae ac cauda elongatae, haec perquam gradata, lanceolata. Longitudo  $10\frac{1}{4}$ " , caudae solius  $5\frac{3}{4}$ " , alae  $5\frac{3}{4}$ " , tarsi 5" , rostri ad frontem 9" . Habitat in *Guiana*, satis frequens in *Brasilia* ac in *Paraguay*, gregibus ut plurimum magnis est locis cultivatis, zae segetibus infesta; raro docilis. (*Mus. Paris., Berol., Monac., Eichstaedt.*; multos vivos vidi).

*Observatio.* Huc referendus auctorum *Psittacus canicularis* (*Edw.* 4. t. 176. a *Sit. aurea* fronte rubra (?) solummodo diversus *Buffonii* ac *Le Vaillantii* icon (Pl. enl. 767 et *Hist. des Perroq.* l. t. 40, certo *Edwardiana*) licet cl. *Le Vaillant* vivos *Psittacos caniculares*; in fronte coccineos, vidisse praetendat! Varietates hujus avis nondum observavi; quoque ptilosin avis junioris ignoro.

19. *S. Petzii*. Frons aurantia; sinciput coeruleum; collum posticum ac notaei pars reliqua prasina, exclusis remigibus secundariis extus cyaneis; remiges primariae extus coerulescenti-virides, intus nigrae, juxta rhachin nigram coerulescentes; genae, collum anticum ac pectus sordide virescentia; gastraei pars reliqua et tectrices alarum inferiores flavo-virides; rectrices supra virides, versus apicem cyaneo-reflectentes, subtus pogonio interno flavae, externo griscentes; maxilla tota flavido-alba, mandibula corneo-fusca, antice versus apicem dilutior.

*Psittacus Petzii Leiblein* in Museo Würceburg.

Regio ophthalmica large nuda, pallida; pedes incarnato-grisei (?) unguibus nigrescenti-corneis. Habitus et magnitudo prorsus *Sit.*

*aureae*, diversa rostri colore, regione periophthalmica nuda, rectricum et remigum pictura. Habitat in *Mexico*. (*Mus. Würceburg*).

20. *S. cactorum*. Rostrum albidum; mandibula circa basin fusciscenti nubilata; ptilosis laete viridis; genarum pars antica, jugulum totum et pectus cinereo-flavida, nonnihil in colorem fusciscentem vergentia; epigastrium, venter et abdomen laete aurantiaca; alarum tectrices inferiores, crissum nec non alarum margo flavo-virescentia; rectrices subtus laete virides, apice in coeruleum vergentes; tectrices alarum inferiores majores ac remiges latere inferiore nigrae; harum primariae supra pogonio externo virides, apicem versus coerulescentes, secundariae toto coerulescentes, margine apicali nigricantes. *Mas et Foem. adult.*

*Psittacus cactorum* *Wied* Reise n. Bras. 2. p. 168., *Kuhl* l. c. p. 82. n. 143. *Aratinga flaviventer* *Spix* Av. Bras. 1. t. 18. f. 1. (*fig. bona*).

*Avis juvenilis*. Avi adultae similis, ptilosis tota dilutior, colli latus anticum versus pectus in olivaceum vergens; frons et sinciput subtiliter coeruleo-lavata; rostri basis obscurius fusco-nubilata.

*The brown-throated Parrakeet* *Edw.* l. t. 177. (*Icon mediocr. e specimine domefacto*). *Psittacus aeruginosus* *Linn.*, *Gmel.*, *Kuhl.* *Brown-fronted Parrakeet* Var. *a.* *Lath.* Synops. 1. p. 243. *Psittacus plumbeus* *Gmel.*, *Psittacus aeruginosus* *Lath.* Var. *β.*

Var. *a.* Remiges secundariae flavae.

*Aratinga minus* *Spix* l. c. t. 19. f. 2 (addas descriptionem *Psittaci Caixana* p. 34. *Icon e specimine manco, domefacto*).

Regio circa oculos nudiuscula ac cera albae; oculi parvi iride

stricta aurantia; pedes fusciscentes unguibus acutis, gracilioribus, corneo-fuscis; cauda elongata, admodum gradata. Longitudo  $9\frac{3}{4}$ "", caudae 5", alae  $5''\ 4'''$ , maxillae, culminis medio subexaratae,  $9\frac{1}{4}$ "", tarsi 5"". Habitat satis frequens in *Brasilia* ad sylvarum margines, gregaria in cactos altos ac ramosos, (*Cact. hexagon.*, et *Cact. Jamacarú.*) incidens, horumque fructibus rubris avide victitans. (*Mus. Paris.*, *Berol.*, *Monac.*; specimen vivum vidi).

*Observationes.* Species haec a cl. *Kuhl* inter Psittacos brachyuros false recepta est. — Specimen, ut Edwardsianum in sincipite intense coeruleum non vidi, *Spixii* descriptio *Psittaci nini* p. 34. spectat ad varietatem *Sit. cactorum*.

21. *S. pertinax*. Frontis margo anterior, regio supra et ante oculos nec non genae ochraceo-aurantia; sinciput in coeruleum vergens; jugulum ac pectus supremum ex griseo flavido-virescentia; epigastrium, crissum ac hypochondria virescentia; venter infimus ac abdomen aurantio-flavo-variegata; alarum margo totus, tectrices superiores omnes (inferiores virescenti-flavae), pennae scapulares, vertex, occiput ac reliqua notaei pars laete viridia; remiges subtus toto nigrae, primariae et secundariae pogonio externo virides; hae versus apicem nigricantem in coeruleum vergentes, omnes intus nigricantes, juxta rhachin subtiliter coeruleo-tinctae; rectrices omnes supra virides, intermediae versus apicem paullo coerulescentes, subtus virescenti-flavae. *Mus. adult.*

*The yellow-faced Parrakeet* *Edw.* 1. t. 234 (fig. bona excepta cauda, nimis longa). *Psittaca illiniaca* *Briss.* Av. 4. p. 353 (descript. opt.). *La Perruche Illinoise* *Buff.* Pl. enl. 528 (fig. bona). *Psittacus pertinax* *Auctor.* *Perruche à front jaune mâle* *Le Vaill.* 1. c. t. 34 (fig. non satis accur.), t. 35 (fig. melior).

*Foem. adult.* Mari simillima, exceptis capitis lateribus cinerascenti-lavatis.

*Avis juvenilis.* Avi adultae similis; frons et genae virescentes, plus minusve ochrescentes; rostrum dilutius corneo-fuscum, culmine subalbidum.

*Psittacus inornatus Kuhl l. c. 167.*

*Var. α. (Av. domefact.)* Ptilosis ordinaria, gastraeum totum ochraceo-aurantium, plumae colli postici albido-limbatae.

*Le Vaill. l. c. p. 73. t. 36.*

*Var. β. (Av. domefact.)* Caput totum aurantio-ochraceum, paullo viridi-varium.

Rostrum totum obscure cinereum, cera et regio ophthalmica nudiuscula, pallide cinerae; irides e circulis duobus compositae, quorum externus angustissimus in ave adulta aurantio-ruber, in ave juniore pallide isabellinus, internus, pupillam ambiens, fusco-ater; pedes incarnato-nigricantes, unguibus corneo-fuscis; cauda elongata admodum gradata. Longitudo  $9\frac{1}{2}''$ , caudae  $4\frac{1}{2}''$  (interdum ultra), alae  $5\frac{1}{4}''$ , tarsi  $5\frac{1}{4}'''$ , rostri ad frontem  $11'''$ . Habitat in *Surinam*, *Cajenna* ac *Brasilia*; avis perquam clamosa ac inquieta, parum docilis. (*Mus. Paris.*, *Berol.*, *Monac.*; multos vivos vidi).

*Observationes.* Vidi specimina viva descriptis multo minora. *Le Vaillantii* sic dicta varietas secunda hujus avis a *Huhlio* citata, certo ad *Sit. auream* spectat.

22. *S. Jendaya.* Rostrum corneo-nigrum; mandibulae pagina antica paullo dilutior caput totum, collum et pectus lutea; frontis margo anterior, regio circa orbitas ac plumae colli antici pectorisque apice coccineo-lavatae, ventris latera, abdomen et alarum tectrices

inferiores minores coccinea, harum externae marginales virides, majores nigricantes; tibiae virides ac epigastrium virescens coccineo-nubilata; abdomen infimum, crissum, dorsum, alarum tectrices superiores omnes et pennae scapulares intense viridia; tergum caudaeque tectrices superiores dilutius viridia, illud macula pallide coccinea notatum; alulae pennae et tectrices majores pone has sitae intense violaceae; remiges violaceae, primariae extus magna ex parte virides, omnes subtus nigrae; rectrices subtus nigrae, intus versus basin ac limbo olivaceo-aureae, supra ex flavo-olivaceo virides, versus apicem magna ex parte cyanae; rectrix extima tota cyanea. *Mas et Foem. adult.*

*Jendaya Marcgr.* Hist. rer. nat. Bras. Lib. IX. p. 206. *Psittacus Jendaya Auctor.* *Aratinga chrysocephalus Spix* Av. Bras. 1. t. 12 (*fig. bona*).

*Av. junior.* Pictura alarum et caudae avis adultae, occiput, genae, collum, pectus, dorsum, tergum et caudae tectrices superiores obscure viridia, frons, vitta subconspicua superciliaris ac lora coccinea; pilei pars maxima aurantio-flava; regio parotica viridis plumis intermixtis aurantio-flavescentibus; epigastrium ac venter in fundo viridi plus minusve rubro-irrorata; abdomen ac uropygium pallide coccinea; hypochondria ac tibiae viridia pallide coccineo-maculata.

*Psittacus pyrrhocephalus Hahn* Ausl. Vög. Lief. 14. t. 1 (*fig. bona*). *Psittacus auricapillus Illig.* in *Lichtenst. Verz.* d. Doubl. des Berl. zool. Mus. S. 6. *Kuhl* Consp. Psittac. p. 20. n. 12. *Aratinga aurifrons ♂ Spix* Av. Bras. 1. t. 16. fig. 1 (*fig. mediocr.*).

*Av. hornot.* Avi juvenili simillima; uropygium viride; regio parotica vix flavido-lavata; pictura pectoris, epigastrii ventris abdominisque dilutior, obsoletior.

*Psitt. aurifr.* ♂ *Spix* l. c. f. 2 (fig. bona).

Orbitalium regio largiuscule nuda, albida; irides cinereae; pedes et ungues nigricantes; cauda elongata admodum gradata, lanceolata. Longitudo 12", caudae 6", alae longae 6" 2"', rostri ad frontem 13"', tarsi 5 $\frac{3}{4}$ ". Habitat in *Brasilia* satis frequens. (*Mus. Paris., Perol., Monac.*)

*Observatio.* Cl. *Lichtenstein* *Sittacam Jendaya* (Abh. d. Berl. Akad. d. W. 1815—16. p. 167.) speciem credit, a *Marcgravei* tempore inde ad nostrum non amplius visam, sed certo spectat ad *Spixii Psittacum chrysocephalum* ventre rubro quidem insignem, caeterum vero simillimum. Cel. *Marcgrave* colorem abdominis in *Jendaya* non indicat.

23. *S. solstitialis*. Caput, collum ac totus truncus aureo-flava, undique plumis intense rubris variegata; pennae scapulares, alarum tectrices superiores ac inferiores minores citrino-flavae, rubro-variegatae; majores superiores virides, in apice macula larga citrino-flava notatae, inferiores sulphureo-flavae; remiges supra cyanae, pogonio externo a basi usque ultra medium virides subtus toto nigricantes; crissum citrino-flavum; rectrices intermediae a basi usque ultra medium virenti-aureae, reliqua parte cyanae, caeterae intermediis similes, parte cyanea extensiore, omnes subtus citrino-olivaceae, limbo externo et apice nigricantes; rostrum corneo-nigricans; maxilla magna ex parte circa culminis basin fuscescens. *Mas adult.*

*Psittacus solstitialis* *Miller*, *Cimel. Physic. t. 4 (fig. pessim.)* *Linn., Gmel., Lath., Kuhl. Psittacus merulinus Scop. Ann. 1. p. 30. Psittacus Guaruba, mexicanus β. Gmel. Psittacus luteus Vieill. Perruche Ara Guarouba mâle Le Vaill. l. c. t. 18 (fig. bona). Aratinga luteus sive Guarouba Spix. Av. Bras. 1. t. 14 a (fig. bona).*

*Foemina.* Mari similis, ptilosis minus rubro-variegata; caudae tectrices superiores ac inferiores virescentes; alarum superiores minores viridi-mixtae, majores virides, margine apicali stricto flavo.

*Le Vaill.* l. c. t. 19 (*fig. non satis accurata*).

Rostrum mediocre; regio ophthalmica parum nuda, ac orbitae albidae, lora plumosa; irides fuscae; cauda elongata, admodum gradata, lanceolata; pedes fuscescanti-nigrescentes; ungues nigri. Longitudo 11", caudae 5" 4"', maxillae 1". Habitat in *Brasilia* versus flumen *Amazonum*; caveis inclusa non raro ova 3, illis turturis magnitudine aequalia, alba parit, quibus vero parentes non incubant; mitis at parum docilis et agilis. (*Mus. Paris., Monac.*; multos vivos vidi; dissecavi tam marem quam foeminam).

24. *S. ludoviciana.* Caput, nucha et jugulum laete sulphurea; frons ac genarum macula magna laete aurantio-rubra; collum posticum inferius, dorsum, tergum, uropygium, caudae alarumque tectrices superiores remiges dorso proximae ac pennae scapulares laete prasino-*viridia*; tectrices majores ex viridi nonnihil ad luteum vergentes, inferiores minores virides, majores obscurae; trunci partes inferiores ac crissum laete virescentia, nonnihil ad flavum inclinantia; suffraginis plumae aurantiae; margo alarum macula oblonga luteo rubicunda notatus, remiges pogonio externo intense virides, primariae versus basin flavo-marginatae, versus apicem coerulescentes, omnes pogonio interno ac subtus nigrae; cauda tota viridis. *Mas adult.*

*Caroline Parrot Catesb.* Carol. 1. t. 11. *Psittaca carolinensis* *Brisson.* Av. 4. p. 350 (*descript. opt.*). *Perruche de la Caroline Buff.* Pl. enl. 499 (*fig. mediocr.*). *Psittacus ludovicianus* *Linn.*, *Gmel.* 126., *Huhl* l. c. n. 19. *Psittacus carolinensis* var.  $\beta$ . *Lath.* (*Gmel. inter synonyma*). *La Perruche à tête jaune Le Vaill.* l. c. t. 33 (*fig. satis accurata*). *Psittacus ca-*



*rolinensis* Wils. Americ. Ornith. 3. p. 89. t. 26. f. 1. (fig. opt.).  
*Psittacus lutei-capillus* Vieill. Encycl. meth. Liv. 93. p. 1402.

*Foemina*. Mari similis, nuchae flavedo minus extensa; pogonium internum, remigum primum fuscescens; alarum margo aurantio-flavus, strictior.

*Avis hornotina viril. et foem.* Collum et caput viridia, fronte et genis exceptis aurantiis.

*Avis juvenilis adultae ptilosi se induens.* Capitis partes virides plumis flavis intermixtae.

Rostrum sordide album, cera alba, subplumulosa; regio ophthalmica nudiuscula, alba; irides avellaneae; pedes albo-incarnati, unguibus griseo-albidis; cauda longa, gradato-lanceolata. Longitudo 13", caudae 6", tarsi 6". Habitat satis frequens, ut dicitur, in *Guiana* autumno, moris maturantibus, gregibus maximis in civitates unitas *Americae septentrionalis*, attamen non usque in Carolinam septentrionalem migrans, *Bromeliae*, *Lyriodendri* caet. seminibus victitans, fera, valde clamosa, mansuescens sed parum docilis. (*Mus. Paris.*; multos vivos vidi).

*Observationes.* Nunquam vidi specimina ex *America meridionali* allata. Avis junior cum *Sit. Jendaya* juvenili simili non confundenda, rostro nigro facile distinguenda.

25. *S. lutea*. Cauda tota; alarum tectrices superiores ac inferiores omnes, alulae pennae, collum, caput totum ac totus truncus intense lutea, immaculata; rectricum rhachis alba; remiges omnes pogonio interno versus basin olivaceo-flavidae, versus apicem nigricantes, omnes subtus olivaceo-aureae; rhachi tota nigra; rostrum validissimum, flavido-albidum; pedes roseae. *Mas et Foem. adult.*

*Quijuba-Tui* Marc gr. Hist. rer. nat. Bras. Lib. IX. p. 207 (*Lich-*

*tenst.* Abh. der Berl. Akad. 1815—16. p. 167). *Psittaca brasiliensis lutea* Briss. Av. 4. p. 369 (*descr. accur.*). *Psittacus luteus* Lath. (exclusa var.  $\beta$ ) non Gmel. *Psittacus Guaruba* Gmel. (exclusa var.  $\beta$ ), Kuhl. l. c. n. 17., Hahn. Ausl. Vög. Lief. 13. t. 4 (*fig. opt.*). *Aratinga Carolinae Augustae Spix.* Av. Brasil. 1. t. 12 (*fig. opt.*).

*Avis juvenilis.* Rectrices plus minusve virides, rhachi nigra; plumae scapularum ac dorsi, nec non alarum tectrices in medio virides; genae viridi-variae; rhachis plumarum in trunco subobscura; reliqua ptiloseos, rostri pedumque pictura eadem quae avis adultae.

*Perruche jaune de Caj. Buff.* Pl. enl. 525 (*fig. accur., sed descript. spectat ad Guarubam*). *Perruche Ara Guaruba dans son jeune âge Le Vaill.* l. c. t. 20 (*icon Buffoniana, fide Temm.*). *Psittacus chloropterus Vieill.* Encycl. méth. Liv. 93. P. 29. p. 1390.

Mandibula validissima, latissima, antica pagina rotundata; maxillae culmen biangulosum, apex extimus strictissimus, acutissimus; irides nigro-fuscae; lora parum plumulosa; regio circa oculos nuda albido-incarnata; unguis corneo-fuscescentes; cauda et alae elongatae, illa admodum gradata, lanceolata. Longitudo  $14\frac{1}{2}''$ , alae  $6\frac{1}{2}''$ , rostri ad frontem  $19\frac{1}{2}'''$ , caudae  $6\frac{1}{2}''$ , tarsi fere  $7'''$ . Habitat gregaria in Brasilia versus flumen Amazonum. (*Mus. Paris., Monac.; duos vivos vidi*).

*Observatio.* *Psittacus Guaruba* Gmel., varietas  $\beta$  (*Lathamii Psittacus luteus* var.  $\beta$ ) spectat ad *Sit. solstitialem*.

26. *S. flaviventris.* Viridis; venter flavus; frons ac sinciput, humerorum macula, tectrices alarum superiores minores, flexura ac margo laete rubra; suffraginis plumae rubro-aurantiae; tectrices alarum superiores reliquae ac inferiores omnes virides; remiges supra virides, magna ex parte violaceae, subtus malachitaceo-virescentes.

*Le Maracana à tête et pli de l'aile rouges Azar. Voy. n. 276.*

Habitus *Sit. guianensis*; corporis viredo paullo in colorem nigricantem vergit; rostrum basi sinuatum; regio periophthalmica albo-coerulescens; pedes perlaceo-grisei, irides pure flavae. Longitudo a rostri apice ad caudae basin 6'', tibiae 24''', tarsi ac rostri 11'''. Habitat in *Paraguay* versus fines *Brasiliae. Azara. Non vidi.*

27. *S. patagonica*. Caput et collum supra fuliginoso-virescentia; frons nonnihil ad fuscescenti-violaceum inclinans; jugulum et pectus cinerea, nitore viridi, torque albido; hypochondria et uropygium citrina; epigastrium rubrum; dorsum et alae flavo-viridia; tectrices alarum majores et remiges thalassino-coerulea; crissum viridi-flaves-cens; cauda sordide viridis (versus apicem coerulea, subtus nigricans, fide *Azar.*).

*Psittacus cyanolyseos Auctor. (descr. pessima). Poep-pig in Frorieps Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilk. 1829. Nr. 529. Bd. XXV. S. 8. Le Patagon Azar. Voy. n. 276. Psittacus patagonus Vieill. l. c. p. 367. Psittacara patagonica Less. in Dupper. Voy. aut. du monde, Part. zool. tab. 35. bis.*

Habitus speciei praecedentis. Irides croceae; rostrum plumbeum; pedes carnei; cauda elongata; cera rostri strictissima; regio ophthalmica nuda, stricta, albida; lora plumosa. Longitudo 17<sup>1</sup>/<sub>4</sub>'', caudae 8<sup>3</sup>/<sub>4</sub>'', tibiae 30''', tarsi 13''', rostri 12'' (Azar.). Habitat per familias in *Buenos-Ayres* ac in *Patagonia*; nidificat et pernoctat in foraminibus fornacum laterariorum, quae ipsa fodit; victitat carduorum ac zae fructibus (Azar.). Species in *Chili* omnium vulgatissima, totoque anno observanda. Aestivo tempore multae regiones montanas, nec non subalpinas petunt, ubi in cavitatibus rupium (v. g. ad *los Loros*, nec non ad *Puente de Vizcachas* in Andibus

*Santae Rosae*) innumeros nidos construunt et pullos progeniunt, cum iis iterum ad regiones minus elevatas recedentes, hieme incipiente. Pullae edules, seniores sapore parum grato. Continuo clamitans, gregibus maximis volans, hominem vix metuens, hortorum et vinearum inimicus, a venatoribus numero incredibili fere occiditur. Facillime mansuescit, voces humanas imitatur, sed ad hoc hebetiore ingenio praedita, quam nonnullae congenerum e Guayaquil allatae, et inter Chilenses valde aestimatae. Indigenis „Loro“ (*Poeppig*). Non vidi.

28. *S. gujanensis*. Regio circa rostri basin plumosa, caput, collum, alae supra ac tota trunci pars superior et inferior, tectrices alarum superiores et inferiores, caudae inclusis, viridia; partes corporis superiores saturate herbaceae, collum et caput plus minus maculis parvis rubris irregulariter dispositis variegata; flexura ac margo alarum nec non harum *tectrices inferiores minores laterales sanguineo-rubrae, majores laete citrino-flavae; tectrices infra axillas sitae virides; remiges et rectrices supra olivaceo-virides*, hae subtus virides, illae pogonio interno olivaceo-aureae, margine apicali stricto nigricante; plumae frontis sincipitisque latiusculae, apice rotundato-truncatae. *Mas et Foem. adult.*

*Psittaca gujanensis* *Briss.* 4. p. 331. t. 28. f. 1 (*descript. opt.*). *Perruche de la Guiane Buff.* Pl. enl. 167. (*fig. satis accurata*). *Psittacus guajanensis* *Gmel., Lath.* (*sed non Kuhl-  
lii, qui est Psit. nobilis.* *Perruche de la Guiana Buff.* Pl. enl. 407. (*fig. mediocr.*). *La Perruche Ara pavouane Le Vaill.* 1. c. t. 14 (*fig. mediocr., descript. opt.*) t. 15. *Maracana verd.* *Azar.* p. 57. *Psittacus* . . . . . *Poeppig* in *Frör.* Notiz. Bd. XXXI. p. 3.

*Av. juv.* Ptilosis viridis, sine maculis rubris; tectrices alarum inferiores flavae apice rubrae.

Rostrum validiusculum ex pallidissime fusco incarnatum (in exuviis flavido-album); maxillae culmen biangulosum; regio circa rostri basin plumosa, circa oculos nuda, albido-carnea; irides aurantiae; pedes griseo-nigricantes unguibus nigris; alae longae; cauda elongata admodum gradata, lanceolata. Longitudo fere 13", caudae 6 $\frac{1}{4}$ ", alae 6 $\frac{1}{2}$ ", maxillae ad frontem 13"', tarsi 6'''. Habitat in *Gujana*, *Brasilia*, *Paraguay*, ac in *Peruvia*, gregibus maximis in sylvis ac locis cultivatis degens; avis clamosa, vix mansuescens, quo ad loquelam humanam plane indocilis. Peruanis hispanicis est *Lorito* vel *Loro bobo*. (*Mus. Paris.*, *Monac.*, *Eichstaedt.*; vidi specimina viva).

*Observatio.* Specimini a cl. *Spix.* descripto (*Av. Bras.* 1. p. 36) cauda *Sit. nobilis* artificialiter inserta erat.

29. *S. nobilis*. Rostrum validissimum; *maxilla tota albida*, excepto ejus apice extimo strictissimo, acutissimo, nigricante; *mandibula robusta tota corneo-nigra*; regio pone nares, *macula larga pone oris angulum*, ac regio *ophthalmica nudae*, albae, pilis brevissimis, vix conspicuis, parvo numero obsitae; frontis pars majuscula ac vitta superciliaris (indistincte terminata) coeruleae; collum, capitis totius pars reliqua, trunci superior ac inferior, caudae et alarum tectrices superiores intense viridia; carpi margo, alarum flexura ac harum tectrices inferiores minores externae coccineae, tectrices infra axillas sitae virides, *majores olivaceae, aureo-lucentes*, alae ac *cauda subtus olivaceo-aureae*, supra dorso concolores; remiges absque pictura coerulea, intus margine parva ex parte nigricantes et olivascentes; remix tertia (interdum quarta quoque et quinta) anguloso-terminatae. *Mas adult.*

*Psittacus nobilis* Linn., Gmel., Lath. *Psittacus guianensis* Kuhl. l. c. p. 19. n. 11 (*Synonymia falsa*). *Psittacus cumanaensis* Lichtenst. Verz. d. Doubl. des Berl. zool. Mus. S. 6. n. 8.

*Arara macrognathus* Spix Av. Bras. 1. t. 25. f. 1. et 2. (fig opt.). *Psittacara frontata* Vig. Zool. Journ. 8. 1826.

*Foemina.* Mari simillima, hoc tamen paullo minor; frons minus coerulea; rostrum debilius.

*Avis juvenilis.* Avi adultae similis; frons vix coerulea; tectrices alarum inferiores virides, plumis rubris variegatae; alarum flexura et margo virides; cauda brevior, rostri pictura avis adultae; mandibula magis corneo-fuscescens, nonnihil ad fuliginosum vergens.

Maxillae culmen obsolete biangulosum; mandibula latere antico rotundata, obsolete angulosa; irides angustae flavo-rubrae; cauda elongata, admodum gradata, lanceolata; frontis plumae rigidiusculae, discretae; pedes unguesque fusco-nigricantes. Longitudo  $14\frac{1}{4}$ " , caudae  $6\frac{1}{2}$ " , alae longae  $7\frac{1}{4}$ "  $4\frac{1}{4}$ " , maxillae ad frontem  $1\frac{1}{4}$ " , tarsi  $6\frac{1}{4}$ " . Habitat in *Brasilia*, versus flumen Amazonum satis frequens, et, ut videtur, in *Surinamo*. (*Mus. Paris.*, *Berol.*, *Monac.*; vivam vidi).

*Observationes.* Species haec cum *Sit. acuticaudata* et *Sit. gujanensi* primo adspectu simillimis non confundenda. *Kuhlii* synonymia spectat *Sit. gujanensem*.

30. *Sit. acuticaudata.* Rostrum validiusculum, sordide albidum, versus basin corneo-fuscescens; maxillae apex parte extrema angusta cinerascens; regio pone rostri basin tota plumosa, ophthalmica nudiuscula, alba; frons coerulescens; rectrices duae intermediae toto virides, reliquae extus et apice virides, intus supra ac subtus vinaceo-cupreae, omnium rhachis supra nigra; alarum flexura ac margo, tectrices alarum inferiores minores omnes, crissum, collum anticum, laterale ac tota gastraei pars, virescentia; alae supra, capitis pars reliqua, tectrices caudae superiores, ac tota trunci pars superior viridia, pro vario ad lucem objectu nonnihil in flavidum vergentia; remiges (absque pictura coerulea)

apicis margine nigricantes, pogonio interno olivascenti-flavidae; remigum rhachis nigra; alarum pagina inferior harumque tectrices majores olivaceo-aureae. *Mas et Foem. adult.*

*Le Maracana à tête bleue. Azar. Voy. n. 278 (descript. non satis accur.). Psittacus acuticaudatus Vieill. N. D. 25. p. 369. Aratinga haemorrhous Spix. Av. Bras. l. t. 13. (fig. opt.).*

*Avis juvenilis.* Avi adultae similis; frons pallidius coeruleus, tectrices alarum inferiores minores plumulis obsolete rubicundis variegatae (an omnibus?).

Habitus *Sit. nobilis*; rostrum quam in hac minus validum, culminis basi obsolete subsulcatum; pedes incarnati; ungues corneo-albidi (in avibus junioribus obscuriores); irides ex annulis duobus compositae, quorum externus laete et saturate isabellinus, interior pupillam ambiens fuscens; cauda elongata, admodum gradata et acuta. Longitudo 14", caudae 7", alae 7" 3"', maxillae ad frontem 1¼", tarsi 7". Habitat in *Brasilia* ad flumen Amazonum et in *Paraguay*. (*Mus. Monac.*; vivum vidi Norimbergae in domo fratris mei).

*Observatio.* Species distincta, moribus *Sit. Ararauna* et *S. Macao* similis. A *Sit. nobili* ac a *Sit. gujanensi* differt satis rostri structura, alarum caudaeque pictura, caet.

1 31. *S. Illigeri.* Sordide viridis, pro vario ad lucem objectu in olivaceo-flavidum vergens; frons macula rubra signata; plumulae nonnullae juxta nares fuliginoso-nigricantes; pilei pars reliqua coeruleus; collum antice et supra ad latera virescenti-coeruleus; tergum macula magna rubra, abdomen inter femora macula simili notata; rectrices duae extimae apice et pogonio interno coeruleae, interno sordide virescentes, reliquae supra a basi fere usque ad medium castaneo-purpurascens, in medio virescentes, reliqua parte

coeruleae; pagina inferior rectricum omnium ac alarum aureo-virens; alulae pennae ac remiges omnes in utroque pogonio juxta rhachin coeruleae; limbo interno nigricantes; tectrices alarum inferiores abdomini concolores, marginales coerulescenti-virescentes; quarum pars suprema ac facies tota nuda, albae, pilis minutis, vix conspicuis, singulis obsitae; regio prope oris angulum ochraceo induta. *Mas* et *Foem. adult.*

*La Maracana fardé Azar.* Voy. n. 274 (*descr. opt.*). *Macrocercus Maracana Vieill.* N. D. 2. p. 260. *Psittacus Illigeri Kuhl* l. c. n. 10. *Arara purpureo-dorsalis Spix.* Av. Bras. 1. t. 24. (*fig. opt.*).

*Av. junior.* Avi adultae similis; ptiloseos rubedo pallidior, colli supremi latera virescentia.

Rostrum corneo-nigrum apice dilutiore; irides ex annulis duobus compositae, quorum externus aurantius, internus pupillam ambiens fusco-ater; pedes cerato-flavi, unguibus nigricantibus; cauda elongata, perquam gradata, lanceolata. Longitudo  $15\frac{3}{4}$ " , caudae 8" , alae  $7\frac{1}{4}$ " , maxillae ad frontem 19" , tarsi 8" . Habitat in *Brasilia* versus flumen Amazonum ac in *Paraguay* usque ad flumen Plata gregibus parvis, arboribus magnis ac fruticibus gratitans; Guaranis *Maracaná*, mansuescit facile. (*Mus. Berol., Monac.*; plures vivas mitissimas vidi).

*Observatio.* Maculam tergi rubram cl. *Kuhl* describere omisit.

32. *S. Macavuanna.* Rostrum mediocre aterritum, glaberrimum, quasi politum, culmine subanguloso; capitis latera fere tota nuda, alba, absque lineolis plumosis ac pilis; capitis partes superiores reliquae laterales, collum ac totum gastraeum in fundo olivaceo viridiglaucum; crissum fere toto glaucum, hypochondria potius viridia; regio inter femora sordide coccinea; dorsum, pennae scapulares, remiges



tergo proximae, tergum, uropygium caudaeque tectrices superiores herbaceo-virides; plumae harum partium margine ac basi quam in reliqua parte dilutiores; alarum tectrices inferiores, pagina inferior alarum ac caudae aureo-flavae, pro vario ad lucem objectu in olivaceum vergentes; caudae pagina superior tota dorso concolor; alarum tectrices superiores, alulae penna et remigum pogonium externum coerulescentia, harum pogonium internum olivascens, juxta rachin coerulescens. *Mas et Foem. adult.*

*Aiuru-catinga* *Marcgr.* Hist. rer. nat. Bras. Lib IX. p. 207. (*Lichtenst.* Abh. d. Berl. Ak. d. W. 1815—16. p. 168.) (*Psittacus rufirostris* var.  $\beta$ . *Auctor.*). *Perruche* *Ara de Cajá* *Büff.* Pl. enl. 864. (fig. accurat.). *Psittacus Macavouana* *Gmel.*, *Lath.* (descript. vitios.), *Kühl.* *Macrocerus Macavouana* *Vieill.* l. c. *L'Ara Macavouana* *Le Vaill.* l. c. p. 17. t. 7. (fig. accurat.).

Rostrum, tomis maxillae et mandibulae profunde emarginatum; mandibula latere anteriore applanato-biangulosa; pedes unguesque nigri; cauda elongata, admodum gradata, lanceolata. Longitudo  $16\frac{3}{4}$ " , caudae 8" , alae  $9\frac{3}{4}$ " , rostri ad frontem  $1\frac{5}{8}$ " , tarsi  $\frac{3}{4}$ " . Habitat in *Brasilia* versus flumen Amazonum, in *Gujana*, *Cajenna*; *Gujana* sibus *Macavouana* dicta. (*Mus. Paris.*, *Berol.*, *Monac.*.)

*Observationes.* Plumae trunci hujus psittaci margine ut plurimum detritae sunt. Calami lapsu, ut videtur, in *Gmelini* diagnosi dorsum *Sit. Macavouanae* rubrum vocatur. — Huc pertinet quoque auctorum *Psittacus cinereus*, inter brachyuras species false receptus, sed citata avis, *Maracana* *Marcgravei*, ad *Sit. severam* referri debet. *Gmelini* indicatio patriae falsa. Cum *Brissonio* legas *Gujana* pro *Guinea*. Icon *Sit. Macavouana* a cel. *Marcgrave* relicta, rostrum nigrum monstrat. (Vide *Lichtenst.* l. c. et quoad varietatem  $\beta$ . *Psittaci rufirostris* a *Gmelino* ad *Sit. Macavouana*

relatam, observationem meam in fine descriptionis *Pal. cubicularis*.

33. *S. severa*. Sordide viridis; gastraeum quam notaeum paullo dilutius; pileus in colorem coerulescentem vergens; suffrago antice plumulis nonnullis rubris obsita; genarum pars suprema ac tota fere capitis latera nuda, alba (vix conspicue flavido-induta), pluribus lineolis transversis, e plumulis piliformibus nigricantibus, compositis, tecta; frontis margo anterior latiusculus purpurino-castaneus, apice plumularum nonnullarum anticarum coccineo; vitta angustiuscula pone mandibulae basin sordide castaneo-fusca; margo flexurae in alis et harum tectrices inferiores laterales coccinea, harum internae pallide olivaceae, majores purpurinae ad olivaceam inclinantes; remiges omnes alulaeque pennae coerulescentes, rhachi et limbo interno nigricantes; remiges subtus vinaceo-purpurinae, rectrices subtus et supra cupreo-purpurinae, versus apicem coerulescentes; rectrix extrema quoque pogonio externo coerulescens; rectricum intermediae virenti-limbatae; tergum, uropygium caudaeque tectrices superiores abdomine intensius viridia. *Mas et Foem. adult.*

*Maracana* *Marcgrav.* Hist. rer. nat. Bras. Lib. IX. p. 207 (*Lichtenst.* Abh. d. Berl. Ak. d. W. 1815—16. p. 167). *The brasilian green* *Maccaw. Edw.* 1. t. 229. (*fig. satis accurat.*) *Psittacus severus* *Linn., Gmel., Lath.* cum var.  $\beta$ . et auctor. recentior. *Macrocerc. sever.* *Vieill.* l. c. *L'Ara Maracana* *Le Vaill.* l. c. p. 19. t. 8. (*fig. opt.*)

*Avis juvenilis.* Avi adultae similis; ptilosis dilutior absque rubedine; frontis margo stricto castaneus; rectrices supra virescentes, paullo in rubicundum vergentes.

*Le Vaill.* l. c. t. 9.

*Varietas.* Ptilosis ordinaria, plumis intermixtis rubris flavisque.

*Le Vaill.* l. c. t. 16.

Rostrum corneo-nigrum, apice cinereo-corneum; pedes fusciscenti-nigricantes, unguibus nigris; irides flavae, versus marginem externum laete aurantiae; cauda perquam gradata, elongata, lanceolata. Longitudo 18", caudae 8 $\frac{3}{4}$ ", alae 8" 7"', rostri ad frontem 1 $\frac{3}{4}$ ", tarsi  $\frac{3}{4}$ ". Habitat in *Brasilia, Gujana*, ac in *Cajenna*; Brasiliensibus *Anacan* dicta. (*Mus. Paris., Berol., Monac.*; multas vivas vidi).

*Observatio.* Huc sane referenda *Buffonii* icon in operis sui tabula 385. exhibita, a cl. *Huhl.* ad *Sit. militarem* falso relata. Icone clarior est *Buffonii* descriptio p. 156.

34. *S. pachyrhyncha.* Laete viridis; frontis taenia lata versus lora deducta, vitta superciliaris lata utrinque cum frontis taenia connexa, humerorum margo, carpi plumulae nonnullae ac tibiae totae coccinea; macula in loris parva fuliginosa, e plumulis rigidiusculis, laceris eomposita; tectrices alarum inferiores virides, majores luteae; remiges ac rectrices virides, harum rhachis et pagina inferior nigricantes; rostrum totum nigrum. *Adult.*

*Macrocerus pachyrhynchus Swains.* Philos. Magaz. 1827. p. 439.

Rostrum altum, admodum compressum, dente in maxilla magno auctum; margo tomiorum in mandibula profunde sinuatus; facies tota plumosa, excepta parte regionis ophthalmicae, stricta, nuda, incarnata; alae admodum elongatae, angustae; cauda longa, sublanceolata, rectricibus angustis, apice rotundato-acuminatis; pedes et ungues nigricantes. Longitudo 17", caudae (rectricis mediae) 7", rectricis extimae 5", alae 10 $\frac{1}{4}$ ", tarsi  $\frac{3}{4}$ ", digiti antici externi, ungue excluso 13"', maxillae ad frontem 1" 10"', ejus altitudo prope basin 10'''. Habitat in *Mexico* (*Temiscaltepec*). Specimen nitidum nunc descriptum

misit ad Museum nostrum dom. *Keerl.*; eadem species extat in *Museo Berolinensi* et *Würceburgensi*.

*Observatio.* *Swainsonii* descriptio mensuram nimis parvam exhibet; quoque rostrum non crassum ( $\pi\alpha\chi\nu$ ) potius admodum compressum, sed altum est. — Vide hujus monographiae psittacorum tab.

35. *S. militaris*. Capitis latera nuda, lineolis nonnullis in genis obliquis e plumulis brunneo-nigris compositis obsita; frons coccinea; plumae mentum cingentes brunneo-virides; capitis pars reliqua, collum ad latera, alarum margo ac latus superius nec non dorsum viridia, pro vario ad lucem objectu nonnihil in aureo-olivaceum vergentia; collum posticum thalassinum, ad coeruleum vergens; crissum, tergum, uropygium, caudae tectrices superiores ac alarum majores, alulae pennae remigesque turcino-coerulea, harum limbus internus nigricans, latus inferius virenti-aureum; tectrices alarum inferiores virides; rectrices intermediae supra a basi multo ultra medium cupreae, reliqua parte turcino-coeruleae, reliquae versus apicem magis magisque coeruleae. *Mas adult.*

*The great green Maccau. Edw. 3. t. 313. (fig. opt.). Psittacus militaris Auctor. L'Ara militaire Le Vaill. l. c. p. 11. t. 4. (fig. satis accurat.). Id. Le grand Ara militaire l. c. p. 15. t. 6. (fig. bona). Psittacus ambiguus Bechst. in Lath. Uebers. d. Vög. S. 65. n. 5. Kuhl. l. c. n. 6. Psittacus . . . Poepfig; in Frorieps Notiz. Bd. XXXI, p. 2.*

*Foemina.* Mari similis, nucha minus coerulescente.

Rostrum proportionatum, corneo-nigricans, in culmine versus apicem paullo dilutius; maxilla ad tomia obsolete sinuata; cera stricta et reliqua pars nuda capitis carnae (in exuviis obscura); capitis latera nuda incarnata; lingua teres, nigricans; irides ex annulis duobus compositae, quorum externus strictus fulvo-aureus, internus, pupillam

cingens; olivaceus (irides obscurae, fide *Poeppig*); pedes incarnato-cinerascentes, unguibus nigris; cauda longissima, perquam gradato-lanceolata. Longitudo 2' 4½", alae 14", caudae 14¼", maxillae 2" 7", tarsi 1", digiti antici externi 1" 8". Habitat in *Mexico* et in *Peruvia*, in regione magis temperata *Andium* orientali; ad pedum 3,000 elevationis usque. Avis, ob cladem, quam summa voracitate ac astutia Zeae segetibus infert, maxime perniciose. Vox coracis, aspera, dissona. Victus e fructibus cultis cerealibusque, rarius e sylvestribus; aestatis tamen tempore floribus *Erythrinae* praecocibus valde appetitis. *Thibaudiae* cujusdam speciei multiflorae flores quoque aggredi solet. Agmine Zeae campos aggrediens, custodem sui numeri unum alterumve in arboribus altioribus relinquit, periculum clamore peculiari indicantem, ad fugam admonentem. Caro nigra, vix edulis, nisi in junioribus. Aestate frequens, tempore pluviarum ineuntium (mense Octobri) regiones vel magis boreales, vel orientales, paucissimis individuis remanentibus, petunt. Sub finem pluviarum, vel potius jam periodo, qua Zeae spicae maturescunt (Jan., Febr.), innumero exercitu reduces, unde incolae campos custodire coacti. Facile mansuescit, difficillime autem vocem humanam imitari docetur. Peruanis est *Guacamayo*, quo nomine jam a *Garcilasso* commemoratur hic psittacus, regionum paullo elevatarum sola species macrura. Regibus antiquis Peruanis (*los Incas*) a civibus pro dono ad aedium regalium ornamentum allatum fuisse, narrant historici (*Poeppig* l. c.). (*Mus. Paris., Monac.*; vivam vidi ac descripsi in vivario Regis nostri clement. *Maximiliani Josephi*).

*Observatio.* Inter *Psit. militare* et *Psit. ambiguum* auctorum distinctum discrimen observare mihi non licuit. Tabula Buffoniana 383. a *Le Vaillantio* et *Kuhlio* citata manifeste ad hanc speciem spectat.

36. *S. tricolor.* Capitis latera nuda, rugulosa, laete ochracea,

absque lineis plumosis, antè oculos singulis pilis brevibus nigris obsita; collum posticum ochraceo-stramineum; vertex sensim, deinincipit ac frons, regio paullo pone nares, collum anticum ac laterale nec non reliquae corporis partes inferiores saturate rufo-rubra; frons, vertex, capitis latera inferiora ac collum laterale paullo ad coccineum inclinantiâ; tiliarum plumae abdomini concolores, stricte flavido-terminatae; crissi plumae anteriores rufae, limbo apicali coerulescenti-viridi; harum posteriores majores, hypochondria, caudae tectrices superiores, tergum infimum et uropygium turcino-coerulea; dorsum supremum brunneo-purpureum, plumarum margo apicalis subflavidus; pennae scapulares, tectrices alarum superiores minores et tectrices juxta pennas scapulares sitae brunneo-purpureae, margine dilutiores, mediae brunneo-purpureae, virescenti-terminatae, magnae sicut remiges omnes supra pogonio tam externo quam interno turcino-coeruleae, hae subtus cupreo-purpurinae; tectrices alarum inferiores minores purpureo-rufae, marginales basi stricte coerulescentes, mediae flavae, posteriores dilute virescenti-fuscae; rectrices omnes subtus cupreo-purpureae, supra ejusdem coloris, extus versus apicem, duae intermediae maxima ex parte, turcino-coeruleae.

*Av. adult.*

*Le petit Ara Buff.* Pl. enl. 641. (*figura mala a Gmel. et Lath. ad Sit. Aracanga falso relata*). *L'Ara tricolor Le Vaill.* l. c. p. 13. t. 5. (*descriptio opt., figura accur., excepta faciei pictura*). *Psittacus tricolor Bechst., Kuhl. Macrocerus tricolor Vieill.* l. c.

Rostrum totum nigrum, proportionatum, maxilla ad tomia parum, mandibula ante apicem profundius sinuata; cera vix conspicua; irides pallide isabellinae, circa pupillam pallidiores; lingua obtusissima, basi obscure incarnata, apice nigro longitudinaliter subsulcato-rugulosa; pedes obscure incarnati squamulis parvis, rotundis, prominulis obscu-

rioribus, tecti; unguis nigri. *Sit. Aracanga* dimidio fere minor. Longitudo 20", caudae 11½". Habitat in *America meridionali*. (*Mus. Paris.*; specimen vivum nitidissimum, mitissimum descripsi *Monachii*).

† 37. *S. Macao*. Genae, mentum, lora ac tota capitis latera nuda, alba; haec lineis sex e plumis rubris compositis, a maxillae basi infra oculos versus aures ductis, notata; lora seriebus nonnullis plumarum rubrarum obsita; frons, capitis pars superior reliqua, collum totum, tibiae, gastraeum totum, alarum margo, harum tectrices superiores minores, ac inferiores omnes intense sanguineo-coccinea; dorsum sanguineo-purpureum, plumarum limbo apicali viridi; pennae scapulares sanguineo-purpureae, posteriores nec non tectrices mediae olivaceo-virides, immaculatae; remiges tres ultimae supra coeruleae, versus mediam partem olivaceo-virides; alarum tectrices superiores magnae, tergum, uropygium, caudae tectrices superiores ac inferiores turcino-coeruleae; plumae nonnullae hypochondriorum, extus turcino-coerulescentes, intus coccineae ibidemque versus apicem flavido-virescentes; remiges supra intense coeruleae, rhachi et pogonii interni limbo interno nigrae, omnes subtus coccineae, pro vario ad lucem objectu ad cupreo-rubrum vergentes; rectrices duae intermediae a basi ultra medium purpurino-coccineae, reliqua parte turcino-coeruleae, rhachi nigricante, medio versus basin alba; rectrix utrinque sequens turcino-coerulea, limbo in utroque pogonio versus basin purpurino; rectrices reliquae fere toto coeruleae, solum interno pogonio versus ejus basin purpurinae. *Mas* et *♀* *Form. adult.*

*Psittacus erythroxanthus* *Gesn.* 1. p. 721. *Arara-canga* *Marcgr.* Hist. rer. nat. Bras. Lib. I. p. 206. (*Lichtenst.* Abh. d. Berl. Ak. 1815—16. p. 167.). *Psittacus Macao* *Auctor.* (descriptio confusa; synonymiae pars maxima spectat ad sequentem speciem). *L'Ara Macao* *Le Vaill.* l. c. 1. p. 3. t. 1. (fig. valde

mediocr.) *Le Guacamaya rouge Azar. Voy. n. 280 (descrip-  
tio opt.)*

*Avis juvenilis.* Avi adultae similis, rubedine minus intensa, colli postici ac dorsi supremi impura; plumae harum partium sine margine viridi; tectrices alarum mediae obsolete rubicundo-limbatae; cauda brevior.

Rostrum validum, mandibula tota nigra, maxilla sordide alba, macula oblonga marginali versus oris angulum, altera in apice extimo notata; narium cera alba; lingua, pedes unguesque nigra; irides albo-stramineae; cauda longissima, quam maxime gradato-lanceolata. Longitudo 38", caudae 22 1/2", rostri ad frontem 3" 8"', alae 15 3/4", tarsi 1". Habitat in *Brasilia*, praesertim frequens ad flumen Amazonum, rarius in *Peruvia* et in *Paraguay* usque ad 28° latitudinis australis. In insulis *Antillis* quoque, ut dicunt, reperitur. In sylvis gregaria; foemina parit ova 2 nitide alba, quae mas et foemina alternatim incubant; plumae hujus avis inquilinis pro corporis ac armorum ornamentis materies pretiosa. (*Mus. Paris., Berol., Monac.* caet.; multas vivas vidi).

*Observationes.* Species semper cum sequente commutata, a qua genis plumoso-striatis alarumque tectricibus mediis viridibus facile distinguitur. Omnia a me visa specimina e *Brasilia* allata erant.

38. *S. Araçanga.* Capitis latera et mentum toto nuda, alba; tectrices alarum superiores mediae luteae, macula coerulea, ante apicem nonnihil in viride vergente, terminatae, magnae coeruleae, medio parce viridi-luteo tinctae, minores inferiores (basi nigrae) frons, capitis pars reliqua, collum, dorsum, pennae scapulares, tibiae ac totum gastraeum coccineo-sanguinea; crissum, tergum, uropygium caudaeque tectrices superiores lacte turcino-coeruleae; pennae alulae spuriae, tectrices magnae his superincumbentes et remiges omnes



supra intense coeruleae, harum rhachis ac limbus pogonii interni intimus nigra, latus inferius coccineo-cupreum, versus basin ad marginem in aureum vergens; rectrices quatuor intermediae sanguineo-rubrae, versus apicem in amethystinum vergentes, apice extimo paullo coeruleae, rhachi corneo-nigricante, medio ad basin albicante; rectrix sequens supra maxima ex parte coerulea versus medium rectricibus illis pallidius rubra; rectrices reliquae supra toto coeruleae, omnes subtus obscurius rubrae. *Mas et Foem. adult.*

*Psittacus erythroxanthus* Gesn. 1. p. 720. *The red and blue Maccaw* Edw. 4. t. 158. (fig. accur.). *Ara brasiliensis* Briss. Av. 4. p. 184. t. 19. f. 1. (descript. opt.). *Ara rouge* Buff. Pl. enl. 12. (fig. mala). *Psittacus Aracanga* Auctor. *L'Ara canga* Le Vaill. 1. c. t. 2. (fig. mediocr.) et t. 2 bis.

*Avis juvenilis.* Avi adultae similis, ptiloseos pictura quam in hac minus nitida ac pura, cauda brevior.

Rostrum prorsus ut in specie praecedente coloratum; irides pallide sulphureae, circa pupillam indistincte ac vix conspicue virescenti-nubilatae; pedes nigri inter squamulas paullo albo-pulverulenti; ungues nigri; cauda longissima quam maxime gradato-lanceolata. Longitudo 36—39", caudae 23 $\frac{3}{4}$ ", rostri ad frontem 3", alae 16", tarsi fere 1". Habitat in *Gujana*, *Surinam*, et, ut videtur, in *Mexico*, in sylvis gregaria. (*Mus. Paris.*, *Berol.*, *Monac.*, *caet.*; multas vivas vidi).

*Observatio.* Ad nostram avem *Hernandezii* „*Haitinihuacama*“ (Mexicanis „*Alo*“ dicta) spectare videtur. *Hernand. Thes.* p. 38. cap. 117. lin. 13.

39. *S. Ararauna.* Fascia menti, latiuscula, arcuata, utrinque ad aures ducta, nigra, pone limbo virente aucta; capitis latera nuda, alba; striis tribus nigris plumosis a maxillae basi infra oculos versus

aures ductis; aliisque minoribus concoloribus, oblique ascendentibus ante oculos obsita; pili pusilli singuli in loribus; frons ac regio superciliaris virescentes; vertex, occiput, collum posticum ac totum notaeum, alae ac cauda supra, hypochondria et crissum laete ac intense coerulea, pro vario ad lucem objectu nonnihil in malachitaceo-viride vergentia; remiges omnes supra violaceo-coeruleae, rhachi nigra, pogonii margine lutescente; alae et cauda subtus toto sulphureo-aureae; regio parotica, collum laterale, tectrices alarum inferiores ac totum gastraeum, hypochondriis et crisso exclusis, eleganter lutea. *Mas et Foem. adult.*

*Psittacus maximus cyanocroceus* Aldrov. 1. p. 664. *Ara-Una* Marcgr. Hist. rer. nat. Bras. Lib. IX. p. 206. (*Lichtenst. Abh. d. Berl. Ak. 1815—16. p. 167.*) *Blue and yellow Macaw. Edw. 4. t. 159. (fig. bona).* *Ara brasiliensis cyaneocrocea* Briss. Av. 4. p. 193. t. 20. (*descript. opt.*). *Ara bleu et jaune* Buff. Pl. enl. 36. (*fig. mala*). *Psittacus Ararauna* et *Psitt. coeruleus* var.  $\beta$ . *Auctor. L'Ara rauna* Le Vaill. 1. c. t. 3. (*fig. mala*).

*Avis juvenilis.* Avi adultae similis, ptilosi minus nitida ac pura, cauda brevior.

Rostrum totum nigrum; pedes unguesque nigri, illi inter squamas albedo-pulverulenti; irides albo-flavidae, circa pupillam limbo pallidissime griseo nubilatae; cauda longissima, perquam gradatolanceolata. Longitudo 39", caudae 24", rostri ad frontem 3 $\frac{1}{4}$ ", alae 14 $\frac{1}{4}$ ", tarsi 1". Habitat frequens in *Brasilia* versus flumen Amazonum, in *Gujana*, *Surinam* ac, ut dicitur, in *Jamaica*, gregaria in sylvis. (*Mus. Paris., Berol., Monac. caet.*; multas vivas vidi).

40. *Canindé.* *Fascia colli antici supremi lata, turcino-coerulea*; colli antici pars reliqua, alarum tectrices inferiores ac reliquae

partes gastraei, abdomine excluso, laetissime aureo-flavae; alae et cauda subtus flavidae; caput supra viride; *abdomen* et reliqua pars ptiloseos laetissime coerulea. *Mas et Foem. adult.*

*Le Canindé Azar. Voy. n. 262.*

Rostrum nigrum; *irides halichlorae*; facies (*Araraunae*) ac caput subtus nuda *roseo-alba*; vittae tres pone oris angulum incipientes, horizontales e plumulis nigris compositae, ac aliae plumularum striae verticales in tota reliqua parte nuda. Longitudo 26", caudae 14½", tibiae 44"', tarsi 18"'. Habitat in *Paraguay*, Guaranis *Canindé* dicta. Habitus et vitae ratio specierum praecedentium. *Azara.* Non vidi.

*Observatio.* Secundum *Azarae* descriptionem species sane distincta, a *Sit. Ararauna* (quacum a *Sonnini* ac *Vieillot* jungitur) fascia menti coerulea, facie incarnata, abdomine coeruleo, iridibus halichloris ac statura multo minore satis diversa.

41. *S. Spixii.* Rostrum subparvum, corneo-nigrum; culmen maxillae totum, hujus et mandibulae apex extimus alba; basis frontis, tota regio ante oculos (pilis singulis subtilissimis obsita), pone et infra hos, mandibulae cera latiuscula ac mentum nuda, flava; capitis pars lateralis reliqua, superior ac jugulum dilute cano-coerulea; collum posticum et laterale nec non totum gastraeum, crisso incluso, cano-coerulea, halichloro-reflectentia; regio parotica canescens; notaeum totum, alae et cauda supra, alarum tectrices inferiores minores omnes laete coerulea, pro vario ad lucem objectu in halichlorum vergentia, plumis quasi dilutius limbatis; remiges ac rectrices omnes intus nigricanti-limbatae, rhachi nigra, subtus cum tectricibus inferioribus majoribus fuliginoso-nigricantes, micantes. *Mas adult.*

*Arara hyacinthinus Spix. Av. Bras. 1. t. 23. (fig. bona).*

Rostrum pro avis mole subparvum, laeve; maxillae culmen rotundatum, ante apicem subsinuatum; mandibula mediocris, pagina antica rotundata, ante apicem recto-truncatum submarginata; irides albicantes; pedes unguisque nigri; cauda admodum elongata, lanceolata; alae amplae, longae. Longitudo  $18\frac{1}{2}''$ , caudae  $9'' 10'''$ , alae  $6\frac{3}{4}''$ , rostri ad frontem  $1'' 5'''$ , tarsi  $9'''$ , digiti antici externi, excluso ungue,  $13\frac{1}{4}'''$ . Habitat gregaria in *Brasilia* versus flumen Amazonum. (*Mus. Monac.*).

42. *S. glauca*. tab. XXVI. Ptilosis tota halichlora, pro vario ad lucem objectu in hyacinthinum vergens, remigibus reetricibusque exceptis, latere inferiori nigris, nitentibus; rostrum totum nigrum; macula pone oculos nudiuscula, trigona et mandibulae basis nuda, albo-flavidae; reliqua capitis pars toto plumosa. *Mas adult.*

*Guacamayo bleu Azar.* Voy. n. 273. *Macrocercus glaucus Vieill.* N. D. 2. p. 259.

*Foemina.* Mari similis, eodem paullo minor.

Habitus *Sit. hyacinthinae*, hac tamen multo minor; diversa a *Sit. Spixii* statura multo majore, rostri pictura, caet. Lingua nigra, limbo-flavido; pedes unguisque nigri; palpebrarum margo colore floris rorismarini. Longitudo  $28\frac{1}{2}''$ , caudae  $14''$ , alae  $13\frac{1}{2}''$ , rostri ad frontem  $3'' 1'''$ , tarsi  $1'$ , digiti antici externi, sine ungue,  $1'' 8'''$ , ambitus rostri circa basin  $7'' 2'''$ . Habitat in *Brasilia* (*Montevideo*) ac in *Paraguay*, in arboribus cavis, ut dicitur, saepius in fissuris riparum perpendicularium ad fluvios *Parana* et *Uruguay* nidificans. (*Mus. Berol.*).

*Observatio.* Vide tabulam hujus monographiae psittacorum VI.

43. *S. hyacinthina*. Maxima; rostrum ingens, edentatum, corneo-nigrum; facies tota plumosa, excepta stricta parte trigona regionis paroticae ac baseos rostri, cum mento nuda flava; palpebrarum margo

niger; ptilosis tota laetissime hyacinthino-violacea, alteri luci opposita, intense coerulea; alae ac cauda subtus nec non alarum tectrices inferiores majores (minores coeruleae) nigrae; limbus remigum internus nigricans, harum ac rectricum rhachis atra; tectrices alarum superiores minores limbo apicali nigro. *Mas et Foem. adult.*

*Psittacus augustus* Shaw. Mus. Lever. p. 59. (*fig. satis accur.*). *Id.* Misc. t. 609. (*fig. pessim.*). *Psittacus hyacinthinus* Lath., Bechst., Kuhl. *Macrocerus hyacinthinus* Vieill. Gal. des Ois. Part. 2. p. 3. t. 24. *Aodorhynchus Maximiliani* Spix Av. Brasil. I. t. 1. (*fig. opt.*).

Cera maxillae prope frontem solummodo conspicua, strictissima, mandibulae latissima, in medio 7''' lata; maxillae culmen compressiusculum, obsolete biangulosum; hujus unguis longissimus, strictus, lateraliter non emarginatus; mandibula robustissima latere anteriori convexo-compressiuscula, lateribus subapplanata, ad tomiorum medium sinuata; irides fusco-atrae; lingua nigra; pedes nigri; unguis corneo-fusci; unguis digiti antici externi arcuatus longissimus; cauda longissima, admodum gradato-lanceolata; alae longiusculae, acutae. Longitudo 38½'', caudae 21'', alae 16¾'', rostri ad frontem 4¾'' (hujus ambitus prope basin 9''), tarsi 19''', digiti antici externi, excluso ungue, 2¼'', unguis 1¾''. Habitat in *Brasilia*, in palmetis retro flumen St. Francisci, in provinciis Minarum et Go-yazana, per paria, attamen gregaria in una eademque sylva nidificans. (*Mus. Monac., collect. dom. Sturm.*).

## XXII. Genus. *Tanygnathus*. Pag. 39.

1. *T. macrorhynchus*. Rostrum maximum, totum coccineum; caput ac collum totum, omnes corporis partes inferiores, dorsum, tergum supremum et pennae scapulares laete viridia, splendentia; tergum infimum ac uropygium turcino-coerulescentia; cauda viridis

subtus flavida, apice paullo dilutior; alae eleganter coerulescentes, pro vario ad lucem objectu viridi-reflectentes; remiges primariae laete coeruleae, margine coerulescentes, apice nigricantes; tectrices alarum superiores minores mediae ac nonnullae majores velutino-nigrae, aurantio-marginatae. *Avis adult.*

*Perroquet de la Nouvelle-Guinée Buff.* Pl. enl. 713. (fig. valde mediocr.). *Psittacus macrorhynchus Auctor., Kuhl. Grande Perruche de la Guinée Sonner. Voy. aux Indes II. p. 212. Psittacus nasutus Lath., Kuhl. Psittacus . . . Kuhl. l. c. p. 98. n. 194. Le Perroquet à bec couleur de sang. Le Vaill. l. c. p. 19. t. 35. (fig. opt.).*

Regio ophthalmica plumosa; cauda longa, apice gradato-rotundata; pedes fusco-cinerei; corpus crassum. Longitudo fere 15". Habitat in *Nova-Guinæa*, ac, ut dicitur, in insulis *Moluccis*. (*Mus. Paris.*).

2. *T. marginatus*. Fascia verticis, inter oculos sita, ad occiput usque extensa, tergum ac uropygium coerulea; frons, sinciput, capitis latera, collum ad latera et supra, dorsum, pennae scapulares ac caudae tectrices superiores saturate virides; collum anticum ac reliquae corporis partes inferiores viridi-flavida; alulae pennae virides flavo-marginatae; tectrices alarum superiores omnes coeruleae aureo-flavo-marginatae; remiges supra saturate virides, extus paullo flavo-marginatae, intus et subtus nigricantes, ultimae supra coeruleae, aureo-flavo-marginatae; rectrices omnes supra virides, subtus flavicantes. *Mas et Foem. adult.*

*Perroquet de l'isle de Luçon Buff.* Pl. enl. 287. *Psittacus olivaceus Auctor. La Perruche aux ailes chamarrées Le Vaill. l. c. t. 60. (fig. satis accur.).*

*Avis junior*. Pileus capitis et uropygium coerulea, viridi-mixta; tectrices alarum viridi-coeruleae, dilute rufo-marginatae.

*Psittacus lucianensis* Briss. 4. p. 295. t. 22. f. 2. et *Auctor*. *La Perruche de l'isle de Luçon* Sonner. Voy. à la Nouv. Guin. P. 80. t. 44. *Psittacus marginatus* *Auctor*.

Rostrum maximum, coccineum apice albidum; oculi perquam parvi, iride alba; pedes nigricanti-cinerei, unguibus nigris; cauda elongata, gradato-lanceolata. Longitudo  $12\frac{1}{2}''$ , caudae  $4\frac{3}{4}''$ , tarsi  $7\frac{1}{2}'''$ . Habitat in *Nova-Guinea* (et in insulis *Moluccis*?) (*Mus. Paris.*).

### XXIII. Genus. *Coracopsis*. Pag. 39.

1. *C. mascarina*. Taenia latiuscula totam rostri basin ambiens ac gula nigrae; gulae nigredo apice utrinque in taeniolam transversam excurrens; capitis partes reliquae et collum coerulescenti-cana, lilacino-subreflectentia; alae ac totus truncus saturate brunnea, pro vario ad lucem objectu griseo-reflectentia; partes trunci inferiores superioribus paullo dilutiores; rectrices dorso concolores, omnes, duabus intermediis exceptis, basi albae; rostrum totum rubrum. *Av. adult.*

*Psittacus mascarinus* Briss. Av. 4. p. 315. *Mascarin* Buff. Pl. enl. 35. (*fig. bona*). *Psittacus mascarinus* *Auctor*.

Cera, orbitalium regio nudiuscula ac irides rubrae; pedes pallide incarnati, unguibus griseo-fuscis; cauda longa, lata, subgradata. Longitudo  $13\frac{1}{2}''$ , caudae  $4\frac{1}{2}''$ , tarsi  $11'''$ . Habitus speciei subsequentis. Habitat in insula *Madagascar*. (*Mus. Paris.*).

*Observatio*. An *Psittacus obscurus Hasselquistii* (Reise nach Palaestina S. 293.) et auctorum est hornotina *Coracopsis mascarina*?

2. *C. nigra*. Ptilosis tota intense fuliginoso-nigricans, absque nitore; remiges ac rectrices pogonio externo, hi quoque versus basin in cano-ardesiaceum vergentes, parum micantes; reetricum rhachis fusca, subtus alba; cauda subtus cinerea, albo-reflectens; crissi plumae fere cinereae; genarum plumae lacerae, rigidae, pilei oblongae, apice rotundatae; lora nuda, pilis rigidis obteeta; palpebrae subciliatae; rostrum totum incarnatum, paratonis paullo obscurioribus; mentum nudum, flavidum. *Mas et Foem. adult.*

*The black Parrot from Madagascar Edw. 1. t. 5. (varietas quoad alarum pictur.). Psittacus madagascariensis niger Briss. 4. p. 317. Psittacus niger Auctor. Le petit Vaza Le Vaill. 1. c. t. 82. (fig. quoad rostri pedumque colorem non satis accur.). Id. Le grand Vaza 1. c. t. 81. (fig. quoad ped. et rostr. col. inaccur.). Psittacus obscurus Bechst. in Lath. Uebersetz. S. 89. n. 121. Psittacus Vaza Shaw. Gen. Zool., Kuhl. 1. c. p. 29. n. 52.*

*Varietas.* Ptilosis ordinaria, remigibus singulis albis (*specim. domefact.*).

Cera latissima, nigra; irides atro-fuscae; rostrum proportionatum, maxillae apice longo acuto, large sed non profunde sinuato; mandibula compressa, praesertim versus apicem subangustatum; regio ophthalmica nuda incarnato-cinerascens; pedes incarnati, unguibus nigris; cauda elongata, lata, subaequalis fere ut in *Deroptyo accipitrino* formata. Longitudo 21", alae 10 $\frac{1}{4}$ ", caudae 8 $\frac{1}{2}$ ", rostri ad frontem 2", ad oris angulum 2", tarsi 13", rostri ambitus basalis 4" 7<sup>'''</sup>. Habitat in *Africa meridionali* ac in insula *Madagascar*. (*Mus. Paris., Monac.*; plures vivas vidi.)

*Observatio.* Variat magnitudine; sunt specimina 14, 16, 18, 21" longa; Madagascariensia omnium maxima. — In exuviis rostrum dilute corneo-fuscum; pedes fusi.



XXIV. Genus. *Dasyptilus*. Pag. 40.

1. *D. Pecquetii*. Nitide et intense niger; caput et colli pars suprema nuda, illud pilis circa oculos et infra genas singulis nigris obsitum; venter, latera, regio ad anum, crissum, alarum tectrices superiores (basi nigrae) ac remigum secundariarum pogonium externum splendidissime coccinea; hae latere interno, primariae et rectrices omnes toto nigrae; jugulum totum et pectus squamoso-fasciata, plumis harum partium fusco-nigris, apice fulvo-rufo-limbatis; caudae tectrices superiores nigro-sanguineae, basi nigricantes; plumae uropygii fascia obscure purpurea terminatae; rostrum sordide nigrum; pedes ex purpureo-nigro violacei. *Avis adulta*.

*Psittacus Pecquetii Lesson* Bullet. univers. 1831. p. 241.

*Avis junior*. Remigum secundariarum pogonium externum nigrum, plus minusve rubescens.

Rostrum longius quam altum, curvatum, parum crassum, compressum; maxilla multo longior quam mandibula, convexa, admodum curvata, in apicem recurvatum terminata, acuta, ad tomia limbo (feston) aucta; *nares* rotundae, nudaе, in cute cirrosa sitae; mandibula brevis, convexa, subtus carinata, apice emarginato tenuis, utrinque ante apicem profunde emarginata; gnathidia mandibulae per interstitium ovale nudum separata; caput et collum supremum ex parte nuda; cutis harum partium circa oculos et infra genas plumis pili-formibus rigidis tecta; plumae occipitis et colli, rigidae, strictae, oppressae. *Alae* longae, robustae, acuminatae, caudam ultra medium cum apice obtegentes, remigibus validis, rigidis, angustis exstructae; harum pogonium compactum, internum externo angusto latius, ante apicem emarginatum; remix prima brevis, secunda quam prima longior, tertia quam quarta, omnium longissima, brevior, quinta longitudine tertiae; remiges secundariae rigidae, amplae, apice latae et ro-

tundatae. *Cauda* mediocris, ampla, valde tectiformis, apice rotundata, ex rectricibus 10 rigidis composita; rectricum pogonium internum latum, externum angustum. Tarsi breves, robusti, reticulati; hypodactyla ad latera cute emergente sublimbata; ungues robusti. *Ptilosis* rigida, sicca; pogonia plumarum subtilissime carbulata; plumae crissi longae, amplae, juguli latae, apice rotundatae. Longitudo 20—21". Habitat in *Patagonia* (an in *Nova-Guinea*?). *Lesson*: Non vidi, *Avis* admodum insignis fide *Lesson* tam *Sittacis* quam *Microglossis* proxima. Characteres generici praecipue e ptilosi, ut videtur, petendi. (Collectio dom. *Lesson*.; specimen mancum in Museo Parisiensi.

XXV. Genus. *Microglossus*. Pag. 41.

1. *M. aterrimus*. Facies large nuda, incarnato-rubra; ptilosis tota aterrima (avis vivae albo-pulverulenta, unde grisea); capitis plumae superiores lineares, longissimae, arcuato-deflexae; rostrum ingens, nigrum, quam maxime compressum; mandibula parva semel, maxilla bis emarginata.

*The great black Cockatoo* Edw. 3. t. 316. (fig. bona). *Psittacus aterrimus* Gmel., Kuhl. *Psittacus gigas* Lath. *L'Ara gris à trompe et l'Ara noir à trompe* Le Vaill. l. c. p. 30—33. t. 11., 12., 13. *Psittacus griseus* Bechst. in Lath. Uebers. d. Vög. *Psittacus Goliath* Kuhl. l. c. p. 92. n. 166. *Cacatua aterrima* Vieill. Nouv. Dict. 17. p. 13. *Id. Microglossus* Gal. des Ois. tab. 50.

Rostrum ingens, majus quam in *Sit. hyacinthina*, maxillae apice longo, acutissimo; lingua nigra, cylindracea, glande in apice parva, fissa, cornea exstructa, ultra rostri apicem emitti potest; tibiae supra tarsum nudiusculae; pedes et ungues nigri; cauda lata, longa, aequalis. Longitudo a naribus ad caudae apicem 1' 10" 6"', maxillae supra culmen 4", mandibulae supra myxam 2", unci maxillae ab

apice ad tomiorum dentem 1" 2"', tarsi 11"', digiti antici externi 1" 7"', interni 1", digiti postici externi 1" 3"', interni 10" (exclusis unguibus), alae a flexura ad apicem remigis longissimae 12½", caudae 10" 6"', plumarum subulatarum, longissimarum capitis 6" 6"', altitudo maxillae ad basin 1" 6"', mandibulae a rictu ad medium elevationis anterioris 1". Avis magnitudine admodum varians. Sunt specimina nunc emesso (in Museo Berolinensi) minora ac majora. Maxilla supra culmen interdum 2⅓" — 2¾", 4½", 5" longa; tarsi breves, plani. Habitat in insulis *Papuanis*, in *Waigiou*, in *Nova-Guinea*. (*Mus. Paris., Berol.*)

XXVI. Genus. *Calyptorhynchus*. Pag. 41.

1. *C. Leachii*. Rostrum intumidum, breve, atrum; maxilla perquam arcuata, fere rotunda, culmine cestriiformi-compressa, acuminata, apice brevi, mandibulae apicem parum transcendente, lateraliter paululum emarginato; mandibula crassa a basi ad apicem aequali latitudine; *crista frontis* supra verticem extensa e plumis elongatis, latiusculis, apice rotundatis-composita ac reliqua capitis ptilosis, collum, totus truncus supra et subtus nec non alae corvino-nigra, *omnino immaculata*; rectrices duae intermediae toto nigrae, quinque utrinque laterales basi et apice nigrae, reliqua parte immaculate coccineae. *Av. adult.*

*Psittacus Leachii* *Kuhl.* l. c. p. 91. n. 164. tab. 3. (*fig. bona*).

*Psittacus Cookii* *Temm.* Transact. of the Linn. soc. 13. p. 111.

*Calyptorhynchus Cookii* *Vtg. et Horsf.* l. c. p. 273.

*Avis. junior.* Avi adultae similis, ptilosis nigra magis in colorem cinereo-fuscescentem vergens, rostrum pallidius nigrum.

*Banksian Cokatoo* *Phill.* Bot. Bay. c. tab. p. 166. *Psittacus Banksii* variet. *γ.* *Lath.*

Habitus *Calyptorhynchi Temminckii*; regio ophthalmica nudiuscula, rubicunda (?); pedes griseo-fuscescentes. Longitudo 2'—2' 3<sup>'''</sup>. Habitat non infrequens in *Nova-Hollandia*. (*Mus. societ. Linn. Londin.*).

*Observatio.* In *Temminckii* descriptione rostrum falso plumbeo-tinctum vocatur.

2. *C. Temminckii*. Rostrum pallide corneum, perquam intumidum, fere rotundum; culmen maxillae cestriformi-compressum; mandibula a basi ad apicem aequali latitudine, maxillae tomia introrsum ducta recipiens; frons absque crista; vertex subcristatus; ptilosis capitis tota, colli ac totius corporis inferioris terreo-fusca; alae ac truncus supra nigra, viridi-reflectentia; *hae partes omnes immaculatae*, solummodo regio ophthalmica ac parotica, frons genaeque plus minusve flavido-induta, sed non maculata; rectrices duae intermediae toto nigrae, quinque utrinque laterales apice et basi nigrae, reliqua parte laetissime coccineae, *sine flavedine*, sed fasciis quinque angustis denticulato-undulatis; nigris dissectae.

*Banksian Cockatoo White Journ.* p. 139. c. tab. *Psittacus Banksii* var.  $\beta$ . *Lath. Psittacus Temminckii Kuhl.* l. c. p. 89. n. 162. *Psittacus Solandri Temminck.* *Transact. of the Linn. Soc.* 13. p. 115. *Calyptorhynchus Solandri Vig. et Horsf.* l. c. p. 274.

*Avis junior.* Caput ac collum plus minusve olivaceo-fuscescentia; regio parotica, ophthalmica, mentum et frons plus minusve flava; rostrum pallide corneum.

*Cacatua viridis Vieill.* *N. D.* 17. p. 13. et *Encycl. meth. Livr.* 93. Part. 29. p. 1415. (*descriptio manca*).

Habitus *Calyptorhynchi Leachii*; pedes unguesque obscuri.

Longitudo 1' 8—9". Habitat satis frequens in *Nova-Hollandia*.  
(*Mus. Paris., societ. Linn. Londin.*).

3. *C. stellatus*. tab. XXVII. Rostrum breve, altissimum, totum *albidum* excepto maxillae apice paullo corneo-fuscescente; culmen maxillae perquam elevatae semicirculare, a medio usque ad apicem cestriiformi-compressum, versus basin paullo obtusius compressum; maxilla ad basin perquam intumida, ad tomia introrsum inclinata, lateribus versus apicem angustata attamen non compressa, apice brevi, mandibulae apicem parum excedente, lateraliter parum emarginato; mandibula latissima a basi usque ad apicem aequali latitudine, maxillae tomia includens, in medio lateris antici latissimi, biangulosi perquam convexa, integra, superius apice largissime lunulato, ante apicem multo minus profunde emarginata; verticis crista brevis, frontis nulla; ptilosis capitis totius, colli ac alarum, trunci superioris ac inferioris nigra, in alis et dorso nitore virescenti-purpurina, subtus paullo in fuliginosum vergens; ptilosis immaculata, *exceptis capitis plumis lateralibus ac tectricibus alarum superioribus minoribus puncto ante apicem flavo notatis crissique plumis a basi usque ultra medium alternative flavo- et nigro-fasciatis*; rectrices duae intermediae toto nigrae; reliquae rectrices basi et apice large nigrae, reliqua parte, extus et intus, eleganter cinnabarinae, attamen *marginè interno limbo latiusculo flavo notatae*, omnes fasciis 5, 6, 7 angustiusculis, margine parum denticulatis, integris, aterrimis, paullo cberuleomicantibus dissectae; pagina inferior reetricum eadem pictura solum dilutiore insignis, fasciis versus rhachin sensim strictioribus, subundulatis; rhachis reetricum omnium apice extimo trigono terminato in cirrum brevem subtilissimum excurrens.

*Avis junior*. Ptiloseos nigredo minus intensa; pectoris plūmae hic et illic margine punctato-fasciolatae.

*Banksian Cockatoo Lath.* Synops. Suppl. 2. Fifthly var. p. 92.

Habitus speciei praecedentis; pedes parvi, obscuri; ungues nigri. Longitudo 1' 6", caudae 9 $\frac{1}{4}$ ", alae 12", maxillae ad frontem 2" 2"', ejusdem altitudo prope basin 1" 1"', latitudo ad basin culminis 2"', ante apicem  $\frac{1}{4}$ "', latitudo lateris anterioris mandibulae 10"', ambitus rostri ad basin 5". Habitat in *Nova-Hollandia*.

*Observatio.* Species haec differt a simillimo *Calyptorhyncho Temminckii* tectricibus superioribus minoribus alarum et plumis capitis flavo-punctatis nec non rectricum limbo interno flavo, a *Calyptorhyncho Cookii* et *C. Banksii* statura multo minore, rostri forma, caet. (Specimen descriptum Londini mecum communicavit dom. *Ryals*, aliud, juvenilius, exstat in Museo Berolinensi).

4. *C. Banksii.* Rostrum magnum, albo-flavidum; maxillae apex lateraliter subangustato-emarginatus, stricte corneo-fuscescens; maxilla alta, a basi usque ad medium intumida, dein abrupte compressa, culmine a basi usque ad extimum apicem aequali latitudine, depressa, biangulosa, in medio culminis ipsius longitudinaliter exarata; culminis latera paullo exarato-rugosa; mandibula robustissima versus latus anteriorius distincte biangulosa, medio longitudinaliter obsolete exarata, sensim angustiore, apice bidentata; maxilla mandibulae apicem transcendens; crista a sincipite ad occiput extensa, compressa, majuscula, caput, collum laterale ac posticum, dorsum, tergum, uropygium, caudae alarumque tectrices superiores omnes, pennae scapulares ac omnes remiges extus et intus corvino-nigrae; plumae frontis, sincipitis totius, capitis lateralis ac cristae ante apicem macula unica pusilla, cordiformi, flava, tectrices alarum superiores minores plumaeque flexurae macula majore, subtrigona, albida notatae; rectrices duae intermediae toto nigrae; rectrix sequens utrinque nigra, in medio pogonii externi fasciis circiter quatuor rubro-variolosis notata; tertia rectrix utrinque basi et apice per spatium largum nigra, in medio pogonii externi rubra, ibidem raro nigro-punctata et fasciis. 6—7

nigris, subobliquis dissecta; pogonio interno serie duplici macularum subquadrangularum notata, quarum internae rubrae, externae, ab internis interstitio nigro diremtae, flavae; rectrices reliquae rectrici nunc descriptae similes, sed pars pogonii interni flava ab ejus parte rubra nullo interstitio nigro diremta; partes rubrae et flavae plus minusve nigro-variolosae; fasciae flavae in latere inferiori caudae pro vario ad lucem objectu rubro-reflectentes; rhachis rectricum omnium tota nigra; plumae colli antici ac totius trunci inferioris nigrae, omnes fasciis duabus flavidis, in collo antico nitidioribus, notatae, quarum una ante apicem, altera in medio plumae; crissi plumae nigrae, fasciis quatuor flavo-rubicundis, undulatis notatae; tectrices alarum inferiores corvino-nigrae, fasciola ante apicem latiuscula flavida signatae; lora setoso-pilosa. *Mas et Foem. adult.*

*Psittacus Banksii* Lath. (exclus. varietat.  $\beta$ .  $\gamma$ ). *Id.* Synops. Av. sup. p. 63. tab. 109., *Kuhl.* l. c. p. 90. n. 163. *Temm.* Transact. of the Linn. Soc. 13. p. 112. *Psittacus magnificus* Shaw. Nat. Misc. t. 50. (fig. mala). *Calyptorhynchus Banksii* Vig. et Horsf. Transact. of the Linn. Soc. 15. p. 271.

*Avis junior.* Ptilosis fuliginoso-nigra; cristae plumae vix maculatae; maculae in alarum tectricibus superioribus minores.

Habitus speciei subsequentis; regio ophthalmica parum nuda; cera stricta, nigricans, setulis subobsita, pedes fuscescenti-nigricantes, squamularum interstitiis dilutioribus; ungues corneo-fusci; cauda longissima, rectricibus lateralibus paullo gradatis. Longitudo 26—27", caudae 15" 2"', alae 16<sup>3</sup>/<sub>4</sub>", tarsi 9"', digiti antici externi, excluso ungue, 1" 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"', maxillae ad frontem 2", ejusdem altitudo prope basin 1" 2"', latitudo in basi culminis fere 4"', ejusdem in medio 3"', latitudo lateris anterioris mandibulae 6"', ad basin 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"', ambitus rostri ad basin 5" 4"'. Habitat satis frequens in *Nova-Hollandia*, inquilinis *Geringora* dictus, tria ova pariens, radicibus

bulbosis fructibusque victitans; avis timida in sylvis montium coerulearum inter *Eucalyptos* magnos gregibus parvis degens. (*Mus. Paris., Societ. Linn. Londin., Monac.*)

*Observatio.* *Lathamii* varietas  $\beta$  *Psittaci Banksii* spectat *Calyptorhynchum Temminckii*, varietas  $\gamma$ . *Calypt. Leachii*, varietas C (*first et fourthly* variety, Synops. Suppl. 2. p. 91. 92.) *Calypt. funereum*. E reliquis varietatibus auctorum sine autopsia exemplarium ab iis observatorum nihil certi colligere valeo, quare earum descriptiones ponere nolui.

5. *C. funereus*. Rostrum altissimum, perquam compressum, toto flavido-album, solum in utriusque maxillae apice nigricans; maxilla ante apicem sinu semicirculari profunda insignis, culmine angusto bianguloso rotundata; mandibulae latus anterius angustiusculum, distincte biangulosum, in medio apicis lunulato-emarginata; tomia recta; macula parotica aurium majuscula pallide sulphurea, e plumis rigidiusculis, discretis composita; plumae latera mandibulae obtegentes antrorsum versae; capitis crista parva ex plumis longiusculis, latiusculis, apice rotundatis composita tota, collum posticum, dorsum, tergum, uropygium, caudae alarumque tectrices superiores omnes, pennae scapulares remigesque omnes extus et intus atra, pro vario ad lucem objectu nonnihil purpurino-viridi-reflectentia; plumarum limbus apicalis ut plurimum dilutius micans; rectrices duae intermediae toto nigrae, parum micantes, reliquae basi et per spatium largum apice (rectrix extrema extus quoque) nigrae, in reliqua parte, supra ac subtus, pallide sulphureae, lineolis e punctis fuliginosis compositis, irregularibus, inter se cohaerentibus, conspersae numerosissimis; pogonium externum rectricis secundae parum aut vix fuliginoso-conspersum, flavum, margine extimo nigricans; pogonium externum rectricis tertiae raro punctulatum; rhachis rectricum omnium nigra; plumae colli antici, totius corporis inferioris, marginis alarum harum-



que tectrices inferiores fuliginoso-nigrae, plus minusve distincte olivaceo-flavido-, tectrices inferiores laetius sulphureo-olivaceo-limbatae. *Mas et Foem. adult.*

*Psittacus funereus* Shaw Nat. Misc. t. 186. (*fig. mala*), *Lath. Ind. Suppl.*, *Kuhl. l. c. Banksian. au Cackatoo* Var. 6. *First et fourthly variety*. *Lath. Synops. suppl. 2. p. 91. 92.* *Calyptrorhynchus funereus* Vig. et Horsf. *Transact. of the Linn. Soc. 15. p. 271.*

*Avis juvenilis.* Ptilosis fuliginosa; limbus tetricum inferiorum alarum ac plumarum gastraei, praesertim laterum, distinctior, intensius flavus; crissi plumae fuliginosae margine apicali flavae, in medio flavo-irroratae; rectrix secunda et tertia in parte flava pogonii externi, sicut in latere interno fuliginoso-conspersa.

Regio ophthalmica nuda, rubra; lora plumosa; plumae totius capitis, colli ac trunci latae, apice recto- aut rotundato-truncatae; cauda longissima, lata, rectricibus lateralibus parum gradatis; alae longae, acutae; pedes hispido-squamulosi, cinereo-fusci, unguibus validis, corneo-fuscescentibus. Longitudo 2' 4", caudae 13", alae 15 1/2", tarsi 11", digiti antici externi, excluso ungue 1" 10", maxillae ad frontem 2 1/2", ejusdem altitudo prope basin 1" 2", latitudo in basi ac in medio culminis 3", rostri ambitus ad basin 5 1/4". Habitat satis frequens et gregibus parvis in *Nova-Hollandia*, ova duo pariens; inquilinis Wyla dictus. (*Mus. Paris.*, *Societ. Linn. London.*, *collectio Sturm*).

*Observatio.* Sunt specimina adulta, quorum mandibula alba, apice plumbea, maxilla pallide cornea, plumbeo-adumbrata.

[XXVII. Genus. *Corydon*. Pag. 42.

1. *C. galeatus*. Caput ac pilei plumae elongatae, graciles, erec-

tae, laceræ, cristam apice antrorsum versam formantes, coccinea; plumæ colli postici, dorsi, tergi, uropygii, caudae ac alarum tectrices superiores et pennae scapulares obscure cineraceae, ad viride vergentes; pluma quavis albido-limbata; mentum ac omnes reliquae gastræi partes pallide cineraceo-virentia, fasciis rubicundis (praesertim abdomen) ac viridulis variegata; remiges nigricanti-cineraceae, dilutius fasciolatae; rostrum flavidum. *Av. adult.*

*Red-topped Parrot Lath.* Synops. Suppl. 2. p. 369, t. 91. *Id. Psittacus galeatus* Ind. ornith. 2. Suppl. p. 23., *Kuhl. Caca-tua galeata Vieill.* l. c. *Calyptorhynchus galeatus Vig.* et *Horsf.* l. c.

*Avis juvenilis.* Frontis margo anterior obsolete rubicundus; plumae frontis reliquae verticisque pallide ardesiacae, verticis longissimae, apice sursum flexae, discretæ, pogoniis undantibus; plumae genarum, colli postici, dorsi, tergi, uropygii, alarum caudaeque tectrices superiores nec non remiges ultimae nigricantes, fasciis cinerascensibus in utroque latere albido-sive virescenti-albido marginatis dissectae; omnium margo apicalis cinerascens; plumae colli antici, pectoris, ventris, abdominis ac tibiarum cinerascens, medio fasciis pluribus flavido-albis dissectae, apice fasciola rubicunda (in abdominis plumis rubra) terminatae; alarum caudaeque tectrices inferiores cineraceae lineolis undulatis transversis albo-flavidis (in crissi plumis cineraceo-conspersis) variegatae; alarum tectrices inferiores majores cinerascens, in utroque pogonio fasciis brevibus albis notatae; remiges nigricantes, extus et intus, excepto apice, canescentes, ibidemque a basi usque ultra medium ad marginem maculis notatae, in pogonio externo albido-canescensibus, numerosis, subquadratis, in pogonio interno angustioribus, albis, cano-conspersis; remiges secundariae extus ejusdem picturae, attamen viridi-lavatae; remigum pagina inferior superiori concolor, pictura obsoletiore; rectrices omnes supra et subtus cineraceo-nigricantes, fasciis numerosis, margine undula-

tis, canescentibus variegatae; rostrum sordide corneo-albidum. (*Foem. Auctor.*).

*Av. juv. adultae ptilosi se induens.* Avi juvenili similis, crista plumis intermixtis rubris variegata.

Rostrum breve, validum; maxilla compressa, culmine biangulosa ad latera apicis perquam sinuata, acuta; mandibula robustissima, latere anteriori latissima, biangulosa, in medio apicis sinu trigono insignis, unde quasi bidentata; capitis latera plumosa; regio ophthalmica subnuda; cauda mediocris, aequalis; pedes parvi, coerulescentifusci; ungues corneo-fuscescentes; plumae capitis, colli, notaei ac gastraei latae, apice recto-sive rotundato-truncatae. Longitudo  $14\frac{1}{4}$ " , caudae 6" , alae 10" , rostri ad frontem 1"  $6\frac{1}{2}$ " , tarsi 4" , plumarum cristae  $2\frac{1}{2}$ " . Habitat in *Nova-Hollandia* australi. (*Mus. Paris., collectio Sturm., in qua avis juv.*).

*Observatio.* Praeter *Hecalem hypopoliam* inter psittacos hucusque notos unicus, qui remigum pogonium internum falconum ad instar maculatum habet.

### XXVIII. Genus. *Cacatua*. Pag. 42.

1. *C. roseicapilla.* Verticis crista parva, caput ac collum, gastraeum totum alarumque tectrices inferiores laetissime rosea; verticis crista nonnihil in album vergens; crissum, pennae scapulares, dorsum, tergum, uropygium, caudae alarumque tectrices superiores omnes, nec non remiges et rectrices pallide cineracea; cauda versus apicem et remiges intus parum obscurius adumbratae. *Av. adult.*

*Cacatua roseicapilla Vieill.* Nouv. Dict. d'hist. nat. 17. p. 12. *Id.* Encycl. meth. Livr. 93. Part. 29. p. 1414. *Id.* Gal. des Ois. Part. II. t. 25. *Psittacus Eos Kuhl.* l. c. p. 88. n. 159.

*Temm.* Pl. col. t. 81. (fig. opt.). *Plyctolophus Eos Vig.* et *Horsf.* l. c. p. 269.

Rostrum parvum, flavidum; regio ophthalmica nuda, pallida; pedes fusciscenti-grisei, unguibus corneo-nigris; cauda medio-cris, aequalis; verticis crista ob reliquas pilei plumas longulas apice rotundatas non distinctissima. *Cacatua sulphurea* parum minor, 12" longa. Habitat in *Nova-Hollandia*. (*Mus. Paris., collectio Societ. Linn. Londin.*)

2. *C. Philippinarum*. Pileus crista depressa, mediocri, e plumis latiusculis, apice rotundato-truncatis, occiput paullo transcendentibus, subarcuatis, integris composita rosea ornatus; plumae cristae anteriores supremae albae, basi sulphureae; regio parotica subtiliter roseo-induta; reliqua capitis ptilosis, notaeum ac gastraeum, caudae et alae cretaceo-alba; crissi plumae roseae, apice albae; caudae tectrices et pennae scapulares basi, remigum rectricumque pogonium internum maxima ex parte sulphurea. *Mas et Foem. adult.*

*Cacatua minor Briss.* 4. p. 212. t. 22. f. 1. (*descript. opt.*). *Petit Kakatoes des Philippines Buff.* Pl. enl. 191. (*fig. accur.*). *Psittacus Philippinarum Auctor.*

Magnitudo fere *Cacatuae sulphureae*; cera cinereo-alba, rostrum album, basi dilute cinereum; pedes et ungues albido-plumbei; cauda aequalis, mediocris. Longitudo 13½", caudae 4½". Habitat rarior in insulis *Philippinis* (Plura specimina vidi in mus. Paris.).

*Observatio.* *Brownii* tabula ab auctoribus citata spectat ad *Lycmetem tenuirostrem*.

3. *C. Leadbeateri*. Alba; genae, jugulum, pectus, tectrices alarum inferiores et abdomen medium roseo-induta; plumae cristae occipitalis elongatae, basi roseae, apice albae, macula flava in medio

notatae; pogonium internum remigum et rectricum roseum, illarum saturatius tinctum.

*Plyctolophus Leadbeateri* Vig. Philos. Magaz. 1831. p. 55.

Statura *Cacatuae sulphureae*. Habitat in *Nova-Hollandia*. (*Mus. dom. Leadbeateri* Londin.). Non vidi.

4. *C. moluccensis*. Pilei crista magna e plumis subarcuatis, latiusculis, cinnabarino-rubris, albo-pulverulentis, apice albis composita; plumae cristae superioris, ala, cauda ac reliqua ptilosis albae, plumae omnes, praesertim versus basin, subtilissime roseo-, remiges et rectrices intus flavo-indutae; orbitae nudaе, albae. *Mas* et *Foem. adult.*

*The greater Cackatoo* Edw. 4. t. 160. (*fig. opt.*). *Cacatua rubro-cristata* Briss. 4. p. 209. *Le Kakatoes à huppe rouge* Buff. Pl. enl. 498. (*fig. mediocr.*). *Psittacus moluccensis* Gmel., Kuhl. *Psittacus rosaceus* Lath.; *Cacatua rosacea* Vieill. l. c.

Rostrum, pedes unguisque nigra, tota ptilosis (avis vivae) albo-pulverulenta; cera cinerascens, albo-pulverulenta; irides fusco-atrae; colli plumae laterales latae, longae, apice rotundato-truncatae. Avis irritata aut terrefacta non solum cristae pluma, quae musculo cutaneo proprio erigi possunt sed colli imprimis ac totius trunci in altum extollit, voce rauca quam maxime penetrante clamans, ac truncum a latere ad latus motitans; lingua cinerea crassa, apice obtusa. Longitudo  $20\frac{3}{4}$ "", digiti postici externi  $1''\ 10'''$ , alae  $14\frac{1}{4}$ "", cristae pilei  $7\frac{1}{2}$ "". Habitat in insulis *Moluccis*, satis frequens in *Sumatra*. (*Mus. Paris.*, *Berol.*, *Monac.*; multas vivas vidi).

5. *C. cristata*. Pilei crista e plumis latis, rectis, apice rotundato-truncatis, longis composita, depressa, magna ac reliqua ptilosis totius avis cretaceo-albae; remigum et rectricum pogonium internum sulphureo-flavescens. *Mas* et *Foem. adult.*

*Psittacus albus cristatus* Aldrov. 1. p. 667. *Cacatua* Briss. 4. p. 204. t. 21. *Kakatoes des Moluques* Buff. Pl. enl. 263. (fig. mediocr.). *Psittacus cristatus* Gmel., Lath. (in synonymia), Kuhl. *Cacatua cristata* Vieill. 1. c.

Rostrum mediocre, pedes unguesque nigra, albo-pulverulenta; regio ophthalmica nudiuscula alba, ad coeruleum parum inclinans; irides fusco-atrae; cauda mediocris, aequalis. Magnitudo fere *Cacatuae galeritae*. Longitudo 18", caudae 6", tarsi 10", cristae 5". Habitat satis frequens in insulis *Moluccis*, irritata canis in modum latrans. (*Mus. Paris.*; multas vivas vidi).

*Observatio.* Auctorum diagnosis *Psittaci cristati* spectat ad *Cacatuam galeritam*, sive ad *Cacatuam sulphuream*.

6. *C. galerita*. Frontis crista exserta, longissima, ultra occiput extensa, angusta, cum apice antrorsum torta, sulphureo-flava, apice extimo vix conspicue alba, e plumis integris, basi solum discretis, versus apicem subcylindraceo-convolutis, inde inferius canaliculatis composita; frontis plumae anteriores cristae basin obtegentes, capitis totius, notaei ac gastraei, alarum caudaeque pilosis cretaceo-albae, pulverulentae; rectrices et remiges pogonio interno pallide sulphureae. *Mas et Foem. adult.*

*Crested Kakatoo* White Journ. p. 237. c. tab. *Psittacus galeritus* Lath., Kuhl. 1. c. *Cacatua galerita* Vieill.

Rostrum nigricans pro avis mole mediocre, compressum; maxillae culmen angulosum; tomia profunda sinuata; mandibula compressa, pagina antica angulosa; pedes unguesque nigri, illi albo-pulverulenti; regio ophthalmica parum nuda, alba, vix coerulescens; irides fusco-atrae; cauda mediocris, aequalis. Longitudo 20 $\frac{1}{4}$ ", caudae 7 $\frac{1}{2}$ ", alae 12 $\frac{1}{4}$ ", tarsi 5 $\frac{1}{4}$ ", rostri ad frontem 19 $\frac{1}{2}$ ", cristae frontis 5 $\frac{1}{2}$ ". Habitat frequens in *Nova-Hollandia* et in *Nova-Guinea*, Papuanis

*Mangarape* dicta. Facile mansuescens et vocem humanam egregie aemulans. (*Mus. Paris., collect. Sturm.*; multas vivas vidi).

7. *C. sulphurea*. Crista pilei e plumis longissimis, compressis, infra canaliculatis, versus apicem sursum flexis, sulphureis, ad frontem brevioribus, latis, apice rotundatis albis, basi sulphureis composita; regio parotica ochraceo-sulphurea; ptilosis capitis et colli reliqua, notaei ac gastraei, alae caudaeque cretaceo-alba; plumae colli, capitis nec non pectoris lateralis basi sulphureae, reliquarum partium trunci pallidissime sulphureae; pogonium internum remigum et rectricum maxima ex parte sulphureum. *Mas et Foem. adult.*

*The lesser white Cackatoo with a yellow crest* Edw. 3. t. 317. (*fig. bona*). *Cacatua luteo-cristata* Briss. 4. p. 206. *Petit Kakatoes à huppe jaune* Buff. Pl. enl. 14. (*fig. mala*). *Psittacus sulphureus* Gmel., *Lath. Cacatua sulphurea* Vieill. 1. c.

Rostrum plumbeo-nigricans; maxilla ad tomia profunde sinuata; regio ophthalmica nudiuscula, alba, irides fusciscenti-rubentes; pedes et ungues nigricantes, illi albo-pulverulenti; cauda mediocris aequalis. Longitudo  $14\frac{1}{2}$ " , caudae  $4\frac{1}{4}$ " , alae  $8\frac{1}{2}$ " , rostri ad frontem  $1'' 9\frac{1}{2}$ ". Habitat in insulis *Moluccis*, praesertim frequens in *Nova-Guinea*. (*Mus. Paris. caet.*; multas vivas vidi).

#### XXIX. Genus. *Licmetis*. Pag. 43.

1. *L. tenuirostris*. Frontis crista parva, ovata, depressa, e plumis latiusculis, apice rotundatis, albis, basi rosaceis composita; lora dilute aurantia; plumae totius capitis, colli, alarum ac totius trunci albae; capitis latera rosaceo-induta; abdomen et crissum nonnihil in flavo-rubicundum vergentia, hoc interdum (in ave juniore) prorsus album; rectrices albae, subtus a basi fere usque ad apicem sulphureae; remiges omnes albae. *Av. adult.*

*The red-vented Cackatoo Brown.* Illustr. pag. 10. t. 5. *Der kleine rothbauchige Kakatu Otto* in *Buff.* Uebers. d. Vög. Bd. XIX. S. 53. *Psittacus tenuirostris Kuhl.* l. c. p. 88. *Psittacus nasicus Temm.* Transact. of the Linn. Soc. 13. p. 115. *Id.* Pl. col. t. 331. (*fig. opt.*).

Rostrum mediocre, albidum, apice flavidum, fere ut in *Hecale hypopolia* formatum; maxilla quam maxime producta, minus deducta, ab emarginatione usque ad apicem angustissima; mandibula brevis, rotundata; regio ophthalmica nudiuscula; cauda mediocris, aequalis; pedes cinerei, unguibus majusculis, nigris. Longitudo  $15\frac{1}{2}$ ". Habitat in *Nova-Hollandia.* (*Mus. Paris.*; aliud specimen nunc descripto simillimum vidi Londini, ni fallor, in avium collectione pulchra dom. *Brookes.*).

*Observatio.* Avis haec ab auctoribus cum *Cacatua Philippinarum* false unita et a clis. *Kuhl* et *Temminck* pro specie nova indicata est.

### XXX. Genus. *Nestor.* Pag. 43.

1. *N. hypopolius.* Rostrum magnum, plumbeo-nigricans, apice nigricans; maxilla perquam extensa, angusta; frons, sinciput ac vertex (non cristata) cana, subtilissime virescenti-induta; macula in regione parotica aureo-flava ad rubicundum vergens; occiput, collum posticum, dorsum, tergum, alae ac cauda supra in fundo obscure cinereo cupreo-virescentia; plumae genarum, menti, juguli, totius colli lateralis, pectoris, ventris ac abdominis castaneo-rubicundae, viridifimbriatae; uropygium et crissum obscurius castaneo-rubra; margo plumarum omnium trunci obscurus; rectricum rhachis in cirrum subtilem, brevem excurrentem; illae sicut alae latere inferiori alternatim fusco- ac rubicundo-fasciatae, apice fuscae; tectrices alarum inferiores virescentes nigro-variae ac obscure coccineo-maculatae. *Av. adult.*



*Psittacus hypopolius* Reinh. Först. in Manusc. Id. Icones inedit. t. 50. (fig. opt.). *Psittacus meridionalis* Gmel. *Psittacus Nestor* Lath., Ruhl. *Psittacus australis* Shaw. Mus. Lever. p. 87. (figura adjecta mediocris).

Regio ophthalmica nudiuscula, albido-cinerascens; rostrum fere ut in *Lycmete tenuirostri* formatum; maxilla prolongata, attenuata, sine dente vero, sensim curvata, compressa (maxillam *Loxiae curvirostrae* quoad formam universalem aemulans); mandibula versus apicem attenuato-compressum sensim subadscendens, parva; acies infra apicem maxillae (pro recipiendo apice mandibulae) perquam distincta, arcuata, latere postico longitudinaliter striato-sulcata, contra pagina infera apicis maxillae profunde excavata et laevis; pedes coerulescentes, unguibus nigris; cauda mediocris, aequalis. Magnitudo *Calyptrorhynchi Banksii*, attamen cauda multo brevior, fere 16" longa. Habitat in *Novae-Seelandiae* portu obscuro (*Dusky-Bai*), inquilinis *Haghää* dicta (*R. Forster*). (Mus. Paris.; aliud specimen nitidum vidi apud dom. *Vigors* Londini.

## Characteres specierum ex ordine Psittacorum \*).

### I. Genus. *Palaeornis*. Pag. 44.

1. *P. Alexandri*. Viridis; macula alarum supra humeros purpurea; macula menti atra infra ex utroque apice in lineam concolorem excurrente, cum utroque apice fasciae cervicalis roseo-rubrae connexa, rostro sanguineo; maxillae apice extimo flavido. 19½". *Av. adult.* *Asia*.

*Av. hornot. et juv.* Macula alarum avis adultae; ptilosi reliqua toto viridi; rostro pallidius rubro.

2. *P. cubicularis*. Viridis; occipite cerviceque in amethystinum vergentibus; fascia cervicis rosea supra colli latera transversim extensa, suboculta; macula menti (ut in ave praecedente) cum cervicis fascia connexa striolaque in loris atris; rectricibus duabus intermediis coerulescentibus; rostro purpureo, apice nigricante. 17". *Av. adult.* *Africa*.

*Mas biennis*. Cervicis fascia subconspicua; mento viridi; rostro basi subcoccineo.

*Avis hornot.* Pallide viridis, sine rubedine et nigredine; rectricum apice supra coerulescente; rostro obscure rubicundo, apice obscuriore.

---

\*) Characteres nonnullorum psittacorum mihi dubiorum exhibui post diagnosis *Hecales hypopoliae*.

3. *P. borneus*. Viridis; capite coeruleo-purpurascente; linea a fronte ad oculos ducta et macula genarum atris; jugulo ex rubicundo-purpurascente castaneo; rectricibus rhachi alba, intermediis coerulescentibus; maxilla rubra, mandibula nigra. 12". *Av. adult. Asia.*

4. *P. melanorhynchus*. Viridis; capite cano; lineola frontis ad oculos ducta maculaque genarum atris; jugulo roseo; tectricibus alarum superioribus mediis flavidis; rectricibus supra juxta rhachin coerulescentibus; rostro nigro. 12 $\frac{3}{4}$ ". *Asia.*

5. *P. pondicerianus*. Ptilosi praecedentis; maxilla corallino-rubra, apice flavida, mandibula concolore pallidiore. 12 $\frac{1}{2}$ ". *Av. adult. Asia.*

*Av. hornot.* Virescens; capite (sine lineola atra) griseo; occipite virescente, vinaceo-vario; genarum macula fuliginoso-varia; remigibus et rectricibus flavo-marginatis; rostro testaceo-fusco, paratonis rubescente, apice albido.

6. *P. barbatus*. Viridis; loris castaneis linea intermedia atra; pileo viridi; cervice purpurascente; macula genarum nigra; remigibus extus coeruleis; rostro rubro. 7" (sine cauda). *Asia.*

7. *P. malaccensis*. Notaeo viridi; gastraeo flavo-viridi; capite roseo-rubro, supra viridi; vitta genarum atra, pone attenuata; rectricibus 2 intermediis coeruleis, apice viridibus; uropygio ac dorso supremo coerulescentibus; maxilla rubra; mandibula rubro-nigricante. 14 $\frac{1}{2}$ ". *Av. adult. Asia.*

8. *P. bengalensis*. Notaeo viridi; gastraeo viridi-flavo; capite toto in fundo roseo-rubro-lilacino, inferius linea nigra cincto; cervice ac uropygio coerulescentibus; humeris stricte purpureis; rectricibus 2 intermediis supra coeruleis, apice albis, reliquis extus viridicoerulescentibus, intus et apice flavidis; maxilla cerato-flavida, mandibula corneo-fuscescente. 14 $\frac{3}{4}$ ". *Av. adult. Asia.*

9. *P. incarnatus*. Viridis; macula menti coccinea; tectricibus alarum superioribus rubicundis, rostro incarnato. Magnitudine circiter praecedentis. Habitat . . . .

10. *P. cyanocephalus*. Notaeo olivaceo-viridi; gastraeo viridi; capite violaceo; gula in cinereum vergente; fascia cervicis lutea; reetricibus subtus cinereo-luteis, 2 intermediis versus apicem coeruleis, lateralibus flavo-terminatis; maxilla lutea, mandibula cinerea. 12 1/2". *Av. adult. Asia.*

*Av. junior.* Capite dilutius violaceo ad griseum vergente; torque cervicali subdistincta; rostro albido.

11. *P. columboides*. Bitorquatus; dorso abdomineque imis, alis caudaque supra viridibus; capite, pectore, dorso abdomineque summis plumbeo-canis; torque collari superiore gracili gulaque nigris; torque inferiore lata, fronte regioneque periophthalmica coerulescenti-viridibus. Magnitudo *P. Alexandri*. Patria . . . ?

## II. Genus. *Polytelis*. Pag. 57.

1. *P. Barrabandi*. Viridis; fronte, sincipite, genis et gula aurantio-flavis, hac linea semicirculari aurantio-coccinea terminata; tibiis coccineo-variegatis; alula coerulea; reetricibus intermediis coerulescentibus; rostro rubro. 15". *Av. adult. Nova-Hollandia.*

## III. Genus. *Pezoporus*. Pag. 58.

1. *P. formosus*. Saturate viridis, ptilosi striolis maculisque parvis nigris irregulariter flavo-fasciatis undique variegata; reetricibus crebro fasciatis; remigibus intus nigricantibus macula medio pallide flava trigona notatis, extus viridibus macula intermedia marginali flava; frontis margine anteriore rubro; maxilla corneo-fuscescente; mandibula corneo-albicante. 11 3/4". *Av. adult. Nova-Hollandia.*

*Av. junior.* Frontis margine rubro nullo sive strictissimo, aurantio.

IV. Genus. *Nymphicus*. Pag. 60.

1. *N. bisetis*. Viridis; fronte verticeque rubris, cum pennis duabus erectis, linearibus, atris apice coccineis; genis atris; nucha ac aurium regione flavis; remigibus primariis extus cyaneis; rectricibus extus basi viridibus, a medio ad apicem cyaneis; rostro coerulescente, apice nigro. *Av. adult.* *Platycerco eximio* paullo major. *Nova-Caledonia*.

2. *N. Novae-Hollandiae*. Fusco-olivaceus; capite supra et ad latera gulaque luteis; macula pone oculum coccinea; vertice pennis 6 erectis gracilibus, longissimis; remigibus secundariis apice albis; rostro pallido. 12". *Mas. Nova-Hollandia*.

*Foem. sive av. juv.* Capite (ut in mare cristato) ac trunco fusco-olivaceis, ad castaneum vergentibus; macula pone oculos coccinea; uropygio ac cauda lineis transversis griseis notatis; rectrice extima extus alba; remigibus secundariis albo-terminatis.

V. Genus. *Prioniturus*. Pag. 61.

1. *P. platurus*. Viridis; macula occipitis magna griseo-coerulea, fascia in vertice inter oculos angusta cinereo-rubra terminata; dorso subgriseo; fascia cervicis flavo-aurantia; tectricibus alarum superioribus minoribus coeruleo-cinereis; rectricibus supra parte apicali coeruleis; rostro corneo-fusco. 11". *Insulae Archipelagi Indici*.

? *Juv. sive Foem.* Priori similis; vertice sine vitta rubra; cervice sine fascia flava; rostro albido; rectricibus 2 intermediis aequo modo ante apicem nudis.

VI. Genus. *Platycercus*. Pag. 62.A. *Rectricibus admodum gradatis*.

1. *P. auriceps*. Laete viridis; frontis fascia ad oculos ducta crissoque purpureis; vertice flavescenti-aureo; cauda viridi flavo-marginata; remigibus nigricantibus extus stricte viridi-limbatis, basi coeruleis; rostro basi plumbeo. *Platycerco Novae-Seelandiae minor*. *Nova-Caledonia, Nova-Seelandia*.

2. *P. pacificus*. Obscure viridis; striola a maxillae basi supra lora per et ultra oculos ducta uropygioque coccineis; fronte sincipiteque atro-coccineis; temporibus prasinis; remigibus nigricantibus, primariis alulaeque pennis extus coeruleis; rectricibus cyaneis, margine viridibus; rostro plumbeo apice nigro. 12½". *Mas. O-Tahiti, Oriadea*.

*Foem.* Uropygii lateribus coccineis; rectricibus supra viridibus.

*Juv. hornot.* Avi adultae similis; vertice fuscescente; cervice flavido-varia; dorso medio pallide ferrugineo-fusco; abdomine cinereo-viridi; remigibus primariis fuscis margine coeruleis, secundariis alulaeque pennis apice et rhachi rufis.

3. *P. Novae-Seelandiae*. Virens; fronte et macula pone oculos sanguineis; remigibus primariis limbo externo, alula et tectricibus secundis extimis coeruleis; alis subtus fuscis per remigum marginem anteriorem fascia ex maculis flavis et alia concolore per marginem anteriorem tectricum secundariorum inferiorum notatis; rectricibus supra fusco-viridibus, utrinque apice flavis; rostro plumbeo apice nigro. 9". *Nova-Seelandia*.

4. *P. erythrotis*. Viridis; sincipite, macula pone oculos uropygioque coccineis; alula, pteromatibus remigibusque primariis extus coeruleis, intus fuscis, secundariis extus viridibus, intus fuscis; rectri-

cibus 4 mediis viridibus, externis virentibus, rostro plumbeo apice nigro.  $10\frac{1}{4}$ — $11\frac{1}{2}$ ". *Insula Macquariana.*

5. *P. ulietanus*. Notaeo olivaceo, gastraeo flavo, plumis obscurius limbatis; capite toto fuliginoso; uropygio obscure coccineo; remigibus reatricibusque nigrescenti-fuscis; rostro atro-coeruleo, apice atro. 10". *Tauna, Ulietea.*

*B. Rectricibus gradatis sive subgradatis.*

a) Cauda picta.

6. *P. multicolor*. Splendide viridis; fronte ac gastraeo flavis; vertice brunneo-purpureo; uropygio fasciis tribus subdistinctis, prima dilute, secunda obscure viridi, tertia rubicunda; margine alarum, pteromatibus tectricibusque inferioribus azureis; humeris aurantiis; reatricibus duabus mediis coeruleis, reliquis pallidioribus, basi viridibus, medio nigris; rostro griseo-corneo.  $10\frac{1}{2}$ ". *Nova-Hollandia.*

7. *P. Barnardi*. Viridis; fronte coccinea; fascia occipitis brunnea; torque nuchae interrupto flavo; dorso coerulescenti-nigro; genis, pteromatum ac reatricum apice, humeris, remigum margine reatricumque lateralium basi coeruleis. Habitu praecedentis. *Nova-Hollandia.*

8. *P. pileatus*. Pileo castaneo-purpureo; abdomine crissoque coccineis, capitis lateribus, tectricibus alarum superioribus ac uropygio flavo-viridibus; remigibus, jugulo pectoreque cyaneis; dorso reatricibusque duabus intermediis viridibus, lateralibus cyaneis et albis. Magnitudine *P. Pennantii*. *Nova-Hollandia.*

9. *P. venustus*. Gastraeo et uropygio flavis, plumis nigro-marginatis; crisso rubro; capite cerviceque nigris; genarum macula alba; alarum tectricibus superioribus ac inferioribus azureis; dorso flavo, plumarum medio nigro; reatricibus azureis, lateralibus apice albo-lilacinis; rostro plumbeo-griseo. 11". *Nova-Hollandia.*

10. *P. icterotis*. Capite, collo et gastraeo pallide coccineis, lateribus flavo-viridibus; genis flavis; dorsi plumis alarumque tectricibus superioribus fuscis, virescenti-limbatis; alarum margine, remigum basi reetricibusque coerulescentibus, his apice albis, quatuor intermediis toto, reliquis basi virescentibus; rostro cinereo. 10 1/2". *Nova-Hollandia*.

11. *P. eximius*. Capite, collo, pectore crissoque coccineis; macula genarum candida; gastraeo ac uropygio flavis, hoc in viride vergente; dorsi plumis scapularumque atris, limbo citrino; tectricibus alarum superioribus minoribus aterrimis, marginalibus coeruleo-limbatis; alarum margine cyaneo; reetricibus 3 extimis lilacino-albis, apice albidis; rostro corneo-coerulescente. 13 1/2". *Av. adult. Nova-Hollandia*.

*Av. juv.* Capite colloque pallide et sordide coccineis; occipite virescente.

12. *P. caledonicus*. Fronte coccinea; vertice, nucha ac gastraeo citrinis; macula genarum coerulea; notaeo fusco-nigricante, plumis viridi-marginatis; uropygio viridi-flavido; reetricibus mediis virentibus, lateralibus albo-lilacinis, basi cyaneis; alarum margine ac tectricibus majoribus coeruleis; rostro flavo-albido. 13 3/4". *Av. adult. Nova-Hollandia, Terra van Diemen*.

13. *P. jonquillaceus*. Eleganter jonquillaceus; dorso supremo, pennis scapularibus ac alis supra saturate viridibus; uropygio cyaneo; cauda dilute viridi apice lutea; maxilla rubra. Circiter 14". *Australia*.

14. *P. vulneratus*. Intense viridis, capite, collo ac gastraeo dilutioribus; fascia uropygii cyanea; tectricibus alarum superioribus coccineis; cauda supra viridi, flavo-terminata, subtus nigra; rostro rubro. 14 1/2". *Timor*.



15. *P. zonarius*. Viridis; capite et nucha nigris, hac fascia flava terminata; macula genarum coerulea; ventre medio flavo; remigum pogonio externo, pteromatibus reetricibusque lateralibus cyaneis, harum apice coerulescente; rostro cinereo-flavido. 13". *Nova-Hollandia*.

16. *P. Novae-Guineae*. Brunneo-nigricans, violaceo-reflectens; reetricibus subtus pallide coccineis, apice flavis; rostro nigro. 11". *Nova-Guinea, Amboina*.

17. *P. Pennantii*. Coccineus; macula genarum, alarum margine, tectricibus inferioribus minoribus omnibus, superioribus marginalibus reetricumque lateralium pogonio externo azureis; notaeo atro, plumis sanguineo-marginatis; tectricibus reliquis atris; maxilla corneo-coerulescente, apice albo-flavido. 15 1/2". *Av. adult. Nova-Hollandia*.

*Av. juv.* Gastraeo obscure virescente; notaeo reetricibusque nigro-fuscescentibus, illius plumis viridi-rubro-limbatis; fronte sincipiteque rubris.

18. *P. erythropterus*. Viridis; gastraeo flavescenti-viridi; dorso supremo pennisque scapularibus nigris; tectricibus alarum superioribus coccineis; fascia uropygii cyanea; rostro rubro. Circiter 14". *Mas. Nova-Hollandia*.

? *Foem.* A mare diversa dorso supremo viridi, tectricibus alarum superioribus viridibus, exceptis intermediis rubris.

### β. Cauda obscura.

19. *P. scapulatus*. Viridis; macula prope scapulas splendide virente; fascia cervicis et uropygio cyaneis; capite, collo ac gastraeo coccineis; alarum tectricibus inferioribus ac superioribus, flexura alae remigibusque viridibus; cauda nigra; maxilla rubra; mandibula corneo-fusca; pedibus atris. 16". *Av. adult. Nova-Hollandia*.

*Foem.* Mari similis; capite et collo postico viridibus; jugulo, pectore epigastrioque sordide virentibus; rostro obscuro.

*Av. hornot.* Capitis collique lateribus, pectore et epigastrio olivaceo-virescentibus; vertice, nucha et dorso viridibus; uropygii plumis viridibus, cyaneo-limbatis; abdomine rubro; rectricibus 2 intermediis viridibus.

20. *P. amboinensis.* Alis supra viridibus; notaeo toto, tectricibus alarum inferioribus ac alae margine cyaneis; capite, collo ac gastraeo toto coccineis; cauda subtus ac mandibula nigris; maxilla rubra, apice nigrescente. 15  $\frac{1}{2}$ ". *Nova-Guinea (Amboina?)*.

21. *P. hysginus.* Atro-purpureus; fasciola colli postici infimi, pteromatibus, rectricibus remigumque pogonio externo cyaneis; notaeo toto et rectricibus 2 intermediis viridibus; rostro plumbeo-nigricante. 16  $\frac{1}{4}$ ". Insula maris australis *Eaoowe*.

#### VII. Genus. *Deroptylus*. Pag. 79.

1. *D. accipitrinus.* Viridis; nuchae plumis elongatis ac gastraei purpureis, fasciola cyanea terminatis; jugulo fusco; capite fuscescente, albido-striolato; remigibus rectricibusque nigris, his extus viridibus, versus apicem coerulescentibus; rostro fusco. 12  $\frac{1}{2}$ ". *Cajenna, Gujana, Surinam*.

#### VIII. Genus. *Euphema*. Pag. 80.

1. *E. pulchella.* Lutea, fronte, facie tota, genis, flexura et margine alarum, harum tectricibus superioribus minoribus et mediis turcino-coeruleis; notaeo obscure virente, macula prope scapulas rubicunda; remigibus primariis extus cyaneis; rectricibus binis extimis luteis, intus nigris; rostro atro. 8  $\frac{1}{2}$ ". *Av. adult. Nova-Hollandia*.

*Avis hornot.* Olivaceo-virens, abdomine dilutiori; macula inter

femora pallide testacea; alula cyanea; remigibus primariis extus pallide cyaneis.

*Av. jun.* Facie coerulescente; gastraeo viridi-flavo; abdomine sordide rubicundo; alis sine macula rubicunda.

2. *E. chrysostoma.* Viridis; abdomine, loris ac regione periophthalmica flavis; frontis striola, tectricibus alarum superioribus inferioribusque, alula et rectricibus cyaneis, harum lateralibus flavo-terminatis; rostro griseo.  $8\frac{1}{2}$ ". *Av. adult. Nova-Hollandia, Terra van Diemen.*

*Av. hornot.* Loris viridi-flavidis; frontis fasciola coeruleo-plumbea; abdomine luride flavo; tectricibus alarum superioribus obscure fuscis, virenti-limbatis.

3. *E. undulata.* Notaeo obscure fusco, fasciis brunnescentibus variegato; gastraeo virescente; capite et nucha virescenti-flavis, fuscescenti-fasciolatis; macula genarum azurea; rectricibus viridi-coeruleis, lateralibus cum fascia in medio flavida; rostro fuscescente. 7". *Nova-Hollandia.*

4. *E. discolor.* Viridis; fronte, mento tectricibusque alarum inferioribus coccineis, harum superioribus minoribus purpureis; macula ante oculos flava; vertice cyaneo; gastraeo virescente; jugulo, ventris lateribus crissoque rubro-irroratis; pteromatibus alulaque cyaneis; cauda cuprea et cyanea; rostro fuscescente.  $9\frac{3}{4}$ ". *Nova-Hollandia.*

*Av. jun.* Macula ante oculos flava nulla; gastraeo sine rubedine; tectricibus alarum inferioribus viridi-flavis; vertice nonnihil in coeruleum vergente; rectricibus olivaceis, lateralibus versus basin rubicundis.

IX. Genus. *Trichoglossus*. Pag. 84.*α. Rostro pedibusque rubris sive flavis.*

1. *T. palmarum*. Laete viridis; gastraeo flavescente; remigibus nigro-terminatis; rostro pedibusque rubris. Magnitudo *Sit. virescentis*. Insula *Tanna*.

*Av. juv.* Tectricibus alarum in medio pallide fuscis.

2. *T. pyrrhopterus*. Viridis; tectricibus alarum inferioribus aurantiis; vertice ac regione parotica coeruleis; fronte, gutture ac nuchae torque pallide cinereis; remigibus obscuris; rostro pallido.  $7\frac{1}{2}$ ". Insulae *Sandwichenses*.

3. *T. aurifrons*. Laete viridis; fascia frontis, facie et gastraeo toto aureo-flavis; remigibus azureis apice nigris; rostro flavido-albo.  $7\frac{1}{4}$ ". *Nova-Seelandia*.

*β. Rostro pedibusque obscuris.*

4. *T. pusillus*. Viridis; capistro pallide coccineo; cervice ac dorso supremo olivaceo-cinereis; rectricibus extus viridibus, intus flavidis et prima medietate rubris; rostro nigricante.  $6\frac{1}{3}$ ". *Nova-Hollandia*.

5. *T. australis*. Viridis; vertice nuchaque coerulescentibus; frontis taenia ad oculos ducta auriumque macula pone oculos incipiente coccineis; dorso supremo olivaceo-fuscescente; fascia ad epigastrii latera flava; rectricibus intus prima medietate rubris; rostro nigricante. 8". *Nova-Hollandia*.

*γ. Rostro aurantio.*

6. *T. chlorolepidotus*. Viridis; gula genisque coerulescentibus; nucha, pectore epigastrioque flavis, coccineo-variolosis, plumis viridi-

limbatus; remigibus intus fuscis cum macula in medio aurantio-coccinea; tectricibus alarum inferioribus coccineis; rectricibus supra viridibus, subtus fusciscentibus, *lateralibus intus basi aurantio-coccineis*; rostro aurantio-rubro. 8  $\frac{1}{2}$ " *Nova-Hollandia*.

7. *T. haematodus*. Viridis; facie genisque violaceis; torque nuchae lata, aurea; *ventre intense gramineo*; tibiis flavis; pectore ac epigastrio vitellinis, aurantio-rubro-lavatis, hypochondriis et crisso flavis, viridi-variis; remigibus intus nigris cum macula in medio oblonga flava, in penultimis rubra; tectricibus alarum inferioribus cinnabarino-coccineis; rectricibus supra viridibus, subtus flavidis, intus flavo-limbatis; rostro cerato-rubro. 11". *Av. adult.* Insulae *Moluccenses*.

*Av. jun.* Fascia nuchae flava, in viride vergente; pectore pure flavo; tectricibus alarum inferioribus flavis, rubro-variegatis, remigibus penultimis intus toto nigris.

8. *T. rubritorquis*. Viridis; capite gulaque coeruleis; nuchae torque aurantio-coccineo, plumis azureo-marginatis; pectore tectricibusque alarum inferioribus aurantio-coccineis; abdomine azureo-viridi, infimo flavo; remigibus intus fuscis, macula ad marginem notatis; rectricibus supra viridibus, subtus flavidis, intus basi flavo-marginatis. 9  $\frac{7}{10}$ " *Nova-Hollandia*.

9. *T. multicolor*. Viridis; capite lilacino-coerulescente; fascia occipitis viridi-flava; ventre cyaneo, plumis intermediis et lateralibus cinnabarinis, his viridi- et cyaneo-marginatis; tibiis, jugulo pectoreque coccineo-cinnabarinis, hoc lateribus luteo; hypochondriis viridibus, plumis cum macula in medio flava, rubro-marginata; tectricibus alarum inferioribus coccineis; rectricibus intus flavo-marginatis; rostro cerato-rubro. 12  $\frac{1}{2}$ " *Nova-Hollandia*.

10. *T. cyanogrammus*. Viridis; jugulo pectoreque aurantio-

coccineis, plumis coeruleo-marginatis; ventre lateribusque gramineis; fronte, facie guttureque coeruleis; torque nuchae flavo; tectricibus alarum inferioribus coccineis; alarum margine flavo; remigibus intus in medio cum maculâ oblonga flava, in ultimis rubra; rostro flavicante. 11". *Amboina*.

X. Genus. *Charmosyna*. Pag. 95.

1. *Ch. papuensis*. Coccinea; fascia verticis azurea, altera nuchae abdomineque infimo violaceo-nigris; pectoris lateribus hypochondriisque luteis; tergo uropygioque sanguineis, medio violaceis; notaeo ac reetricibus supra viridibus, lateralibus apice rubicundo-flavis; rostro rubro. 17". *Papua*.

XI. Genus. *Eos*. Pag. 95.

*α. Ptilosi rubra*.

1. *E. indica*. Coccinea; fascia verticis supra aures ad nucham ducta, nucha, dorso, tibiis, hypochondriis ac fascia pectoris coeruleis, crisso lilacino-variegato; pennis scapularibus, remige ultima reetricumque pogonio externo nigris; rostro aurantio. 11". *Av. adult.* Insulae *Moluccenses*.

*Av. jun.* Colli parte inferiore pallide rubro-fusco- et violaceo-variegata; dorso supremo pennisque scapularibus fuscis; reetricum pogonio externo fusco-violaceo.

2. *E. rubra*. Coccineo-cinnabarina; crissi plumis, pennis scapularibus posticis remigibusque ultimis amethystino-violaceis; remigum primariarum pogonio externo nigro; reetricum rhachi alba; rostro aurantio. 11 1/2". *Av. adult.* Insulae *Moluccenses*.

*Av. jun.* Cinnabarina; reetricibus lateralibus extus et apice, tectricibus alarum superioribus majoribus, remigibus secundariis et primariis extus luride virentibus.

3. *E. guebiensis*. Rubra; plumis pilei, colli postici ac lateralis, pectoris laterumque obscure marginatis; alis nigro-bifasciatis; remigum primariarum pogonio externo nigro; dorso rubro- et viridi-nigro-vario; rostro aurantio. Magnitudo *Eois indicae*. Gueby, Bouron, Nova-Guinea.

4. *E. cochinchinensis*. Coccinea; occipite ac nucha maculaque pectoris supra ventrem extensa coeruleis; remigibus supra tectricibusque alarum superioribus majoribus virenti-nigris, his rubro-terminatis; cauda testaceo-rubra; rostro aurantio. Magnitudo *Eois indicae*. Insulae Moluccenses.

5. *E. variegata*. Coccinea; collo inferiori, dorso supremo, pectoris peripheria, abdomine crissoque purpurino-coeruleis; reatricibus viridibus, intus versus basin rubicundis, extus versus apicem coeruleis; remigum pogonio interno flavo; rostro obscuro. 11". *India orientalis*.

β. *Ptilosi viridi*.

6. *E. cervicalis*. Viridis, plumarum rhachi nigra; fronte et macula pectoris arcuata in cervice acuminata rubris; remigibus nigro-viridibus; alis caudaque subtus olivaceo-aureis; rostro albido. 11 1/2". *India orientalis* (?).

7. *E. ornata*. Viridis; vertice ac aurium macula cyaneis; lunula occipitis, genis juguloque sanguineis, hujus plumis viridi-nigro-, lunulae cyaneo-marginatis; macula ad colli latera tectricibusque alarum inferioribus luteis, reatricibus intus prima medietate rubris; rostro aurantio. 9 1/4". *Sumatra, Java*.

XII. Genus. *Coriphilus*. Pag. 101.

1. *C. saphirinus*. Cyaneo-saphirinus; jugulo pectoreque candidis; remigibus coerulescenti-nigris; reatricibus fuscis, his et illis

saphirino-limbatis; rostro sanguineo. 7". *Mas. O-Tahiti* insulaeque adjacentes.

*Foem.* Jugulo cinereo; gula alba.

2. *C. cyaneus.* Obscure coeruleus; cauda remigibusque subtus nigris; rostro pedibusque rubris. Magnitudo praecedentis. *O-Tahiti.*

3. *C. euchlorus.* Viridis; fronte viridi; vertice saphirino; genis juguloque sanguineis; abdomine macula antice sanguinea, postice amethystina; tibiis viridibus intus violaceis; rectricibus margine interno et subtus flavis; rostro rubro. Magnitudo *Cor. Kuhlîi.* *Av. adult.* Insula maris pacifici *Tonga-Tabu.*

*Av. junior.* Abdomine viridi; ventris macula minore.

4. *C. solitarius.* Viridis; pileo toto, tibiis hypochondriisque violaceis; capitis lateribus ac gastraeo coccineis; cervice nigro-coerulescente; cauda subtus flavida; rostro flavescente. 7 1/2". *Insulae societatis* (et *Moluccenses?*).

5. *C. Kuhlîi.* Viridis; fronte verticeque prasinis, occipite violaceo; capitis lateribus, gastraeo ac cauda sanguineis, hujus apice virescente; tibiis et abdomine amethystino-violaceis; hypochondriis uropygio crissoque sulphureo-virescentibus; rostro cerato-rubicundo. 7" 5". Maris pacifici insula *Touhoutitirouha.*

### XIII. Genus. *Domicella.* Pag. 105.

1. *D. atricapilla.* Coccinea; pileo nigro, occipite lilacino; notaeo viridi; tibiis azureis et viridibus; juguli fascia suboculta et remigibus intus prima medietate flavis; cauda rubra, apice obscure lilacina; rostro aurantio. 11 1/4". *Insulae Moluccenses, Nova-Guinea.*

2. *D. Lory.* Coccinea; pileo nigro; occipite coerulescente; alis viridibus; cervice, dorso supremo, pectore medio, ventre, abdomine



crissoque violaceis; rectricibus 2 intermediis coeruleo-virescentibus, reliquis coeruleis, intus flavis; rostro aurantio. 11 1/2". *Nova-Guinea*.

3. *D. punicea*. Coccinea; pectore, ventre, tibiis, crisso ac alarum tectricibus inferioribus minoribus obscure violaceis; rectricibus coccineis apice luride rubicundis; rostro obscure rubro. 11 1/2". *Ambouina, Ceram, Nova-Guinea*.

4. *D. coeruleata*. Coccinea; pennis scapularibus, cauda, remigibus 2 ultimis et abdomine infimo coeruleis; tectricibus alarum superioribus majoribus coccineis, coeruleo-limbatis; remigibus nigricantibus; rostro aurantio. Magnitudo *D. garrulae*. *Borneo*.

5. *D. garrula*. Coccinea; tibiis ac alarum flexura flavis; rectricibus ultima medietate olivaceis; alis toto viridibus; remigum primarum pogonio interno prima medietate rubro, secundarum toto nigro; rostro aurantio. 11 1/2". Insulae *Moluccenses*, praesertim *Java*.

#### XIV. Genus. *Eclectus*. Pag. 109.

1. *E. Linnaei*. Coccineus; palpebrarum peripheria plumosa, fascia colli superioris infimi, altera ventris latissima, abdomine medio et tectricibus alarum inferioribus et harum margine cyaneis; notaeo purpureo; alula coerulea; rectricibus prima medietate coccineis, reliqua parte pallide cinnabarinis; rostro atro. 15". *India orientalis*.

2. *E. grandis*. Similis praecedenti, diversus: collo toto inferiori, pectore, epigastrio ac toto ventre violaceo-lilacinis, rectricum taenia apicali latiuscula crissique plumis luteis, palpebris non coeruleis. *Av. adult.* 14". Insulae *Moluccenses*.

*Av. juv.* Adultae similis; pectore viridi, lilacino-variolo; gastraei parte reliqua rubro- et viridi-varia.

XV. Genus. *Psittacodis*. Pag. 112.α. *Ptilosi nigro-rubra*.

1. *Ps. Paragua*. Coccineus; capite, collo, alis caudaque toto atris, annulo periophthalmico coccineo; rostro cinereo-nigricante. Magnitudo fere *E. grandis*. *Waigiou*.

β. *Ptilosi viridi*.

2. *Ps. magnus*. Viridis; macula in utroque epigastrii latere tectricibusque alarum inferioribus coccineis, harum margine coeruleo, latere inferiore aterrimo; rectricibus cyaneo-variegatis, subtus aterrimis; maxilla rubra; mandibula atra. 15  $\frac{3}{4}$ ". Insulae *Moluccenses*, *Waigiou*, *Nova-Guinea*.

3. *Ps. sumatranus*. Viridis; collo in flavidum, uropygio in coeruleum vergente; remigibus intus nigris; regione ophthalmica nudiuscula, nigricante, rostro dilute incarnato. 12 — 14". *Sumatra*.

4. *Ps. gramineus*. Gramineus; remigum pogonio externo, rectricibus lateralibus, pileo ac capistro coeruleis, hoc lineola atra notato; rostro rubicundo. Magnitudo *Psittaci pulverulenti*. *Amboina*.

γ. *Ptilosi viridi-rubra*.

5. *Ps. Tarabe*. Viridis; capite, collo caudaeque fascia apicali lata coccineis; rostro obscuro. Magnitudo *Psittaci aestivi*. Patria . . .

## ? Genus . . . . . Pag. 115.

1. *Psittacus Fieldii*. Viridis; capite castaneo-rubro; alis infra nigris, supra basi macula parva rubicunda notatis; tectricibus inferioribus alarum coeruleis. *Nova-Hollandia*.

XVI. Genus. *Psittacus*. Pag. 116.a. *Pilei plumis brevissimis, adpressissimis.*

1. *Ps. Erithacus*. Facie nuda alba; ptilosi obscure cana; abdomine lilacino-reflectente; cauda tota coccinea; uropygio canescente; remigibus ardesiaco-nigris; rostro nigro. 14". *Africa occidentalis.*

β. *Pilei plumis latiusculis, laxioribus, nuchae compactis, squamoso-positis.*

2. *Ps. festivus*. Viridis; uropygio coccineo; fasciola frontis ad oculum ducta rubro-fusca; vitta superciliari cyanescente; alula, pteromatibus remigumque pogonio externo cyaneis; rectricibus extus cyaneo-limbatis, intus ex parte versus basin macula rubicunda notatis; rostro nigricante. 15<sup>1</sup>/<sub>4</sub>". *America meridionalis.*

3. *Ps. poecilorhynchus*. Viridis; macula sincipitis flava; alarum flexura coccinea; remigibus nigris, extus cyaneis, mediis extus prima medietate coccineis; rectricibus intus luteis, medio macula rotunda viridi, versus basin altera oblonga coccinea notatis, 4 intermediis sine rubedine; rostro nigricante, maxilla in basi testacea, mandibula circa basin rufescenti-flavida. 13". *America meridionalis.*

4. *Ps. puberulentus*. Viridis; rectricibus medietate ultima flavidis; remigibus 2—9 extus prima medietate viridibus, altera cyaneis, sequentibus 3 basi viridibus, dein rubris, apice cyaneis, intus nigris; maxilla nigra cum macula in basi flavida; mandibula flavo-nigricante. 15<sup>1</sup>/<sub>2</sub>". *America meridionalis.*

5. *Ps. xanthops*. Viridis; fronte, vertice, capitis lateribus ac tibiis ranunculaceis; alarum flexura coccinea; remigibus viridibus, apice cyaneis, mediis basi coccineis; rectricibus viridibus, apice flavidis, intus rubro- et viridi-variis; rostro albo. *America meridionalis.*

6. *Ps. ochrocephalus*. Viridis; fronte turcino-coerulea; facie et

tibiis basi ochraceis; humerorum margine coccineo; remigibus extus viridibus et cyaneis, 10—15 in medio coccineis, prima nigra, limbo externo cyanescente; rectricibus intus basi flavis, macula rubra cum minore viridi connata notatis; rostro atro.  $14\frac{1}{4}$ ". *America meridionalis*.

7. *Ps. amazonicus*. Viridis; macula prope oris angulum mentique lateribus ochraceis; vitta superciliari ac fronte amethystino-coerulescentibus; carpi margine aurantio; remigibus 9—12 extus basi virentibus, dein testaceo-sanguineis, reliqua parte cyaneis; rectricibus lateribus extus flavicantibus, in medio virentibus, intus flavis cum macula in medio pallide coccinea, altera transversali viridi dissecta; rostro corneo-albescente, basi citrino-flavo.  $12'' 8'''$ . *America meridionalis*.

*Full*. Vertice, regione ante et pone oculos flavis; remigibus omnibus extus viridibus, intus nigris; carpi margine flavido; rectricibus virenti-flavis cum macula subbasali pallide sanguinea; maxilla corneo-nigricante; basi flava, apice albida, mandibula albida.

8. *Ps. hypochondriacus*. Viridis; fascia abdominis ranunculacea, in utroque latere macula sanguinea notata; capite brachiique margine luteis; rectricibus virenti-flavis cum macula ante medium rubra; remigibus nigris extus viridibus; rostro citrino, culminis lateribus nigrescente.  $12''$ . *America meridionalis*.

9. *Ps. autumnalis*. Viridis; vitta infra oculos aurea; stria supra hos flavo-rubra, variolosa; loris et fronte coccineis; pileo coerulescente; colli plumis fasciola amethystino-nigra terminatis; remigibus 2—6 extus viridibus, in medio cyaneis, apice nigris, 7—10 extus basi viridibus, dein sanguineis, versus apicem cyaneis; rectricibus prima medietate viridibus, altera virenti-flavis, extimis intus basi rubro-lavatis; rostro luteo.  $14\frac{3}{4}$ ". *America meridionalis*.

*Av. juv.* Colli postici plumis viridibus; genis viridibus, intermixtis plumis flavis; verticis plumis dilutius coerulescentibus.

10. *Ps. brasiliensis.* Viridis; fronte ac capistro coccineis; aurium macula supra genas ducta coerulea; alarum flexura flava; carpi margine rubro; remigibus primis obscuris, sequentibus coeruleis, ultimis viridibus; nucae plumis purpurino-limbatis; rectrice extima extus coerulea, sequente coccinea, reliquis, intermediis 2 exceptis, viridibus, intus coccineis cum fascia in apice flava; rostro incarnato.  $14\frac{3}{4}$ " *America meridionalis.*

11. *Ps. Bouqueti.* Fronte, mento, facie ac regione periophthalmica coeruleis; gutture coccineo; remigibus coeruleis, secundariis prima medietate sanguineis; rectricibus viridibus cum fascia in apice flavida, lateralibus intus versus basin coccineis; rostro obscuro cum macula oblonga aurantia in maxilla.  $14\frac{3}{4}$ " *America meridionalis.*

12. *Ps. erythrurus.* Viridis, plumis basi flavis, nigro-, occipitis coeruleo-marginatis; cauda ac alarum margine interno coccineis, illa fascia flava terminata; sincipite et loris rubro-purpureis; facie gulaque coeruleis.  $14\frac{3}{4}$ " *America meridionalis.*

13. *Ps. Dufresneanus.* Viridis; ventris abdominisque plumis basi vinaceo-rubicundis; fronte, sincipite ac rostro coccineis; macula ante oculos aurea, rubro-variolosa; genis gulaque coeruleis; rectricibus viridibus, flavido-terminatis, in medio macula sanguinea notatis; remigibus extus viridibus, apice cyaneis, mediis tribus extus cum macula coccinea.  $14\frac{3}{4}$ " *America meridionalis.*

*Av. juv.* Fronte aurantio-rubra; alarum speculo in aurantium vergente; maxilla flavo-fusca, versus basin rubicunda; mandibula fusciscente.

14. *Ps. vinaceus.* Viridis, plumis nigro-marginatis, colli postici

elongatis versus apicem nigro-marginatum cano-cyaneis, antici pectorisque vinaceis, margine apicali obscuro; macula ante oculos supra frontis marginem ducta ac rostro coccineis; antibrachii margine aurantio; remigibus primariis extus cyaneis, basi viridibus, 5—8 extus viridibus, 9—11 extus viridibus cum macula in medio coccinea; rectricibus viridibus apice flavidis, 3 extimis cum macula in basi coccinea, limbo interno aureis.  $12\frac{1}{2}$ ". *America meridionalis.*

15. *Ps. havannensis.* Facie et collo inferiore cyanescentibus; colli capitisque plumis reliquis ac notaei viridibus, nigricanti-marginatis, gastraei viridibus coerulescenti-, laterum nigro-marginatis; remigibus 2—9 extus prima medietate viridibus, altera violaceis, 3 sequentibus a basi ad medium rubris; cauda supra viridi, viridi-luteo terminata; rectricibus 4 et 5 intus basi rubris; rostro candicante, apice nigricante.  $15\frac{1}{2}$ ". *America meridionalis.*

16. *Ps. agilis.* Viridis; remigum pogonio externo coeruleo; pteromatibus coccineis; rectricibus duabus intermediis toto viridibus, reliquis intus prima medietate coccineis; rostro cinerascete, versus basin albido. *Piono menstruo* paullo major. *America meridionalis?*

17. *Ps. dominicensis.* Viridis, plumis nigro-marginatis; macula in utroque frontis latere parva coccinea; remigibus primariis extus, secundariis fere toto coeruleis, rectricibus viridibus, intus flavidis, juxta rhacheos basin macula parva rubra notatis; rostro albo.  $11\frac{1}{2}$ ". *America meridionalis.*

*Av. hornot.* Fronte sine rubedine.

18. *Ps. leucocephalus.* Viridis, plumis nigro-marginatis; abdomine lilacino; genarum parte antica, mento gulaque roseo-coccineis; fronte alba; aurium macula cinerea; alula remigumque pogonio externo coeruleis, interno nigro; rectricibus viridibus, versus apicem

cyanescentibus, intus flavis cum macula magna coccinea; rostro albo. 12". *America meridionalis.*

*Av. juv.* Fronte alba; vertice viridi coeruleo; collo antice viridi; mento rubro-variofosco.

19. *Ps. albifrons.* Viridis, plumis nigro-marginatis; frontis margine antice, annulo oculum ambiente, loris alulaeque pennae coccineis; fronte alba; sincipite cyaneo; remigibus 2—4 extus prima medietate viridibus, dein nigro-cyanescentibus, reliquis extus cyaneis; rectricibus quatuor intermediis viridibus, reliquis a basi ad medium coccineis; rostro luteo. 11  $\frac{3}{4}$ ". *America meridionalis.*

20. *Ps. Pretrei.* Viridis, plumis nigro-marginatis; fronte, loris, annulo oculum cingente, brachii margine ac tibiarum parte infima coccineis; remigibus extus viridibus, posterioribus apicem versus cyanescentibus, intus nigris; rectricibus duabus intermediis viridibus, reliquis concoloribus, postica medietate flavidis; rostro coccineo. 14  $\frac{1}{2}$ ". *America meridionalis.*

XVII. Genus. *Pionus.* Pag. 140.

*A. Rostro subparvo, compressiusculo.*

*a. Crisso rubro.*

1. *P. menstraus.* Notae viridi-olivaceo; capite, collo pectoreque coeruleis; gastraeo viridi-coerulescente; crisso coccineo; rectricibus 2 lateralibus extus, sequentibus versus apicem cyaneis, intus prima medietate rubris; remigibus viridibus; rostro nigricante, maxillae macula infra nares rubra. 10  $\frac{3}{4}$ ". *America meridionalis.*

2. *P. Maximiliani.* Olivaceo-viridis; nucae plumis albidis, viridi-limbatis; facie viridi; jugulo pectoreque reflexu coeruleo; remigibus rectricibusque intermediis splendide viridibus, harum lateralibus

extus apice coeruleis, intus crissoque coccineis; rostro flavido, maxilla versus basin obscura. 11". *America meridionalis.*

3. *P. senilis.* Olivaceo-viridis; plumis pectoris epigastriique coeruleo-limbatis; crisso rubro; capite colloque coeruleis; fronte, menti macula rostroque albis; remigibus magna ex parte rectricibusque cyaneis, harum lateralibus intus rubris. 10". *America meridionalis.*

4. *P. purpureus.* Notaeo nigricante; nuca, tergo et gastraeo fuliginoso-coerulescentibus, plumarum margine purpurino; capite violaceo albido-striolato; rectricibus supra remigibusque primariis violaceis, secundariis extus virentibus, illis intus crissoque purpurinis; rostro nigricante, apice maxillae aurantio. 9 $\frac{3}{4}$ ". *America meridionalis.*

*Av. juv.* Notaei plumis fuscis, dilutius limbatis, pilei et genarum cyanescentibus, harum margine albidis.

5. *P. sordidus.* Notaeo viridi; gastraeo fusco; gula coerulea; crisso coccineo; pileo, dorso medio ac uropygio virenti-fuscis; rectricibus viridibus, 2 extimis extus coeruleis; rostro rubro, basi flavo, culmine nigro. Magnitudo *Psit. leucocephali.* *America meridionalis.*

### β. Capite obscuro.

6. *P. melanocephalus.* Viridis; pileo atro; collo supremo laterali ac antico, tibiis, hypochondriis, abdomine crissoque citrinis; reliqua gastraei parte alba, ad latera roseo-induta; macula genarum malachitacea; remigibus extus cyaneis; rostro cinereo. 9 $\frac{1}{4}$ ". *America meridionalis.*

*Av. juv.* Plumis pilei fuliginosi, colli ochracei ac abdominis virenti-, pectoris ventrisque isabellino-limbatis; rostro flavido, culmine fusco.

*Av. hornot.* Capite et collo supra isabellinis; loris, capitis colli-



que lateribus, gula et crisso ochraceis; pectore, epigastrio ventreque albis; tibiis, dorso, alis et cauda viridibus; rostro albo.

7. *P. Caica*. Viridis; capite toto guttureque nigris; nucha ochraceo-aurantia; pectore et collo antico infimo olivaceis; rectricum apice alulaque cyaneis; remigibus coeruleo-nigris, viridi-limbatis; rostro rubicundo. Magnitudo praecedentis. *America meridionalis*.

*Av. junior*. Collo postico viridi; capite viridi-nigricante.

8. *P. Barrabandi*. Viridis; capite atro; macula genarum ovata, tibiis, alarum flexura et tectricibus superioribus minoribus aurantiis, harum inferioribus sanguineis; jugulo pectoreque flavido-olivaceis; remigibus nigris, subtus malachitaceis; rostro nigricante. 10". *America meridionalis*.

9. *P. vulturinus*. Viridis; capite nudo, nigro, in fronte pallido, subcrinito, nucha nigra, luteo-fasciata; pectore supremo olivaceo; suffragine, alarum margine tectricibusque inferioribus coccineis; rostro flavo, culmine et apice nigro. 9 $\frac{1}{4}$ ". *America meridionalis*.

10. *P. fuscicapillus*. Viridis, subtus flavidus; capite ac humerorum macula parva castaneis; remigibus primariis extus coerulescentibus; tectricibus alarum inferioribus minoribus supremis cyaneis; rectricibus intus et subtus flavis. 8 $\frac{1}{4}$ ". *Java*.

$\gamma$ : Cauda fasciata.

11. *P. guineensis*. Viridis; capite, collo caudaeque fascia apicali coccineis; fascia gulae infra oculos ducta alba, altera superciliarum flava; gastraeo et cauda cinerascens; pectore flavo; rostro nigro. 10". Patria *Africa*?

*B. Rostro magno, paratones convexo.*

*a. Regione ophthalmica nudiuscula.*

12. *P. senegalus*. Viridis; gastraeo aurantio; pectore prasino;

capite colloque cinereis; rostro remigibusque nigricantibus.  $9\frac{1}{2}$ ".  
*Senegambia.*

13. *P. Meyeri.* Cinereo-virescens; capite colloque murino-grisels; humeris tectricibusque alarum inferioribus ranunculaceis, harum superioribus, uropygio ac gastraeo coeruleo-viridibus; rostro nigricante.  $8\frac{1}{2}$ ". *Nubia.*

14. *P. brachyurus.* Viridis; lineola pilosa in loris; rectricibus quatuor extimis intus prima medietate et brachio margine postico vinaceis; remigibus intus nigris, subtus malachitaceis; rostro flavo, apice fusco.  $8\frac{1}{4}$ ". *America meridionalis.*

*Av. juv.* Brachii margine viridi; rostro fusciscente.

*β. Regione ophthalmica plumosa.*

15. *P. Le Vaillantii.* Capite et collo griseo-flavidis; alarum margine, tibiis intus et infra aurantio-cinnabarinis; uropygio ac gastraeo nitide viridibus; notaei parte reliqua nigricante, plumis obscure viridi-marginatis; rostro albido.  $12\frac{3}{4}$ ". *Africa meridionalis.*

XVIII. Genus. - *Psittacula.* Pag. 153.

*α. Rectricibus lanceolato-acuminatis.*

1. *Ps. pileata.* Viridis; pileo, loris ac oculorum margine inferiore coccineis; macula aurium purpurascens; alarum margine, alula, remigum secundariorum pogonio externo rectricibusque lateralibus fere totis cyaneis; rostro albicante, basi plumbea. 8". *Mas. America meridionalis.*

*Foem. et juv.* Capite sine rubore, fronte cyanescente.

*Mas junior.* Pileo viridi, rubro-vario.

2. *Ps. passerina.* Viridis; uropygio, tectricibus alarum inferioribus

ribus, superioribus majoribus remigibusque secundariis coccineis; rostro corneo-rufescente. 5". *Mas. America meridionalis.*

*Foem.* Ptilosi sine colore coeruleo; uropygio alarumque tectricibus inferioribus thalassinis.

*Mas junior.* Foeminae similis; remigibus secundariis ac tectricibus alarum majoribus cyaneis, harum inferioribus thalassinis, plus minusve cyaneo-variis.

*Av. hornot.* Foeminae similis, ptilosi pallidiore; fronte, capitis lateribus ac jugulo sordide flavidis.

β. Rectricibus apice subtrigonis.

3. *Ps. purpurata.* Viridis; carpi margine, alulae apice uropygioque cyaneis; capite nuchaque fusco-cinerascentibus; tectricibus alarum, pennis scapularibus remigibusque nigricantibus, his viridilimbatis; rectricibus purpureis, taeniola in apice nigro viridi terminata, 4 intermediis viridibus cum fasciola in apice nigra; rostro flavido. 6 1/2". *America meridionalis.*

4. *Ps. Hueti.* Viridis; fronte atra; macula genarum et tectricibus alarum superioribus majoribus cyaneis; harum flexura coccinea; rectricibus purpuratis, fascia nigra viridi terminata; rostro flavo. 6 1/2". *America meridionalis.*

5. *Ps. melanoptera.* Notaeo nigro; gastraeo flavido; regione parotica collique lateribus viridibus; jugulo pectoreque virenti-canis; nuchae plumis flavidis, nigro-cinctis; tectricibus alarum majoribus flavis, amethystino-terminatis, inferioribus cyaneis; carpo rubro; rectricibus lilacinis, lateralibus intus cum fasciola in apice atra; rostro flavido. 6 1/2". *America meridionalis.*

6. *Ps. melanota.* Viridis; dorso pennisque scapularibus fuligi-

nosis; brachii margine supremo atro; hypochondriis canescentibus; reatricibus rubro-lilacinis, fasciola apicali nigra, viridi-terminata; rostro albido.  $6\frac{3}{4}$ ". *America meridionalis*.

γ. Rectricibus apice recto-truncatis.

7. *Ps. surda*. Viridis; pennis scapularibus fuliginoso-olivaceis; alula nigra; capistro flavido; reatricibus ochraceis, linea in apice et strictiore ad marginem externum nigra notatis, 2 intermediis viridibus cum fascia in apice nigra; rostro plumbeo, culmine albido. 7". *America meridionalis*.

*Av. junior*. Rectricibus 2 intermediis toto viridibus, reliquis fulvo-viridibus, margine externo nigricantibus.

δ. Rectricibus apice obtusis.

8. *Ps. Swindereniana*. Viridis; nuchae fasciola nigra; uropygio caudaeque tectricibus superioribus azureis; reatricibus prima medietate cinnabarinis, dein viridibus, fasciola antecedente obliqua nigra, 2 intermediis viridibus; pectore colloque viridi-ochraceis; rostro nigro.  $6\frac{1}{2}$ ". *Africa?*

9. *Ps. pullaria*. Viridis; facie rosea; uropygio cyaneo; tectricibus alarum inferioribus nigris; reatricibus 4 intermediis viridibus, reliquis basi flavidis, dein rubris, cum fasciola ante apicem virentem nigra; rostro roseo. 5" 10". *Mas. India orientalis*.

*Av. juv. (Foem?)* Mari similis, tectricibus alarum inferioribus viridibus, capistro solum roseo.

10. *Ps. roseicollis*. Similis praecedenti, sed facie ac superciliarum regione rubris, genis, gula ac collo antico dilute roseis, tectricibus alarum inferioribus coeruleo-viridibus, reatricum apice coeruleo-virescente, rostro incarnato diversa. 6". *Africa meridionalis*.

11. *Ps. batavensis*. Viridis; frontis lateribus, loris, genis mentoque cinnabarinis; pileo tectricibusque alarum inferioribus coeruleis; remigibus intus nigris; maxilla rubra, apice flavida; mandibula rubicundo-fusca. 11  $\frac{3}{4}$ ". *Av. adult.* Java, Nova-Hollandia australis.

*Av. juv.* Tota viridis, exceptis tectricibus alarum inferioribus coeruleis; rostro in fuscum vergente.

*Av. junior.* Genis rubro-variolosis.

12. *Ps. Tovi*. Viridis; gastraeo flavido; macula menti aurantia; taenia in alis transversa castaneo-aurea; tectricibus alarum inferioribus luteis; reatricibus viridibus intus flavidis; rostro dilute griseo. 6" 9". Habitat . . . . .

13. *Ps. cana*. Viridis; capite, collo pectoreque canis, nitore violaceo; tectricibus alarum inferioribus atris; reatricibus fascia ante apicem nigra notatis; rostro cano. 5  $\frac{3}{4}$ ". *Mas. Africa.*

*Foem.* Capite colloque viridibus.

*Av. hornot.* Foeminae similis, ptilosi pallidiore.

14. *Ps. Galgulus*. Viridis; vertice in medio coeruleo; cervicis fascia aurantia; tergo flavo; uropygio jugulique macula coccineis; cauda subtus coerulescente, rostro atro. 4  $\frac{1}{4}$ ". *Mas. Java, Timor, Sumatra.*

*Foem.* Viridis; vertice cyaneo; uropygio coccineo; rostro rubicundo.

*Mas junior.* Viridis; uropygio coccineo; juguli macula fulva; rostro rubicundo, maxillae apice nigricante.

*Av. juv.* Viridis, gastraeo flavo; uropygio coccineo; rostro rubicundo.

*Av. hornot.* Pallide viridis; uropygii plumis pallide coccineis, basi viridibus; rostro pallide rubicundo.

15. *Ps. Culacissi.* Viridis; fronte, jugulo ac uropygio coccineis; fascia nuchae aurantio-rubra; remigibus intus, rectricibus subtus berryllinis; rostro rubro. Fere 5". *Mas. Insulae Philippenses.*

*Foem.* Fronte ac uropygio coccineis; nucha absque fascia.

16. *Ps. minor.* Viridis; pileo rubro; jugulo coeruleo; uropygio purpureo-rubro; rostro nigro. 5". *Mas. Luçon.*

*Foem.* Capite supra coerulescenti-viridi.

17. *Ps. Desmarestii.* Fusco-viridis; gastraeo flavo-virente; fronte coccinea; pileo occipiteque flavo-aurantiis; fascia juguli infra ferrugineo-marginata; macula infra oculos alarumque flexura cyaneis; rostro nigro. 3½". *Nova-Guinea.*

18. *Ps. malaccensis.* Notaeo obscure viridi; gastraeo viridi; fronte, vertice et uropygio coeruleis; epigastrii lateribus et tectricibus alarum inferioribus coccineis, harum superioribus viridibus, flavido-marginatis; maxilla aurantio-rubra; mandibula grisea. 5" 9". *Malacca.*

19. *Ps. torquata.* Viridis, subtus dilutior; fascia colli postici flavida, plumis nigro-marginatis. Magnitudo *Ps. passerinae.* *Mas. Luçon.*

*Foemina.* Plumis fasciae colli coeruleis, nigro-marginatis.

#### XIX. Genus. *Nasiterna.* Pag. 169.

1. *N. pygmaea.* Notaeo intense viridi, gastraeo viridi; rectricibus subtus nigris in apice pogonii externi macula viridi-flava notatis; harum rhachi apice in cirrum brevem, subtilem excurrente; rostro obscure incarnato. 3" 2". *Mas. Nova-Guinea.*

*Foem.* Mari similis, ptilosi rostroque pallidioribus, hoc versus basin obscuro.

XX. *Genus. Triclaria.* Pag. 170.

1. *T. cyanogastra.* Herbaceo-viridis; macula abdominis cyanea; remigibus reatricibusque subtus malachitaceis; rectrice extrema pogonio externo versus basin, reliquis apice coeruleis; rostro albo. *Mas.*  $11\frac{1}{4}$ ". *America meridionalis.*

*Foem. et Av. juv.* Macula abdominis cyanea nulla.

XXI. *Genus. Sittace.* Pag. 171.

1. *S. Tuipara.* Viridis; frontis fasciola, macula menti pusilla alulaque isabellino-rubris; pileo coerulescente; remigibus juxta rhachin cyaneis; rostro albo  $7\frac{1}{4}$ ". *America meridionalis.*

*Av. juv.* Alula viridi sive isabellino-varia; macula menti sordide aurantia; frontis fasciola strictissima, fusciscente.

2. *S. Tui.* Viridis, fronte et sincipite luteis; remigibus pogonio externo viridibus, interno nigris, latere inferiore malachitaceis; cauda subtus flavido-virente, rostro corneo. 7". *America meridionalis.*

3. *S. xanthoptera.* Viridis, remigibus omnibus intense viridibus; pteromatibus luteis; alulae apice cyaneo; rostro incarnato-fusciscente.  $8\frac{1}{4}$ ". *America meridionalis.*

4. *S. virescens.* Viridis; pteromatibus citrinis, basi albis; remigibus secundariis albis, margine apicali nigricanti-virentibus, extus subtiliter flavo-marginatis, penultimis extus flavis, intus albis, in medio virentibus; rostro albido.  $8\frac{1}{2}$ ". *America meridionalis.*

5. *S. Tirica.* Dilute viridis, exclusis remigibus primariis intus nigris, extus juxta rhachin cyaneis, margine virentibus, secundariis

extus ejusdem coloris, intus subcyaneis, apice viridibus; pteromatibus coeruleis; rostro incarnato-fuscescente.  $9\frac{1}{4}$ ". *America meridionalis.*

6. *S. euops*. Laete viridis; alarum margine ac harum tectricibus inferioribus coccineis; rostro incarnato-albido. *S. Tirica* aliquanto major. *America.*

7. *S. murina*. Viridis; fronte, vertice, loris genarum collique parte anteriore, pectore epigastrioque diluto griseis; remigibus alulaque cyaneis; rostro albido-corneo.  $10\frac{1}{2}$ ". *America meridionalis.*

*Av. juv.* Pileo viridi, genis ac collo supremo plus minusve griseis, hujus plumis albido-marginatis.

? *S. canicollis*. Simillima *S. murinae*, diversa (ut videtur) loris, genis, regione parotica, mento ac toto collo antico coerulescenti-cinereis, fronte verticeque virenti-coeruleis, rectricum apice coerulescente, rostro intense cinereo.

8. *S. leucotis*. Viridis; aurium macula albida; frontis margine, loris, macula buccarum, uropygii abdominisque purpurinis; plumis colli antichi infimi lateralis pectorisque malachitaceis, fasciola nigricante, in apice albida terminatis; humeris coccineis; cauda cuprea, basi viridi; rostro fusco.  $8\frac{1}{2}$ ". *America meridionalis.*

*Av. juv.* Humeris viridibus, rubro-variis; aurium macula strictiore.

9. *S. vittata*. Viridis; plumis juguli, pectoris epigastriique ex cinereo olivaceo-flavidis, fasciola flavida, antice nigricanti-marginata terminatis; aurium plumis discretis, brunneo-albidis; fasciola frontis, ventris macula, tergo ac uropygio purpurascens; rectricibus sanguineo-cupreis, supra pogonio externo viridibus. 10". *Mas. America meridionalis.*

*Foem.* Tergo obsolete purpurino; ventris macula purpurea pallida; jugulo pectoreque magis ad olivaceum inclinantibus.



10. *S. lepida*. Viridis; capite ac collo postico fuscis; macula genarum viridi; aurium regione grisea; cervicis fasciola ac crisso coerulescentibus; juguli pectorisque plumis malachitaceis, fasciola al-bida, antèrius obscurius limbata, terminatis; abdomine coccineo-irro-rato; alarum margine ac harum tectricibus inferioribus sanguineis; reetricibus castaneo-purpureis; remigibus cyaneis; rostro fuscescente.  $9\frac{1}{2}$ ". *America meridionalis*.

11. *S. chlorogenys*. Similis praecedenti, diversa: frontis fasciola stricta obsolete brunnea, plumis capitis reliquis ac totius nuchae mu-rino-fuscescentibus, rhachi et apice albido-griseis, menti ac totius juguli pallide griseis; remigibus secundariis alulaque malachitaceis.  $7\frac{3}{4}$ ". *America meridionalis*.

12. *S. Chiripepé*. Intense viridis; frontis fasciola stricta brunnea, jugulo, regione parotica abdomineque carmelitino-fuscis; macula pec-toris infimi alteraque ventris rubra; cauda rubro-flavida; alis extus coeruleis; rostro nigricante.  $9\frac{3}{4}$ ". *America meridionalis*.

13. *S. melanura*. Viridis; frontis fasciola brunnea; reetricibus purpurino-nigricantibus; pteromatibus internis aurantiis, basi rubris, externis sanguineis, apice aureis; jugulo pectoreque virentibus, plumis apice albido-limbatis; rostro obscuro.  $9\frac{3}{4}$ ". *America meridionalis*.

*Av. jun.* Pteromatibus internis aureo-flavis, basi subrubris, ex-ternis viridibus.

14. *S. Nenday*. Viridi-flavida; capite nigro; vertice in rubrum vergente; jugulo coerulescente; suffragine coccinea; cauda viridi-fla-vida, versus apicem coerulea, subtus nigra; rostro nigro.  $13\frac{1}{2}$ ". *America meridionalis*.

15. *S. leptorhyncha*. Viridis; fronte, striga per oculos cauda-que rufis; capite nigro, abdomine imo rufo-variegatis; maxilla elon-gata gracillima. Statura *Sitt. cruentatae*. *America*.

16. *S. Anaca*. Viridis; macula buccali vittaque oculari castaneo-rubicundis; pileo, collo pectoreque fuscis, plumis juguli pectorisque limbo rufescenti-albido cinctis; macula aurium albida; fronte coerulescente; cervicis fasciola cyanescente; humeris sanguineis; tergo uropygioque purpureis; cauda cuprea; rostro obscuro.  $9\frac{1}{4}$ ". *America meridionalis*.

17. *S. cruentata*. Viridis; vitta genarum supra aures ducta, tergi ventrisque macula maxima purpurinis; jugulo nucaeque fasciola coerulescentibus; macula ad gulae latera virente, altera pone aures aurantia; pileo nigro, aurantio-vario; cauda subtus cuprea; humeris coccineis; rostro fusco.  $10\frac{1}{2}$ ". *Av. adult. America meridionalis*.

*Av. juv.* Humeris non aut parum rubris; macula pone oculos rufescente; pilei plumis stricte aut obsolete aurantio-limbatis.

18. *S. aurea*. Viridis; gastraeo virenti-flavido; jugulo pectoreque luride virentibus; fronte maculaque oculos ambiente aurantio-isabellinis; loris verticeque coerulescentibus; rostro nigricante.  $10\frac{1}{4}$ ". *America meridionalis*.

19. *S. Petzii*. Similis magnitudine et colore praecedenti, diversa: maxilla flavido-alba, mandibula obscura, regione periophthalmica nuda. *America meridionalis*.

20. *S. cactorum*. Viridis; ventre et abdomine aurantiis; genarum parte antica, collo antico et pectore cinereo-flavidis; rostro albedo.  $9\frac{3}{4}$ ". *America meridionalis*.

21. *S. pertinax*. Viridis; fronte, capistro genisque ochraceo-aurantiis; sincipite coerulescente; jugulo ex griseo virenti-flavido; ventre abdomineque aurantio-variis; cauda viridi, subtus flavida; rostro obscure cinereo.  $9\frac{1}{2}$ ". *America meridionalis*.

22. *S. Jendaya*. Viridis; capite, collo pectoreque luteis, plus minusve rubro-irroratis; tectricibus alarum inferioribus minoribus,

tergi macula et abdomine rubris; alula remigibusque violaceis; cauda supra ex flavo olivaceo-viridi, apice cyanea; rostro nigro; 12". *Mas* et *Foem. adult. America meridionalis.*

*Av. junior.* Occipite, genis, collo et pectore viridibus; fronte, vitta superciliari subconspicua ac loris coccineis; pileo aurantio-flavo; regione parotica flavida; abdomine ac uropygio pallide coccineis.

*Av. hornot.* Similis avi juniore; uropygio viridi; regione parotica vix flavida.

23. *S. solstitialis.* Lutea, undique aurantio-rubro-nubilata; tectricibus alarum superioribus majoribus viridibus; remigibus cyaneis, extus virenti-marginatis, subtus nigris; cauda prima medietate virente, altera cyanea; rostro nigro. 11". *Mas. America meridionalis.*

*Foem.* Mari similis; caudae tectricibus superioribus ac inferioribus virentibus, alarum superioribus viridi-variis, majoribus viridibus, limbo apicali stricto flavo.

24. *S. ludoviciana.* Laete virens; gastraeo virenti-flavido; capite et collo antico sulphureis; fronte, genarum macula, alarum flexura ac suffragine aurantio-rubris; remigibus intus nigris, primariis versus apicem coerulescentibus; rostro albo. 13". *Mas. America septentrionalis.*

*Foem.* Mari similis, nuchae flavedine minus extensa, alarum margine aurantio strictiore.

*Av. hornot.* Collo capiteque viridibus, fronte genisque aurantiis.

25. *S. lutea.* Lutea; rectricum lutearum rhachi alba; remigibus gramineis, rhachi nigra, subtus virenti-aureis; rostro valido, flavido-albido. 14½". *America meridionalis.*

*Av. juv.* Avi adultae similis; rectricibus plus minusve viridibus,

rhachi nigra; pennis scapularibus, dorsalibus, nec non alarum tectricibus in medio viridibus; genis viridi-variis.

26. *S. flaviventris*. Obscure viridis; fronte, humerorum macula, tectricibus alarum superioribus minoribus, flexura margineque rubris; ventre flavo; remigibus dimidio violaceis, rostro basi sinuato. 6". *America meridionalis*.

27. *S. patagonica*. Flavo-viridis; capite et collo supra fuliginoso-virescentibus; collo antico pectoreque virenti-cinereis; fascia juguli albida; hypochondriis ac uropygio citrinis; epigastrio rubro; tectricibus alarum majoribus remigibusque coeruleis; rostro plumbeo. 17 1/4". *America australis*.

28. *S. gujanensis*. Viridis; margine alarum et harum tectricibus inferioribus lateralibus coccineis, majoribus citrino-flavis; rostro flavido-albo. 15". *America meridionalis*.

29. *S. nobilis*. Viridis; fronte et vitta superciliari coeruleis; alarum flexura, carpi margine ac tectricibus alarum inferioribus minoribus externis coccineis, harum majoribus caudaeque latere inferiori virenti-aureis; maxilla alba, mandibula corneo-nigra. 14 1/4". *America meridionalis*.

*Av. juv.* Fronte vix coerulea (superciliis viridibus); tectricibus alarum inferioribus viridibus, minoribus plus minusve rubro-variolis.

30. *S. acuticaudata*. Virescens; fronte coerulescente; rectricibus viridibus pogonio interno, supra et subtus, vinaceo-cupreis; remigibus (non coeruleo-tinctis) olivaceo-aureis; rostro albido. 14". *America meridionalis*.

31. *S. Illigeri*. Sordide viridis; pileo coerulescente; frontis et tergi macula abdomineque inter femora rubris; cauda supra castaneo-rubra, viridi- et coeruleo-varia, subtus virenti-aurea; alula remigi-

busque juxta rhachin coeruleis; rostro nigro. 15 $\frac{3}{4}$ ". *America meridionalis*.

*Av. juv.* Ptiloseos rubedine pallidior.

32. *S. Macavuanna*. Olivaceo-viridis, glauco-reflectens; notaeo herbaceo; regione inter femora luride coccinea; tectricibus alarum inferioribus, alis et cauda subtus aureis, remigibus extus coerulescentibus; rostro parvo, aterrimo; facie nuda. 16 $\frac{3}{4}$ ". *America meridionalis*.

33. *S. severa*. Sordide viridis; frontis margine anteriore castaneo-purpurino; vitta genarum fusca; margine flexurae alarum et harum tectricibus inferioribus lateralibus coccineis; remigibus coerulescentibus ac cauda subtus purpurinis; capitis lateribus nudis, plumosostriatis; rostro obscuro. 18". *America meridionalis*.

*Av. juv.* Ptilosis sine rubedine; frontis margine castaneo, stricto; cauda supra viridi-rubente.

34. *S. pachyrhyncha*. Laete viridis; frontis taenia versus lora ducta utrinque cum altera superciliari recta confluenta, humerorum margine tibiisque coccineis; macula in loris parva fuliginosa; facie tota plumosa; rostro nigro. 17". *America meridionalis*.

35. *S. militaris*. Luride viridis; nucha prasina; fronte coccinea; fascia menti brunneo-viridi; alula remigibusque turcino-coeruleis, his subtus aureo-virentibus; cauda cupreo-rubra et coerulea, subtus virenti-aurea; capitis lateribus nudis, strigoso-plumulosis; rostro obscuro. 2' 4 $\frac{1}{2}$ ". *America meridionalis*.

36. *S. tricolor*. Rufo-rubra; nucha ochraceo-straminea, crisso, uropygio et tectricibus alarum superioribus magnis turcino-coeruleis, alis caudaque subtus cupreis; rectricibus 2 mediis maxima ex parte coeruleis; capitis lateribus nudis; rostro nigro. 20". *America merid.*

37. *S. Macao*. Coccinea; dorsi plumis viridi-limbatis; alarum tectricibus superioribus mediis toto olivaceo-viridibus, majoribus et uropygio turcino-coeruleis; capitis lateribus nudis, striolato-plumosis; mandibula nigra; maxilla alba cum macula nigra. 3' 2". *America meridionalis*.

38. *S. Aracanga*. Simillima praecedenti, diversa: tectricibus alarum superioribus mediis luteis, coeruleo-terminatis; capitis lateribus toto nudis. 36—39". *America meridionalis*.

39. *S. Ararauna*. Notaeo splendide cyaneo; gastraeo luteo; fascia menti nigra; capitis lateribus nudis, vittato-plumosis; rostro nigro. 3' 3". *America meridionalis*.

40. *S. Canindé*. Similis praecedenti, diversa: statura minore, fascia menti lata, coerulea, capitis lateribus nudis, incarnatis. 2' 2". *America meridionalis*.

41. *S. Spixii*. Glauca; cauda alisque subtus fuliginosis; rostro nigro, maxillae culmine ac mandibulae apice albis; capistro nudo. 18½". *America meridionalis*.

42. *S. glauca*. Halichlora, unicolor; rostro, alarum caudaeque latere inferiori nigris; capitis lateribus plumosis. 28½". *America meridionalis*.

43. *S. hyazinthina*. Intense hyazinthina, unicolor; alis caudaeque subtus nigris; rostro edentulo nigro; capitis lateribus plumosis. 3' 2½". *America meridionalis*.

## XXII. Genus. *Tanygnathus*. Pag. 215.

1. *T. macrorhynchus*. Viridis; uropygio turcino-coerulescente; cauda subtus flavida; alis virenti-coerulescentibus; tectricibus alarum superioribus nigris et aureo- et aurantio-marginatis; rostro coccineo. 15". *Nova-Guinea* (et insulae *Moluccenses?*).

2. *T. marginatus*. Viridis, subtus viridi-flavidus; fascia verticis inter oculos ad occiput extensa, uropygio ac alarum tectricibus superioribus coeruleis, harum limbo aureo; remigibus ultimis flavo-marginatis; rostro coccineo, apice albido. 12  $\frac{1}{2}$ ". *Av. adult.* Insulae *Moluccenses*.

*Av. jun.* Capite supra uropygioque coeruleis, viridi-mixtis; tectricibus alarum superioribus viridi-coeruleis; dilute rufo-marginatis.

XXIII. Genus. *Coracopsis*. Pag. 217.

1. *C. mascarina*. Brunnea, griseo-reflectens; capite colloque coerulescenti-canis; capistro gulaque atris; rectricibus lateralibus basi albis; rostro rubro. 13  $\frac{1}{2}$ ". *Madagascar*.

2. *C. nigra*. Fuliginoso-nigricans; rectricum rhachi fusca, subtus alba; cauda subtus albo-reflectente; rostro incarnato. 21". *Africa meridionalis, Madagascar*.

XXIV. Genus. *Dasyptilus*. Pag. 219.

1. *D. Pecquetii*. Nitide niger; capite nudo, raro piloso; ventre, crisso, tectricibus alarum superioribus remigumque secundariorum pogonio externo coccineis; jugulo pectoreque fulvo-rufo squamoso-fasciatis; rostro nigrescente. 20—21". *America australis (?)*.

XXV. Genus. *Microglossus*. Pag. 220.

1. *M. aterrimus*. Aterrimus, unicolor; capitis lateribus large nudis, incarnato-rubris; rostro aterrimo. Insulae *Papuanae, Waigiou, Nova-Guinea*.

XXVI. Genus. *Calyptorhynchus*. Pag. 221.

1. *C. Leachii*. Aterrimus, immaculatus; rectricibus quinque lateralibus basi et apice nigris, reliqua parte immaculate coccineis; rostro atro. 2'—2' 3". *Nova-Hollandia*.

*Av. jun.* Ptilosi nonnihil in colorem cinereo-fuscescentem vergente; rostro pallidiori.

2. *C. Temminckii.* Niger; capite, collo ac gastraeo terreo-fuscis; regione ophthalmica ac parotica, fronte genisque plus minusve flavido-tinctis; rectricibus quinque lateralibus apice et basi nigris, reliqua parte coccineis cum fasciis quinque nigris undulatis; rostro pallide corneo. 1' 8—9". *Nova-Hollandia.*

*Avis junior.* Capite et collo plus minusve olivaceo-fuscescentibus; regione parotica, ophthalmica, mento fronteque plus minusve flavis.

3. *C. stellatus.* Niger; capitis plumis lateralibus ac tectricibus alarum superioribus minoribus puncto ante apicem flavo notatis; crissi plumis prima medietate alternatim flavo-nigroque fasciatis; rectricibus quinque lateralibus basi et apice nigris, reliqua parte coccineis et nigro-fasciolatis, limbo interno flavo; rostro albido. 1' 6". *Nova-Hollandia.*

4. *C. Banksii.* Aterrimus; plumis frontis, totius capitis lateralis ac cristae ante apicem macula cordiformi flava, tectricibus alarum superioribus minoribus macula subtrigona albida notatis; rectricibus quinque lateralibus in medio plus minusve rubro-fasciatis et undulatis, sine flavedine, rostro albo-flavido. 26—27". *Nova-Hollandia.*

5. *C. funereus.* Niger; gastraeo fuliginoso, plumis flavido-limbatis; macula aurium sulphurea; rectricibus lateralibus magna ex parte pallide sulphureis, lineolis irregularibus punctisque innumerabilibus obscuris variolosis; rostro flavido-albo. 2' 4". *Nova-Hollandia.*

*Av. juv.* Ptilosi fuliginosa ut in ave adulta, flavo-variegata.

## XXVII. Genus. *Corydon.* Pag. 227.

1. *C. galeatus.* Capite coccineo; notaeo cineraceo, in viride



vergente; plumis albido-limbatis; gastraeo dilutiori, fasciis rubicundis ac viridulis variegato; remigibus fasciolatis; rostro flavido. 14  $\frac{1}{4}$ ". *Nova-Hollandia.*

*Av. juv.* Capite ejusque crista ardesiacis; frontis margine luride rubicundo; genis ac notaeo nigricantibus fasciis cinerascentibus, utrinque albido-sive virenti-marginatis, variis; gastraeo cinerascente, fasciolato; abdomine rubro-variolofo; cauda cinereo-nigricante, fasciis numerosis undulata; remigibus intus albido-maculatis.

XXVIII. *Genus. Cacatua.* Pag. 229.

1. *C. roseicapilla.* Verticis crista parva, capite, collo ac gastraeo roseis; crisso, notaeo ac cauda cineraceis; rostro flavido. 12". *Nova-Hollandia.*

2. *C. Philippinarum.* Cretacea; verticis crista depressa et crisso roseis; plumis cristae superincumbentibus basi, remigibus rectricibusque intus sulphureis; regione parotica roseo-lavata; rostro albo, basi cinerascente. 13  $\frac{1}{2}$ ". Insulae *Philippinae.*

3. *C. Leadbeateri.* Alba; genis, collo antico, pectore, tectricibus alarum inferioribus abdomineque medio roseo-tinctis; plumis cristae elongatae occipitalis basi roseis, apice albis, macula flava in medio notatis; pogonio remigum rectricumque interno roseo, illarum saturatiori. Statura *C. sulphureae.* *Nova-Hollandia.*

4. *C. moluccensis.* Cretaceo-alba; crista frontis magna cinbarino-rubra, plumis superincumbentibus cretaceo-albis; remigibus rectricibusque intus flavidis; rostro nigro. 20  $\frac{3}{4}$ ". Insulae *Moluccenses.*

5. *C. cristata.* Capitis crista lata, depressa ac reliqua ptilosi cretaceo-albis, exceptis remigibus rectricibusque intus flavidis; rostro nigro. 18". Insulae *Moluccenses.*

6. *C. galerita*. Cretaceo-alba; verticis crista exserta, elongata, stricta, sulphurea; remigibus rectricibusque intus flavidis; rostro nigricante. 20  $\frac{1}{4}$ ". *Nova-Hollandia, Nova-Guinea*.

7. *C. sulphurea*. Cretaceo-alba; crista capitis exserta elongata sulphurea, supra frontem brevi, cretaceo-alba, basi flava; regione parotica ochracea; plumis trunci basi, remigibus rectricibusque intus flavis; rostro nigricante. 14  $\frac{1}{2}$ ". *Insulae Moluccenses, Nova-Guinea*.

XXIX. Genus. *Lycmetis*. Pag. 233.

1. *L. tenuirostris*. Cretaceo-alba; basi cristae frontalis parvae, ovatae, capitisque lateribus rosaceis; loris dilute aurantiis; abdomine crissoque in flavo-rubicundum vergentibus; cauda subtus flava; rostro albido. 15  $\frac{1}{2}$ ". *Nova-Hollandia*.

XXX. Genus. *Nestor*. Pag. 234.

1. *N. hypopolius*. Pileo virenti-cano; macula aurium aureo-rubescente; notaeo cinereo-cupreo, reflexu virente; jugulo ac gastraeo castaneo-rubicundis, plumis viridi-fimbriatis; cauda alisque subtus alternatim fusco- et rubicundo-fasciatis; rostro obscuro. 16". *Nova-Seelandia*.

---

## Psittaci mihi dubii.

### A. Cauda elongata.

1. *Ps. obscurus*. Vertex cinereus, nigrescenti-variegatus; col- lum et alae supra nigra; abdomen et crura cinerea, cum lineis trans- versalibus canis; cauda tota cinerea; rostrum nigrum.

*Psittacus obscurus Hasselq.* (Reise nach Palaestina pag. 293)  
et *Auctor*.

Rostrum latum, crassum, obtusissimum, capite triplo brevius; maxilla subconvexa, ad basin intra nares sulco aucta ad apicem per- gente; mandibula quam maxilla crassior, convexior, brevior, apice sinuata; iris flava; area oculorum usque ab fine maxillae ad initium verticis latitudine et a naribus fere usque ad basin verticis longitudine nuda, rugosa, pilis vix conspicuis obsita; cauda cuneiformis, pedes et ungues nigri. Magnitudo *Corv. Graculi*. Habitat in *Africa septen- trionali* (?). *Hasselquist*.

*Observatio*. An *Coracodis* species, sive potius nostra varietas  $\gamma$ . *Psittaci Erithaci*? Sed cauda hujus recto-truncata est!

2. *Ps. fuscus*. Ptilosis tota cinereo-fusca; regio ophthalmica, nuda, fusca; rostrum, pedes unguesque griseo-fusca; oculorum iris grisea.

*Psittacus fuscus Briss.* et reliquor. auctor. Longitudo  $13\frac{1}{2}$ " , caudae  $5\frac{1}{2}$ ". Patria . . . ? Habitus *Coracopseos nigrae*. An ea- dem hornotina? *Flaccourt* (Voy. à Madagascar, 1661), qui pri-

mus *Coracopsin nigram* innotuit, dicit avem juniorem plumis fuscis vestitam esse. — *Brissonii* descriptio ex ave viva.

3. *Ps. smaragdinus*. Viridis; plumarum margo nigricans; abdomen fusco-purpurinum ad violaceum inclinans; rectrices toto purpurinofuscae, pro vario ad lucem objectu colore variantes; rostrum nigricans.

*Perruche des terres Magellaniques Buff.* Pl. enl. 85. *Psittacus smaragdinus Auctor.* *La Perruche émeraude Le Vaill.* I. c. t. p. 47. t. 21.

Rostrum culmen planiusculum; facies plumosa; cauda longissima, gradata; pedes griseo-fuscescentes. Longitudo 13". (*Le Vaill.*) Habitat . . . ?

*Observatio.* Species mihi prorsus obscura, ab auctoribus vario modo descripta. Icon Buffoniana ostendit caudam rufam, ad viride vergentem, ventrem rufum, rostrum nigrum. — Psittacis, quos cl. *King* nuperrime in freto Magellanico frequenter in sylvis vidit, nec ptilosis nitide viridis, nec uropygium rubrum erat (secundum auctores ferrugineum).

4. *Platyc. unicolor*. Totus viridis, unicolor; rostrum basi plumbeum, apice nigrum.

*Platycercus unicolor Vig.* Philos. Mag. 1831. p. 303.

Cauda gradata. *Australia?*

5. *Ps. spurius*. Frontis pars anterior rubella; notaeum olivaceo-viride, plumis nigricanti-marginatis; uropygium flavum, plumis rubromarginatis; facies tota viridis; pectus et abdomen vinacea, hoc reflexu coerulecente et viridi; crissum viridi-flavo- et rubro-varium; plantarum basis viridi-flava; cauda supra obscure viridis, infra albo-coerulecens, fascia mediana nigra; rectricis externae pogonio ex-

terno, caeterae ante apicem album coeruleae; remiges nigrae, primariarum basis extus coerulea.

*Psittacus spurius* *Huhl* Consp. Psitt. p. 52. n. 32.

Magnitudo *Plat. Pennantii*. An hornotinus *Platycercus pileatus*? Habitat in *Nova-Hollandia*. (*Mus. Paris.*).

6. *Ps. murinus Swains*. Viridis; lora, genae, regio parotica, mentum ac totius colli latus anterior *coerulescenti-cinerea*; frons et vertex *virenti-coerulea*; rectricum apex *coerulescens*; rostrum et pedes intense *cinerea*; oculorum iris *avellanea*.

*Psittacus murinus Swains*. Zool. Illustr. n. 18. t. 89.

Magnitudo *Sit. murinae Linn*. Habitat, ut videtur, in *America Swains*. Avis a *Psittaco murino Linn*. signis exhibitis discedere videtur (Vide *Sit. murinam*, pag. 178).

7. *Psittacara nana*. Viridis; frons, collum anterior pectusque *grisescentia*.

*Psittacara nana Vig*. Zool. Jour. 1830. p. 272. Longitudo  $8\frac{1}{2}$ ". Habitat in *Jamaica*. (Vide *Sit. murinam*, pag. 178).

8. *Palaeornis rosaceus*. Viridis, supra dilutior; pectus medium, femorum tectrices rectricesque infra *rosacea*.

*Palaeornis? rosaceus Vig*. Zool. Journ. 1830. p. 274. Habitus et magnitudo *Pal. Alexandri*. Patria . . . ?

9. *Palaeornis inornatus*.

*Palaeornis inornatus Vig*. Zool. Journ. 1830. p. 274. (Vide *Pal. cubicularem*, pag. 48).

10. *Ps. verticalis*. Ptilosis tota obscure viridis; gastraeum notaes dilutius; vertex in medio *coccineus*; remiges intense *coeruleae*; cauda supra *virescenti-fusca*, subtus *fusca*.

*Psittacus verticalis* Lath. Synops. Suppl. et Auctor.

Rostrum robustum, coeruleum, apice nigrum; pedes fuscii; cauda longa, lanceolata. Longitudo 18" (*mens. angl.*). Habitus *Platycerci erythrotis*. Habitat in *Nova-Hollandia* (in portu *Jackson*). Lath.

11. *P. Leverianus*. Ptilosis pallide viridis; caput et collum flava; crissum coccineum; remiges rectricumque apex coerulea.

*Psittacus Leverianus* Gmel., *Psittacus erythropygius* Lath., *Huhl.*

Rostrum obscurum; cauda elongata, cuneata. Magnitudo fere *Psittaci aestivi*. Habitat, ut videtur, in *India orientali* (Lath.).

*Observationes.* *Lathamii* descriptio e specimine naturali Musei *Leveriani*. — An *Sittace Jendaya*? Sed magnitudinè nimis differt.

12. *Ps. pallidus*. Flavus; alae albae, leviter rosaceo-tinctae ac pro vario ad lucem objectu viridi-reflectentes; rostrum pedesque pallida; cauda modice cuneata.

*Psittacus pallidus* Shaw Misc. t. 258. Lath. Suppl.

Longitudo 8". Habitat in *Nova-Hollandia*. Certo alius speciei varietas! Tabulam *Shawii* non vidi.

13. *Ps. squamosus*. Caput, collum et pectus nigra, plumis obscure aurantio-cinctis, unde quasi squamosa; tergum infimum, uropygium ac abdomen medium sanguinea; humeri coccinei; capitis pars anterior, venter, tibiae ac reliqua ptilosis intense viridia.

*Psittacus squamosus* Lath.

Rostrum, pedes et ungues obscura; orbitae nuda, pallida. Longitudo 8 1/2". Habitat in *Cajenna*; proximus *Sit. versicolori*. An eadem, junior avis?

14. *Ps. nigricollis*. Viridis, collum anticum pectusque nigra; sinciput orbitaeque sulphurea; lora lineaque ad latera colli alba; abdomen obscure viride; remiges rectricesque nigrae, marginibus coeruleis.

*Psittacus nigricollis* Lath. Synops. Av. Suppl.

Rostrum pedesque nigra. Magnitudo *Palaeorneos Alexandri*. Habitat in *Brasilia* (?).

*Observatio*. Descriptio ex icone.

15. *Ps. carolinensis*. Supra saturate viridis, infra flavescenti-viridis; caput, collum anticum et facies ochraceo-aurantia, sine rubedine; abdomen subaurantium; remiges virescenti-coeruleae; regio periophthalmica nuda, tectrices alarum inferiores laete virides.

*Ps. carolinensis* Linn. Gmel. (synonymiae pars maxima spectat ad *Sitt. ludovicianam*), Lath. (exclus. var.  $\beta$ ), Kuhl. l. c. p. 25. n. 18.

Habitus *Sitt. ludoviciana*. Longitudo  $9\frac{1}{2}$ ". Habitat in *Carolina*. (Mus. Lugd., fide Kuhl.).

16. *Ps. Jaguilma*. Viridis; remiges apice fuscae; orbitae (an potius irides?) fulvae.

*Psittacus Jaguilma* Molina Hist. nat. Chil. p. 228, Gmel.

*Turturis* magnitudine; cauda longa, cuneata. Habitat in regno *Chilensi*, aestate in montibus *Cordilleras*.

Avis (fide *Poepig*) in *Chili* mensibus Junii et Julii gregibus ingentibus adveniens (v. *Frorieps* Notiz. aus dem Geb. der Natur- und Heilk. Bd. XXIII. pag. 280).

17. *Trichoglossus capistratus* Vig. et Horsf. Transact. of the Linn. Soc. 15. p. 290. Vide *Trichogloss. multicolor*, pag. 92).

18. *Ps. pygmaeus*. Ptilosis tota eleganter viridis, plumarum omnium apex virescenti-flavus; remiges intus obscurae; rostrum albidum, cera obscura; pedes plumbei.

*Psittacus pygmaeus* Gmel., Lath. et reliquor auctor.

Cauda longula, cuneata. Longitudo 6" (mens. angl.). Habitat in insulis *maris pacifici* (an in *O-Tahiti?*). A cel. *Latham* ad specimen Musei Leveriani descriptus.

19. *Ps. lineatus*. Viridis, remiges subtus fuscae, margine interiore pallidae.

*Psittacus lineatus* Linn. Syst. III. App. p. 223, Gmel., Lath.

Habitatio dubia. Magnitudo *Turtur*s; remiges subtus fuscae, margine interiore pallidae, unde alae subtus lineis pallidis longitudinalibus, tenuissimis; cauda cuneata corpore paullo longior.

20. *Ps. peregrinus*. Viridis, subtus ad flavum vergens; tectrices alarum superiores in medio pallide fuscae; unde in alis fascia lata; cauda brevis, cuneiformis; pedes pallide rubri. Longitudo 8". Insulae *maris pacifici*.

*Psittacus peregrinus* Lath. Vide *Trichogl. palmarum*.

B. Cauda brevi, conica sive recto-truncata.

21. *Ps. dubius*. Ptilosis viridis; collum totum rufescens; caput, mentum et alae viridia; alula extus remigesque coeruleae; rectrices flavido-virides, quatuor intermediae apice coeruleae, utrinque externae quatuor ibidem fuscae.

*Psittacus dubius* Lath., Huhl. l. c.



Rostrum pedesque pallide cornea; regio a rostri basi ad oculos et circa hos nuda, flavescens; cauda cuneata, brevis. Longitudo 9". Habitat . . . ? Affinis, ut videtur, *Piono fuscicapillo*.

*Observatio.* A cel. *Lath.* ad specimen Musei Britannici descriptus.

22. *Ps. Sosove.* Viridis; macula alarum tectricumque flava; rostrum et pedes grisea.

*Petite Perruche de Caj. Buff.* Pl. enl. 456. f. 2. (*figura cum descriptione parum congruens*). *Psittacus Sosove Gmel., Lath.*

Habitat in *Cajenna, Gujana.*

*Observatio.* *Buffonii* icon monstrat uropygium et crissum flava. (Vide *Sit. Tuipara*).

23. *Ps. unicolor.* Plumbea tota rubra; notaeo coccineo; remiges versus apicem nigricantes; rostrum aurantium; pedes nigrescentes; cauda subgradata.

*Lori unicolor Le Vaill.* l. c. t. 125. *Psittacus unicolor Bechst.* in *Lath. Uebers. d. Vög.* S. 93, *Kühl.* l. c. p. 39.

Longitudo 10". Habitat in *India orientali.* Vix ab *Eoë rubra* diversus. Icon sine dubio e specimine domefacto.

24. *Lorius Isidori Swains.* Zool. Illustr. Sec. ser. n. I. (Vide observationem in fine descriptionis *Eois variegatae* pag. 99).

25. *Ps. orientalis.* Viridis; alarum margo remigesque primariae coerulescentes; cauda versus apicem nigra et coerulea, apice flava; rostrum rubrum, apice flavum.

*Psittacus orientalis Lath., Kahl.*

Pedes flavi; magnitudo *Psittaci aestivi*. Habitat in *India orientali*. Uti videtur, tam *Psittacoidi sumatranæ* quam *Psit. gramineæ* proximus.

26. *Ps. havanensis* *Kuhl.* Plumæ colli lateralis et totius corporis inferioris lilacinae, omnes nigricanti-cinctæ; dorsum, alae abdominisque latera saturate viridia; cauda supra virescenti-purpurea, lilacino-reflectens, subtus viridis; remiges primariae basi virides, apice coerulescenti-nigrae; sequentium basis alarumque margo angustus sanguinea; caput supra viridi-coerulescens; facies virescenti-coerulescens.

*Psittacus havannensis* *Kuhl.* l. c. p. 79. n. 138.

An sane adultus *Psit. hav.* auctorum?

27. *Ps. aureus*. Ptilosis tota flava, excluso alarum margine roseo; rostro, pedibus, orbitis, corâ incarnatis.

*Le Perroquet d'or* *Le Vaill.* l. c. t. 138. *Psittacus aureus* *Bechst.* in *Lath. Uebers.* d. Vög. S. 103, *Kuhl.* l. c. p. 99.

Habitus *Pioni Senegali*. Certo ejusdem varietas!

28. *Ps. adscitus*. Viridis; pileus stramineus; genae eleganter coeruleae; dorsum atrum, flavo-striatum; tergum lutescens; pennae scapulares nigrae; tectrices alarum remigesque intense coeruleae, viridi-limbatae; crissum rubrum; rectrices laterales coeruleae, margine et juxta rhachin maculis parvis obscuris notatae, mediae obscure virides.

*Psittacus adscitus* *Lath.*

Rostrum stramineum; pedes obscuri. Longitudo  $11\frac{1}{2}$ ". Patria..?

*Observatio.* Descriptio, uti videtur, ex icone.

29. *Ps. purpureus*; Fron̄s flava; vertex purpureus; collum, dorsum, alae et cauda viridia; jugulum, pectus et abdomen grisea (*french-gray*); humeri coerulei; torques nuchae flavo-fusca.

*Psittacus purpureus Dietrichsen* Philos. Mag. 1832. p. 387.

Habitat in *Nova-Hollandia*.

30. *Ps. simplex*. Viridis, supra obscurior, rostrum et pedes cana.

*Sonnerat*. Voy. à la Nouv. Guinée pag. 70. t. 28. fig. superior. *Psittacus simplex Kuhl.* l. c. p. 66.

Irides dilutissime flavae. Magnitudo *Ps. Galguli*.

*Observatio*. Iconem supra citatam non vidi.

Psittaci auctorum sequentes nullo modo definiendi e foro (ornithológico) relegandi sunt: *Psit. ater*. — *Psit. chordeus*. — *Psit. coeruleocephalus*. — *Psit. erythrochlorus*. — *Psit. atricapillus*. (Forsan *Eos ornata*. Vide hanc pag. 100).

Desideratur descriptio psittaci cujusdam a cels. *Forsteris* in insula *Tanna* observata, et istis paucis verbis indicati: „Auf der Ebene in dem Walde hielt sich eine Menge grosser Papagayen von schönem schwarzem, rothem und gelbfleckigem Gefieder auf, sie sassen aber in den Gipfeln der Feigenbäume, wo sie, wegen allzu grosser Höhe und des dicken Laubes mit Schrotschüssen nicht zu erreichen waren.“ (*Forsters* Reise um die Welt. II. S. 264). An *Platycerci* species?

## I N D E X.

	Pag.		Pag.
<i>Cacatua</i>	42	<i>Eclectus</i>	53
<i>cristata</i>	251	<i>grandis</i>	110
<i>galerita</i>	252	<i>Linnaei</i>	109
<i>Leadbeateri</i>	250	<i>Eos</i>	52
<i>moluccensis</i>	251	<i>cervicalis</i>	99
<i>Philippinarum</i>	250	<i>cochinchinensis</i>	98
<i>roseicapilla</i>	229	<i>guebiensis</i>	97
<i>sulphurea</i>	253	<i>indica</i>	95
<i>Calyptorhynchus</i>	41	<i>ornata</i>	100
<i>Banksii</i>	224	<i>rubra</i>	96
<i>funereus</i>	226	<i>variegata</i>	98
<i>Leachii</i>	221	<i>Euphema</i>	50
<i>stellatus</i>	225	<i>chrysostoma</i>	82
<i>Temminckii</i>	222	<i>discolor</i>	85
<i>Charmosyna</i>	51	<i>pulchella</i>	80
<i>papuensis</i>	93	<i>undulata</i>	85
<i>Coracopsis</i>	59	<i>Licmetis</i>	43
<i>maſcarina</i>	217	<i>tenuirostris</i>	253
<i>nigra</i>	218	<i>Microglossus</i>	41
<i>Corydon</i>	42	<i>aterrimus</i>	220
<i>galeatus</i>	227	<i>Nasiterna</i>	56
<i>Coriphilus</i>	52	<i>pygmaea</i>	169
<i>cyaneus</i>	102	<i>Nestor</i>	43
<i>euchlorus</i>	102	<i>hypopolius</i>	234
<i>Kuhlii</i>	104	<i>Nymphicus</i>	28
<i>saphirinus</i>	101	<i>bisetis</i>	60
<i>solitarius</i>	103	<i>Novae-Hollandiae</i>	60
<i>Dasyptilus</i>	40	<i>Palaeornis</i>	27
<i>Pecquetii</i>	219	<i>Alexandri</i>	44
<i>Deroptylus</i>	50	<i>barbatus</i>	52
<i>accipitrinus</i>	79	<i>bengalensis</i>	55
<i>Domicella</i>	53	<i>borneus</i>	48
<i>atricapilla</i>	105	<i>columboides</i>	57
<i>coeruleata</i>	108	<i>cubicularis</i>	45
<i>garrula</i>	108	<i>cianocephalus</i>	55
<i>Lory</i>	106	<i>incarnatus</i>	55
<i>punicea</i>	107	<i>malaccensis</i>	52

	Pag.		Pag.
<i>melanorhynchus</i>	49	<i>vulneratus</i>	71
<i>pondicerianus</i>	50	<i>zonarius</i>	72
<b><i>Pezoporus</i></b>	28	<b><i>Polytalis</i></b>	27
<i>formosus</i>	58	<i>Barrabandi</i>	57
<b><i>Pionus</i></b>	55	<b><i>Prioniturus</i></b>	28
<i>Barrabandi</i>	148	<i>platurus</i>	61
<i>brachyurus</i>	151	<b><i>Psittacodis</i></b>	35
<i>Caica</i>	147	<i>gramineus</i>	114
<i>fuscicapillus</i>	149	<i>magnus</i>	113
<i>guineensis</i>	149	<i>Paragua</i>	112
<i>Le Vaillantii</i>	152	<i>sumatranus</i>	114
<i>Maximiliani</i>	141	<i>Tarabe</i>	115
<i>melanocephalus</i>	146	<b><i>Psittacula</i></b>	36
<i>menstruus</i>	140	<i>batavensis</i>	162
<i>Meyeri</i>	151	<i>cana</i>	163
<i>purpureus</i>	144	<i>Culacissi</i>	165
<i>senegalus</i>	150	<i>Desmarestii</i>	167
<i>senilis</i>	142	<i>Galgulus</i>	164
<i>sordidus</i>	145	<i>Huati</i>	157
<i>vulturinus</i>	148	<i>malaccensis</i>	168
<b><i>Platycercus</i></b>	29	<i>melanoptera</i>	157
<i>amboinensis</i>	77	<i>melanota</i>	158
<i>auriceps</i>	62	<i>minor</i>	166
<i>Barnardi</i>	66	<i>passerina</i>	154
<i>caledonicus</i>	70	<i>pileata</i>	153
<i>erythropterus</i>	74	<i>pullaria</i>	160
<i>erythrotis</i>	64	<i>purpurata</i>	156
<i>eximius</i>	68	<i>roseicollis</i>	161
<i>hysginus</i>	78	<i>surda</i>	158
<i>icterotus</i>	68	<i>Swindereniana</i>	159
<i>jonquillaceus</i>	71	<i>torquata</i>	168
<i>multicolor</i>	66	<i>Tovi</i>	162
<i>Novae-Guineae</i>	72	<b><i>Genus ?</i></b>	34
<i>Novae-Seelandiae</i>	64	<i>Psittacus Fieldii</i>	115
<i>pacificus</i>	62	<b><i>Psittacus</i></b>	34
<i>Pennantii</i>	73	<i>agilis</i>	135
<i>pileatus</i>	66	<i>albifrons</i>	139
<i>scapulatus</i>	75	<i>amazonicus</i>	126
<i>ulieteanus</i>	65	<i>autumnalis</i>	129
<i>venustus</i>	67	<i>Bouquetii</i>	131

	Pag.		Pag.		
17	brasiliensis . . . . .	450	67	Macao . . . . .	209
57	dominicensis . . . . .	455	67	Macavanna . . . . .	202
71	Dufresneanus . . . . .	452	68	melanura . . . . .	183
73	Erithacus . . . . .	446	67	militaris . . . . .	206
72	erythrurus . . . . .	451	68	murina . . . . .	176
76	festivus . . . . .	448	68	Nenday . . . . .	184
77	havanensis . . . . .	454	71	nobilis . . . . .	199
71	hypochondriacus . . . . .	428	71	pachyrhyncha . . . . .	205
71	leucocephalus . . . . .	457	71	patagonica . . . . .	197
73	ochrocephalus . . . . .	422	67	pertipax . . . . .	190
71	poecilorhynchus . . . . .	449	67	Petzii . . . . .	188
81	Pretrei . . . . .	459	17	severa . . . . .	204
77	pulverulentus . . . . .	420	67	solstitialis . . . . .	195
77	vinaceus . . . . .	453	71	Spixii . . . . .	245
67	xanthops . . . . .	424	151	Tirica . . . . .	175
<b>Sittace</b>			67	tricolor . . . . .	207
71	acuticaudata . . . . .	200	67	Tui . . . . .	172
71	Anaca . . . . .	185	67	Tuipara . . . . .	171
71	Araçanga . . . . .	210	67	vittata . . . . .	179
71	Ararauna . . . . .	211	67	virescens . . . . .	174
71	aurea . . . . .	187	67	xanthoptera . . . . .	173
71	cactorum . . . . .	189		<b>Tanygnathus</b>	59
71	Caninde . . . . .	242	67	macrorhynchus . . . . .	215
71	Chiripepe . . . . .	182	67	marginatus . . . . .	216
71	chlorogenys . . . . .	181		<b>Trichoglossus</b>	51
71	cruentata . . . . .	186	67	aurifrons . . . . .	85
71	euops . . . . .	176	67	australis . . . . .	87
71	flaviventris . . . . .	196	67	chlolepidotus . . . . .	88
71	glauca . . . . .	214	67	cyanogrammus . . . . .	92
71	gujanensis . . . . .	198	67	haematodus . . . . .	88
71	hyaziithina . . . . .	214	67	multicolor . . . . .	91
71	Jendaya . . . . .	191	67	palmarum . . . . .	84
71	Illigeri . . . . .	201	67	pusillus . . . . .	86
71	lepida . . . . .	180	67	pyrrhopterus . . . . .	85
71	leptorhyncha . . . . .	184	67	rubritorquis . . . . .	90
71	leucotis . . . . .	178		<b>Triclaria</b>	57
71	ludoviciana . . . . .	194	67	cyanogastra . . . . .	170
71	lutea . . . . .	195			





1835.





UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA  
598.7W12M C001  
MONOGRAPHIA PSITTACORUM. \$MUNCHEN



3 0112 010232723



